

# Numeri Quantici degli Elettroni

$n =$  **numero quantico principale** ( $n \geq 1$ ): energia, grandezza

$l =$  **numero quantico (del momento angolare) orbitale**: forma

$l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$  (in totale  $n$  valori interi)

La grandezza del momento angolare orbitale è data da  $h/2\pi \times \sqrt{l(l+1)}$

$m_l =$  **numero quantico magnetico**: orientazione

$m_l = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$  (in totale  $2l+1$  valori interi)

$s =$  **numero quantico di spin**: definisce il momento angolare di spin

$s = 1/2$

La grandezza del momento angolare di spin è data da  $h/2\pi \times \sqrt{s(s+1)}$

$m_s =$  **numero quantico magnetico di spin**: orientazione

$m_s = -1/2, +1/2,$

Un orbitale atomico è definito in maniera univoca da 3 numeri quantici  $n$ ,  $l$ , e  $m_l$ .

**Un elettrone** in un orbitale atomico è definito in maniera univoca da 4 numeri quantici:  $n$ ,  $l$ ,  $m_l$ ,  $m_s$ .

# Atomi Polielettronici


## **Principio di esclusione di Pauli**

in un dato atomo non vi possono essere 2 elettroni con la stessa quaterna di numeri quantici


## **Regola di Hund o della massima molteplicità**

in un set di orbitali degeneri gli elettroni non possono avere spin accoppiati in un orbitale finché ogni orbitale nel set non contenga un elettrone, tutti con spin parallelo

*(correlazione di spin)*




O ( $Z=8$ )




Si ( $Z=14$ )

# Principio del riempimento progressivo (*Aufbau*)




$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d \approx 4f < 6p < 7s < 6d \approx 5f$



# Penetrazione e schermatura

**Charge does  
not contribute**



**Charge  
contributes**

# Regole di Slater

(empiriche) per il calcolo della **costante di schermo S**

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

1. si scrive la configurazione elettronica dell'elemento nel seguente ordine e con questi raggruppamenti:  $(1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d) (4f) (5s, 5p) \dots$
2. gli elettroni in ogni gruppo a destra dell'elettrone considerato non contribuiscono a  $S$
3. per un elettrone in un orbitale  $ns$  o  $np$ :
  - ogni altro elettrone nello stesso gruppo contribuisce  $S = 0.35$ ;
  - ogni elettrone nel livello  $n-1$  contribuisce  $S = 0.85$ ;
  - ogni elettrone nei livelli  $n-2$  o inferiori contribuisce  $S = 1$
4. per un elettrone in un orbitale  $nd$  o  $nf$ :
  - ogni altro elettrone nello stesso gruppo ( $nd, nf$ ) contribuisce  $S = 0.35$
  - ogni elettrone in un gruppo a sinistra di quello considerato contribuisce  $S = 1$ .

# Valori sperimentali di $Z_{\text{eff}}$

**Table 1.3** Effective nuclear charges,  $Z_{\text{eff}}$


	<b>H</b>								<b>He</b>
<i>Z</i>	1								2
1 <i>s</i>	1.00								1.69
	<b>Li</b>	<b>Be</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>F</b>		<b>Ne</b>
<i>Z</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1 <i>s</i>	2.69	3.68	4.68	5.67	6.66	7.66	8.65	9.64	9.64
2 <i>s</i>	1.28	1.91	2.58	3.22	3.85	4.49	5.13	5.76	5.76
2 <i>p</i>			2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76	5.76
	<b>Na</b>	<b>Mg</b>	<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>		<b>Ar</b>
<i>Z</i>	11	12	13	14	15	16	17	18	18
1 <i>s</i>	10.63	11.61	12.59	13.57	14.56	15.54	16.52	17.51	17.51
2 <i>s</i>	6.57	7.39	8.21	9.02	9.82	10.63	11.43	12.23	12.23
2 <i>p</i>	6.80	7.83	8.96	9.94	10.96	11.98	12.99	14.01	14.01
3 <i>s</i>	2.51	3.31	4.12	4.90	5.64	6.37	7.07	7.76	7.76
3 <i>p</i>			4.07	4.29	4.89	5.48	6.12	6.76	6.76

0.69


0.62









# Raggio Atomico




Raggio metallico



Raggio covalente




Raggio covalente




Raggio di van der Waals

# Raggio Ionico




$$r_{\text{O}^{2-}} = 140 \text{ pm}$$



	1	2	13	14	15	16	17	18
2	Li 152	Be 113	B 83	C 77	N 75	O 73	F 71	Ne
3	Na 180	Mg 160	Al 143	Si 117	P 115	S 104	Cl 99	Ar
4	K 227	Ca 197	Ga 122	Ge 123	As 125	Se 117	Br 114	Kr
5	Rb 248	Sr 215	In 163	Sn 141	Sb 141	Te 143	I 133	Xe
6	Cs 265	Ba 217	Tl 170	Pb 175	Bi 155	Po 167	At	Rn



# Raggio atomico



# Contrazione lantanidica

**Table 1.4** Atomic radii,  $r/\text{pm}^*$

<b>Li</b>	<b>Be</b>											<b>B</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>F</b>
157	112											88	77	74	66	64
<b>Na</b>	<b>Mg</b>											<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>
191	160											143	118	110	104	99
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Sc</b>	<b>Ti</b>	<b>V</b>	<b>Cr</b>	<b>Mn</b>	<b>Fe</b>	<b>Co</b>	<b>Ni</b>	<b>Cu</b>	<b>Zn</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>
235	197	164	147	135	129	137	126	125	125	128	137	153	122	121	117	114
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>Y</b>	<b>Zr</b>	<b>Nb</b>	<b>Mo</b>	<b>Tc</b>	<b>Ru</b>	<b>Rh</b>	<b>Pd</b>	<b>Ag</b>	<b>Cd</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>	<b>I</b>
250	215	182	160	147	140	135	134	134	137	144	152	167	158	141	137	133
<b>Cs</b>	<b>Ba</b>	<b>Lu</b>	<b>Hf</b>	<b>Ta</b>	<b>W</b>	<b>Re</b>	<b>Os</b>	<b>Ir</b>	<b>Pt</b>	<b>Au</b>	<b>Hg</b>	<b>Tl</b>	<b>Pb</b>	<b>Bi</b>		
272	224	172	159	147	141	137	135	136	139	144	155	171	175	182		




\* The values refer to coordination number 12 (see Section 3.2).



# Effetti relativistici

$$m_{\text{rel}} = m_{\text{rest}} / \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

$$a_0 = (4\pi\epsilon_0)(\hbar^2 / me^2)$$

# Densità radiale per $Z = 80$



$D(r)$   relativistico  
 Non-relativistico





























**Table 1.5** Ionic radii,  $r/\text{pm}^*$ 

<b>Li<sup>+</sup></b>	<b>Be<sup>2+</sup></b>	<b>B<sup>3+</sup></b>			<b>N<sup>3-</sup></b>	<b>O<sup>2-</sup></b>	<b>F<sup>-</sup></b>
59(4)	27(4)	11(4)			146	135(2)	128(2)
76(6)						138(4)	131(4)
						140(6)	133(6)
						142(8)	
<b>Na<sup>+</sup></b>	<b>Mg<sup>2+</sup></b>	<b>Al<sup>3+</sup></b>			<b>P<sup>3-</sup></b>	<b>S<sup>2-</sup></b>	<b>Cl<sup>-</sup></b>
99(4)	49(4)	39(4)			212	184(6)	181(6)
102(6)	72(6)	53(6)					
118(8)	89(8)						
<b>K<sup>+</sup></b>	<b>Ca<sup>2+</sup></b>	<b>Ga<sup>3+</sup></b>			<b>As<sup>3-</sup></b>	<b>Se<sup>2-</sup></b>	<b>Br<sup>-</sup></b>
138(6)	100(6)	62(6)			222	198(6)	196(6)
151(8)	112(8)						
159(10)	123(10)						
160(12)	134(12)						
<b>Rb<sup>+</sup></b>	<b>Sr<sup>2+</sup></b>	<b>In<sup>3+</sup></b>	<b>Sn<sup>2+</sup></b>	<b>Sn<sup>4+</sup></b>		<b>Te<sup>2-</sup></b>	<b>I<sup>-</sup></b>
152(6)	118(6)	79(6)	83(6)	69(6)		221(6)	220(6)
160(8)	125(8)	92(8)	93(8)				
173(12)	144(12)						
<b>Cs<sup>+</sup></b>	<b>Ba<sup>2+</sup></b>	<b>Tl<sup>3+</sup></b>					
167(6)	149(6)	88(6)					
174(8)	156(8)	<b>Tl<sup>+</sup></b>					
188(12)	175(12)	164(6)					


\* Numbers in parentheses are the coordination number of the ion. For more values, see *Resource section 1*.

## Steps of atoms and their ions in pm


Group 1      Group 2      Group 13      Group 16      Group 17

$\text{Li}^+$  90      134	$\text{Be}^{2+}$  59      90	$\text{B}^{3+}$  41      82	$\text{O}$  73	$\text{O}^{2-}$  126	$\text{F}$  71	$\text{F}^-$  119
$\text{Na}^+$  116      154	$\text{Mg}^{2+}$  86      130	$\text{Al}^{3+}$  68      118	$\text{S}$  102	$\text{S}^{2-}$  170	$\text{Cl}$  99	$\text{Cl}^-$  167
$\text{K}^+$  152      196	$\text{Ca}^{2+}$  114      174	$\text{Ga}^{3+}$  76      126	$\text{Se}$  116	$\text{Se}^{2-}$  184	$\text{Br}$  114	$\text{Br}^-$  182
$\text{Rb}^+$  166      211	$\text{Sr}^{2+}$  132      192	$\text{In}^{3+}$  94      144	$\text{Te}$  135	$\text{Te}^{2-}$  207	$\text{I}$  133	$\text{I}^-$  206

# Energia di Ionizzazione



$$I = E(A^+, g) - E(A, g)$$




$$1\text{eV} = 96.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

**Table 1.6** First and second (and some higher) ionization energies of the elements,  $I/(kJ\ mol^{-1})$

<b>H</b>							<b>He</b>
1312							2373
							5259
<b>Li</b>	<b>Be</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>F</b>	<b>Ne</b>
513	899	801	1086	1402	1314	1681	2080
7297	1757	2426	2352	2855	3386	3375	3952
11809	14844	3660	4619	4577	5300	6050	6122
		25018					
<b>Na</b>	<b>Mg</b>	<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>	<b>Ar</b>
495	737	577	786	1011	1000	1251	1520
4562	1476	1816	1577	1903	2251	2296	2665
6911	7732	2744	3231	2911	3361	3826	3928
		11574					
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>	<b>Kr</b>
419	589	579	762	947	941	1139	1351
3051	1145	1979	1537	1798	2044	2103	3314
4410	4910	2963	3302	2734	2974	3500	3565
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>	<b>I</b>	<b>Xe</b>
403	549	558	708	834	869	1008	1170
2632	1064	1821	1412	1794	1795	1846	2045
3900	4210	2704	2943	2443	2698	3197	3097
<b>Cs</b>	<b>Ba</b>	<b>Tl</b>	<b>Pb</b>	<b>Bi</b>	<b>Po</b>	<b>At</b>	<b>Rn</b>
375	502	590	716	704	812	926	1036
2420	965	1971	1450	1610	1800	1600	
3400	3619	2878	3080	2466	2700	2900	





**Table 1.7** Electron affinities of the main-group elements,  $E_a/(\text{kJ mol}^{-1})^*$ 

<b>H</b>								<b>He</b>
72								-48
<b>Li</b>	<b>Be</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>F</b>	<b>Ne</b>	
60	$\leq 0$	27	122	-8	141	328	-116	
					-780			
<b>Na</b>	<b>Mg</b>	<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>	<b>Ar</b>	
53	$\leq 0$	43	134	72	200	349	-96	
					-492			
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>	<b>Kr</b>	
48	2	29	116	78	195	325	-96	
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>	<b>I</b>	<b>Xe</b>	
47	5	29	116	103	190	295	-77	


\* The first values refer to the formation of the ion  $X^-$  from the neutral atom; the second value to the formation of  $X^{2-}$  from  $X^-$ .

**l'affinità elettronica ha segno opposto alla variazione di energia**

# Ionization limit

Orbitali di frontiera

Energy ↑



(a)

(b)

# Electron affinity/kJ mol<sup>-1</sup>



<b>H</b>																	<b>He</b>
<b>Li</b>	<b>Be</b>											<b>B</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>F</b>	<b>Ne</b>
<b>Na</b>	<b>Mg</b>											<b>Al</b>	<b>Si</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>Cl</b>	<b>Ar</b>
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Sc</b>	<b>Ti</b>	<b>V</b>	<b>Cr</b>	<b>Mn</b>	<b>Fe</b>	<b>Co</b>	<b>Ni</b>	<b>Cu</b>	<b>Zn</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>	<b>Kr</b>
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>Y</b>	<b>Zr</b>	<b>Nb</b>	<b>Mo</b>	<b>Tc</b>	<b>Ru</b>	<b>Rh</b>	<b>Pd</b>	<b>Ag</b>	<b>Cd</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>	<b>I</b>	<b>Xe</b>
<b>Cs</b>	<b>Ba</b>	<b>Lu</b>	<b>Hf</b>	<b>Ta</b>	<b>W</b>	<b>Re</b>	<b>Os</b>	<b>Ir</b>	<b>Pt</b>	<b>Au</b>	<b>Hg</b>	<b>Tl</b>	<b>Pb</b>	<b>Bi</b>	<b>Po</b>	<b>At</b>	<b>Rn</b>
<b>Fr</b>	<b>Ra</b>	<b>Lr</b>	<b>Rf</b>	<b>Db</b>	<b>Sg</b>	<b>Bh</b>	<b>Hs</b>	<b>Mt</b>	<b>Ds</b>	<b>Rg</b>	<b>Cn</b>	<b>Uut</b>	<b>Fl</b>	<b>Uup</b>	<b>Lv</b>	<b>Uus</b>	<b>Uuo</b>

<b>La</b>	<b>Ce</b>	<b>Pr</b>	<b>Nd</b>	<b>Pm</b>	<b>Sm</b>	<b>Eu</b>	<b>Gd</b>	<b>Tb</b>	<b>Dy</b>	<b>Ho</b>	<b>Er</b>	<b>Tm</b>	<b>Yb</b>
<b>Ac</b>	<b>Th</b>	<b>Pa</b>	<b>U</b>	<b>Np</b>	<b>Pu</b>	<b>Am</b>	<b>Cm</b>	<b>Bk</b>	<b>Cf</b>	<b>Es</b>	<b>Fm</b>	<b>Md</b>	<b>No</b>

# Polarizzabilità e Regole di Fajans

1. cationi piccoli e a carica elevata (e.g.  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ) hanno forte **potere polarizzante**
2. anioni larghi e con carica elevata sono **facilmente polarizzabili** (e.g.  $\text{I}^-$ ,  $\text{Se}^{2-}$ ,  $\text{Te}^{2-}$ ,  $\text{As}^{3-}$ ,  $\text{P}^{3-}$ )
3. cationi che non hanno una configurazione elettronica di gas nobile (e.g. quasi tutti quelli dei metalli di transizione) sono più polarizzanti di quelli con guscio chiuso (e.g. cationi dei metalli alcalini o alcalino-terrosi) perché avranno una maggiore  $Z_{\text{eff}}$ , cioè una carica più alta sulla loro superficie (*cfr*  $\text{Hg}^{2+}$  e  $\text{Ca}^{2+}$ , 116 pm).