




Bruna Scaggiante
DSV

bscaggiante@units.it


LA CELLULA




Virus che infettano animali




Virus che infettano piante



Virus batterici







100 nm





100 nm

Cellule procariotiche ed eucariotiche




NEI PROCARIOTI IL DNA È A DIRETTO CONTATTO COL CITOPLASMA E FORMA IL NUCLEOIDE






Le più comuni morfologie batteriche:
cocchi - bacilli - spirilli


Micrografia elettronica di un bacillo



Dimensioni: generalmente da 0,5 a pochi μm




spherical cells
e.g., *Streptococcus*





rod-shaped cells
e.g., *Escherichia coli*,
Vibrio cholerae




the smallest cells
e.g., *Mycoplasma*,
Spiroplasma



spiral cells
e.g., *Treponema pallidum*



Gram Negative





Thiomargarita namibiensis a marine bacterium of over 500 μm diameter. It is visible by the naked eye. It is generally found in chains of ten or more. It is also very easy to notice because it shines like a pearl.

The non-motility of *Thiomargarita* cells is compensated by its large cellular size

Due giganti tra i batteri

Epulopiscium fishelsoni lives in the gut of the surgeon fish and can be up to 600 μm long



1 mm



I più piccoli procarioti conosciuti: Mycoplasmi


MICOPLASMI Le più piccole cellule capaci di vita autonoma : 0,2 – 0,3 μm di diametro quando hanno forma sferica.

Morfologia estremamente variabile: sferica, filamentosa

Assenza di parete cellulare rigida

Gram-negativi

Nell'uomo sono state dimostrate 6 specie di Mycoplasma:
M.pneumoniae M. salivarium M.hominis M.genitalium M.orale
M.incognitus




Mycoplasma genitalium (Bacteria)

This bacterium infects the male and female reproductive tracts and in 1995 became only the second organism to have its genome completely sequenced. It has about 500 genes and belongs to the family of Mycoplasma bacteria, which includes parasites that have very small genomes.


Uomo	Bovino	Ovi-Caprini	Suini
<i>M. pneumoniae</i>	<i>M. mycoides</i> sub sp <i>mycoides</i> (colonie piccole)	<i>M. mycoides</i> sub sp. <i>mycoides</i> (grosse colonie)	<i>M. hyopneumoniae</i>
<i>M. fermentans</i> (<i>incognitus</i>)	<i>M. bovigenitalium</i>	<i>M. mycoides</i> sub sp <i>capri</i>	<i>M. hyosynoviae</i>
<i>M. genitalium</i>	<i>M. bovis</i>	<i>M. capricolum</i>	<i>M. hyorhinis</i>
<i>M. hominis</i>	<i>M. dispar</i>	<i>M. conjunctivae</i>	
<i>M. pulmonis</i>	<i>M. bovoculi</i>	<i>M. agalactiae</i>	

Tabella 1 – Principali specie di micoplasmi di alcuni mammiferi



**Cyanobacteria= Alghe azzurre o blu-verdi
Sono gram negativi capaci di fare fotosintesi**

CELLULE EUCARIOTE



CELLULE PROCARIOTE SENZA NUCLEO



MANCANO



Nucleo



Reticolo endoplasmatico



Apparato di Golgi



Mitocondri


SONO PROCARIOTI :




Batteri




Alghie azzurre
Gli organismi più antichi della Terra





Cellula procariotica ed eucariotica: differenze




Tipica cellula procariote (batterio)



Schema di una cellula animale (eucariotica)



IL NUCLEO È DELIMITATO DA UN DUPLICE SISTEMA DI MEMBRANE SEPARATE DA UNO SPAZIO DI ALCUNE DECINE DI NANOMETRI



**L'INVOLUCRO
NUCLEARE È
INTERROTTO A
LIVELLO DEI PORI
NUCLEARI, DI CIRCA
9 nm DI DIAMETRO,
CHE METTONO IN
COMUNICAZIONE IL
NUCLEOPLASMA CON
IL CITOPLASMA**




RETICOLO ENDOPLASMATICO

E' UNA RETE TRIDIMENSIONALE DI CAVITÀ (TUBULI, CISTERNE APPIATTITE, DELIMITATE DA MEMBRANA)


È TRADIZIONALMENTE
DISTINTO IN:

- RETICOLO ENDOPLASMATICO
RUGOSO (RER = rough endoplasmic
reticulum);

- RETICOLO ENDOPLASMATICO
LISCIO (SER = smooth endoplasmic
reticulum)




**IL RETICOLO
ENDOPLASMATICO
RUGOSO PORTA
RIBOSOMI ASSOCIATI
AL VERSANTE
CITOPLASMATICO
DELLE MEMBRANE**



**IL RETICOLO
ENDOPLASMATICO RUGOSO
È PARTICOLARMENTE
SVILUPPATO NELLE
CELLULE SECERNENTI**





**IL RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO È ABBONDANTE IN
CELLULE IMPEGNATE NELLA SINTESI DI LIPIDI**




COMPLESSO DI GOLGI

È FORMATO DA UNA SERIE DI CISTERNE MEMBRANOSE APPIATTITE, CON I MARGINI DILATATI, IMPILATE LE UNE SOPRA LE ALTRE.





L'APPARATO DI GOLGI MODIFICA LE PROTEINE CHE ARRIVANO DAL RETICOLO ENDOPLASMATICO E LE INDIRIZZA VERSO SPECIFICHE DESTINAZIONI

**LE PROTEINE PRODOTTE
DAL RETICOLO
ENDOPLASMATICO
PASSANO ATTRAVERSO IL
COMPLESSO DI GOLGI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA DESTINAZIONE
FINALE**




1. Vesicole contenenti proteine gemmano dal reticolo endoplasmatico rugoso, trasferendo queste molecole all'apparato di Golgi.
2. Le vescicole provenienti dal reticolo endoplasmatico rugoso si fondono con la regione cis del ditiosoma.
3. L'apparato di Golgi modifica chimicamente le proteine nel suo lume...
4. ... "etichettandole" affinché pervengano alla loro giusta destinazione.






LISOSOMI

I LISOSOMI SONO VACUOLI CONTENENTI ELEVATE CONCENTRAZIONI DI ENZIMI DIGESTIVI, PRODOTTI DAL COMPLESSO DI GOLGI



(b)



I LISOSOMI PERMETTONO LA DIGESTIONE DEL MATERIALE INTRODOTTO NELLA CELLULA PER FAGOCITOSI



I MITOCONDRI SONO ORGANELLI COINVOLTI NELLE REAZIONI BIOCHIMICHE CHE PORTANO ALLA SINTESI DI ATP, LA MOLECOLA CHE FUNGE DA FONTE DI ENERGIA PER LE CELLULE

I MITOCONDRI SONO DELIMITATI DA UNA DOPPIA MEMBRANA. LA MEMBRANA INTERNA E' INTROFLESSA A FORMARE NUMEROSE "CRESTE". NELLA MEMBRANA INTERNA SONO LOCALIZZATI MOLTI ENZIMI COINVOLTI NELLA SINTESI DI ATP


LA MATRICE MITOCONDRIALE CONTIENE NUMEROSI ENZIMI, UNA MOLECOLA CIRCOLARE DI DNA E RIBOSOMI



La membrana interna rappresenta la barriera primaria interposta tra gli enzimi mitocondriali e il citosol.


Le creste contengono le molecole chiave per la generazione di ATP a partire da molecole che fungono da combustibile cellulare.

La matrice corrisponde allo spazio racchiuso dalla membrana interna; esso contiene molti degli enzimi coinvolti nella respirazione cellulare, oltre a ribosomi e a DNA.




(A)


100 nm



(B)




(C)




(A)

10 μm



(B)

2 μm






Figure 1-35 *Molecular Biology of the Cell*, Fifth Edition (© Garland Science 2008)

I CLOROPLASTI SONO GLI ORGANELLI DEPUTATI ALLA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA


ESSI APPAIONO VERDI PER LA PRESENZA, AL LORO INTERNO, DI CLOROFILLA



10 μm

I CLOROPLASTI SONO DELIMITATI DA UNA DOPPIA MEMBRANA

ALL'INTERNO, LO STROMA CONTIENE UNA MOLECOLA CIRCOLARE DI DNA, RIBOSOMI E UNO SVILUPPO NOTEVOLE DI MEMBRANA A FORMARE I TILACOIDI.








Figure 1-36 *Molecular Biology of the Cell*, Fifth Edition (© Garland Science 2008)

- Chlorella are tiny green cells that live inside some amoeba... endosymbiosis may still be evolving today!



Cytoskeleton

- made of microtubules
- found throughout cytoplasm
- gives shape to cell & moves organelles around inside.



	Procarioti	Eucarioti
Organismi	Batteri , Alghe Azzurre e Archeibatteri	Protisti, Funghi, Piante e Animali
Dimensioni	Generalmente da 1 a 10 μm di dimensioni lineari	Generalmente da 10 a 100 μm di dimensioni lineari (5-7 μm spermatozoi)
metabolismo	Anaerobio o aerobio	aerobio
organelli	Pochi o nessuno (no Mitochondri, no cloroplasti)	Nucleo, mitocondri, cloroplasti, reticolo, endoplasmatico, ecc..
DNA	DNA circolare nel citoplasma	Molecole molto lunghe di DNA lineare contenenti molte regioni non codificanti; circondato da un involucro nucleare
RNA e proteine	RNA e proteine sintetizzate nello stesso compartimento Ribosomi 50+30S	RNA sintetizzato ed elaborato nel nucleo; proteine sintetizzate nel citoplasma Ribosomi 60+40S
Citoplasma	Assenza di citoscheletro: niente flussi citoplasmatici, endocitosi ed esocitosi	Citoscheletro composto da filamenti proteici; flussi citoplasmatici; endocitosi e esocitosi
Divisione cellulare	Cromosomi separati mediante attacco alla membrana plasmatica (scissione binaria)	Cromosomi separati da un fuso di citoscheletro (mitosi e meiosi)
Organizzazione cellulare	In genere unicellulare	In genere multicellulare, con differenziamento di molti tipi cellulari
Movimento	Flagelli (flagellina)	Microfilamenti e microtubuli (actina e tubulina)
Parete cellulare	presente	Presente solo nelle piante

	Cellula animale tipica	Cellula vegetale tipica
Organelli	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleo <ul style="list-style-type: none"> • Nucleolo (all'interno del nucleo) • Reticolo endoplasmatico rugoso • Reticolo endoplasmatico liscio • Ribosomi • Citoscheletro • Apparato del Golgi • Citoplasma • Mitochondri • Lisosomi • Centrosomi <ul style="list-style-type: none"> • Centrioli 	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleo <ul style="list-style-type: none"> • Nucleolo (all'interno del nucleo) • Reticolo endoplasmatico rugoso • Reticolo endoplasmatico liscio • Ribosomi • Citoscheletro • Apparato del Golgi (dittiosomi) • Citoplasma • Mitochondri • Cloroplasti ed altri plastidi • Vacuolo centrale (grande) <ul style="list-style-type: none"> • Tonoplasto (membrana centrale del vacuolo) • Perossisomi (gliossisomi) • Vacuoli
Strutture aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Membrana plasmatica • Flagelli • Ciglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Membrana plasmatica • Flagelli (solo nei gameti) • Parete cellulare • Plasmodesmi

I perossisomi sono microbodies che contengono enzimi per l'ossidazione degli acidi grassi. Producono perossido di idrogeno grazie all'attività ossidativa dei loro enzimi. Contengono anche catalasi che degrada perossido di idrogeno in acqua e idrogeno. Nelle cellule animali sono presenti ad esempio nel fegato e rene (x detossificazione, es. alcol)

Funzione generale: assemblaggio

Nucleo	Sintesi di DNA; sintesi di RNA; assemblaggio di subunità ribosomiali (nel nucleolo)
Ribosomi	Sintesi di polipeptidi (proteine)
Reticolo endoplasmatico ruvido (RER)	Sintesi delle proteine di membrana, delle proteine di secrezione e degli enzimi idrolitici; formazione delle vescicole di trasporto
Reticolo endoplasmatico liscio (REL)	Sintesi dei lipidi; metabolismo dei carboidrati nelle cellule del fegato; demolizione di sostanze nocive nelle cellule del fegato; immagazzinamento di ioni calcio
Apparato di Golgi	Rielaborazione, deposito temporaneo e trasporto di macromolecole; formazione di lisosomi e di vescicole di trasporto

Funzione generale: demolizione


Lisosomi	Digestione delle sostanze nutritive, dei batteri e degli organuli danneggiati; distruzione di certe cellule durante lo sviluppo embrionale
Perossisomi	Diversi processi metabolici, con demolizione di H_2O_2 come sottoprodotto
Vacuoli	Digestione (come i lisosomi); immagazzinamento di sostanze chimiche; aumento delle dimensioni cellulari; bilancio idrico

Funzione generale: trasformazioni energetiche

Cloroplasti (nelle piante e in alcuni protisti)	Conversione di energia luminosa in energia chimica contenuta negli zuccheri
Mitocondri	Conversione di energia chimica degli alimenti in energia chimica racchiusa in molecole di ATP

Funzioni generali: sostegno, movimento e comunicazione tra cellule

Citoscheletro (compresi ciglia, flagelli e centrioli delle cellule animali)	Mantenimento della forma cellulare; ancoraggio per gli organuli; movimento degli organuli nelle cellule; movimento cellulare
Pareti cellulari (nelle piante, nei funghi e in alcuni protisti)	Mantenimento della forma cellulare e sostegno scheletrico; protezione delle superfici; fissaggio delle cellule nei tessuti
Matrice extra-cellulare (nelle cellule animali)	Protezione superficiale; fissaggio delle cellule nei tessuti
Giunzioni cellulari	Comunicazione tra cellule; fissaggio delle cellule nei tessuti



**ATOMS, MOLECULES, MACROMOLECULES AND
MACROMOLECULAR ASSEMBLIES**

0.1 nm radius of a hydrogen atom
0.6 – 1 nm Amino Acids, Nucleotides, simple sugars
2 nm diameter of a DNA double helix
3 – 10 nm most Globular Proteins
6 nm thickness of a lipid double layer
11 nm Ribosome
25 nm Microtubule diameter

BACTERIOPHAGES AND VIRUSES

20 - 200 nm range of most bacteriophages and viruses

PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC CELLS

0.4 mm diam. of the smallest prokaryotes: Nanoarchaeum and Mycoplasma

1 - 5 μm range size for most Prokaryotes

2 μm Escherichia coli - a bacterium

3 μm av. length of Mitochondrion

4 μm av. diameter of a yeast cell (Saccharomyces), a very small eukaryotic cell

2 - 10 μm range length of Chloroplasts

3 – 10 μm range of diameters of most eukaryotic Nuclei

7 μm Human red blood cell

10 - 30 μm most Eukaryotic animal cells

10 - 100 μm most Eukaryotic plant cells

100 μm Human Egg

500 μm biggest bacteria Epulopiscium and Thiomargarita

up to 800 μm large Amoeba

1 mm diameter of the squid giant nerve cell

120 mm diameter of an ostrich egg (some dinosaur eggs were much larger)

3 m Length of a nerve cell of giraffe's neck

Pluricellular organisms

0.2 - 0.5 mm small arthropods

1 mm length of *Caenorhabditis elegans*, (50 μm diameter) about 1000 cells

1 mm smallest angiosperms (*Lemnaceae*)

1,7 m height of **Homo sapiens**, nearly 10^{14} cells

30 m length of *Balaenoptera musculus*

100 m height of the tallest trees (*Sequoia sempervirens*, *Eucalyptus regnans*)







Table 2-3 Approximate Chemical Compositions of a Typical Bacterium and a Typical Mammalian Cell

COMPONENT	PERCENT OF TOTAL CELL WEIGHT	
	<i>E. COLI</i> /BACTERIUM	MAMMALIAN CELL
H ₂ O	70	70
Inorganic ions (Na ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺ , Cl ⁻ , etc.)	1	1
Miscellaneous small metabolites	3	3
Proteins	15	18
RNA	6	1.1
DNA	1	0.25
Phospholipids	2	3
Other lipids	-	2
Polysaccharides	2	2
Total cell volume	2 × 10 ⁻¹² cm ³	4 × 10 ⁻⁹ cm ³
Relative cell volume	1	2000

Proteins, polysaccharides, DNA, and RNA are macromolecules. Lipids are not generally classed as macromolecules even though they share some of their features; for example, most are synthesized as linear polymers of a smaller molecule (the acetyl group on acetyl CoA), and they self-assemble into larger structures (membranes). Note that water and protein comprise most of the mass of both mammalian and bacterial cells.



SUBUNITS

→
covalent bonds

MACROMOLECULES

→
noncovalent bonds

MACROMOLECULAR ASSEMBLIES



e.g., sugars, amino acids,
and nucleotides




e.g., globular proteins
and RNA



30 nm

e.g., ribosome

Il flusso dell'informazione genetica




IL FLUSSO DELL'INFORMAZIONE GENETICA

A. La **replicazione** del DNA trasmette l'informazione genetica alle cellule figlie.

B. L'**espressione genica**, cioè l'attuazione dell'informazione genetica, avviene attraverso due stadi fondamentali:

1. La **trascrizione** dei geni in corrispondenti sequenze di RNA.

2. La **traduzione** dell'informazione passata agli RNA in polipeptidi, ad opera dei ribosomi, attraverso la mediazione degli amminoacil-tRNA che decodificano le sequenze degli mRNA secondo il codice genetico.



Il flusso dell'informazione genetica negli eucarioti