

η^1-alchenile

η^1-alchinile



η^1-arile

β-eliminazione di idruro



Tipico processo di sintesi



In alternativa si usano reattivi di Grignard



η^2-alchene
coordinazione *side-on*


137 pm


H H
Cl
C
Cl
Pt
Cl
C
H H
−



modello di Dewar – Chatt – Duncanson





Alkene-to-M donation
(a)



M-to-alkene back-donation
(b)

modello di Dewar – Chatt – Duncanson



metallociclopropano



Struttura ai raggi-X di $Ru(\eta^2\text{-}C_2H_4)(PMe_3)_4$

C−C = 144 pm *vs* 134 pm nell'etene

Flussionalità del legame η^2-alchene





$[Co_2(PhC{\equiv}CPh)(CO)_6]$

4-electron donor



C—C in Co_2C_2-unit = 136 pm

Dieni non-coniugati



Cycloocta-1,5-diene, cod



$Ni(cod)_2$


Cl
Pd
NCPh
Cl
NCPh
cod
Cl
Pd
Cl
+ 2 PhCN

Butadiene



Il butadiene giace nel piano *xy*, sopra al metallo


E_{MO}
LUMO
HOMO
ψ_4 (a_2)
ψ_3 (b_1)
ψ_2 (a_2)
ψ_1 (b_1)

(a)


M
C_2
C_3
C_1
C_4
x
y
z


Vacant
sp_zd_z2
Vacant
d_{xz}
ψ_1
ψ_2


Filled
d_{yz}
Filled
d_{xy}
ψ_3
ψ_4

(b)





$[Mo(\eta^3\text{-}C_3H_5)(\eta^4\text{-}CH_2CHCHCH_2)(\eta^5\text{-}C_5H_5)]$



$[Ru(C_4H_4)](CO)_3]$


C_6H_6
Cr


δ
π
σ
d_{xy}
$d_{x^2-y^2}$
d_{yz}
d_{zx}
d_{z^2}
e_2
e_1
a_1


E_{MO}
b_{2g}
e_{2u}
e_{1g}
a_{2u}





η^6-arene

η^4-arene

slipping intermediate

η^6-arene



η^1-Cyclopentadienyl



η^3-Cyclopentadienyl



η^5-Cyclopentadienyl



η^1-mode η^3-mode η^5-mode


3π
2π
1π
$d_{x^2-y^2}$
δ
d_{xy}
d_{yz}
π
d_{zx}
d_{z^2}
σ



***neo*-Menthylcyclopentadienyl**

Allile, $CH_2=CH-CH_2^-$



η^1-($CH_2CH=CH_2$)



$\eta^3(CH_2CH{=}CH_2)$



η^3-($CH_2CH{=}CH_2$)


Accettore π
3π
Donatore π
2π
Donatore σ
1π
d_{yz}
d_{zx}
d_{z^2}


E_{MO}
ψ_3 (b_1) Antibonding
ψ_2 (a_2) Non-bonding
ψ_1 (b_1) Bonding



(b)



(c)

$[Mo(\eta^3\text{-}C_3H_5)(\eta^4\text{-}CH_2CHCHCH_2)(\eta^5\text{-}C_5H_5)]$





$[Ni(\eta^3\text{-}C_3H_5)_2]$



syn



anti

Meccanismo di scambio $\eta^3 \rightarrow \eta^1 \rightarrow \eta^3$



η^3 *syn* η^1 η^3 *anti*

$$2C_3H_5MgBr + NiCl_2 \rightarrow [Ni(\eta^3\text{-}C_3H_5)_2] + 2MgBrCl$$