

Quesiti per la valutazione

1. In quale delle seguenti evenienze cliniche deve essere impiegata la profilassi antibiotica?
 - a. prevenzione di infezione batterica a seguito di infezione virale delle vie aeree superiori
 - b. procedure odontoiatriche che prevedono manipolazione del tessuto gengivale o della regione periapicale dei denti, o perforazione della mucosa in un soggetto con protesi valvolare cardiaca
 - c. manovre chirurgiche pulite come la biopsia mammaria
 - d. applicazione di apparecchio ortodontico rimuovibile in un soggetto con protesi valvolare cardiaca
2. L'acido clavulanico:
 - a. inibisce la sintesi del peptidoglicano
 - b. deve essere sempre somministrato in associazione con una penicillina
 - c. è un antibiotico attivo contro molti Gram - e in alcune patologie può essere utilizzato da solo
 - d. è un antibiotico attivo contro molti Gram + e in alcune patologie può essere utilizzato da solo
3. L'associazione amoxicillina – acido clavulanico:
 - a. è di prima scelta nelle infezioni del cavo orale
 - b. ha meno effetti collaterali rispetto all'amoxicillina
 - c. è di scelta nella profilassi dell'endocardite batterica
 - d. può essere utilizzata in caso di infezioni causate da batteri produttori di beta-lattamasi
4. I macrolidi eritromicina e claritromicina:
 - a. sono induttori enzimatici
 - b. sono inibitori enzimatici
 - c. non sono metabolizzati dal fegato, e vengono eliminati immodificati con le urine
 - d. sono metabolizzati dal fegato ma non sono né induttori né inibitori enzimatici
5. quale delle seguenti affermazioni NON è corretta
 - a. l'azitromicina è un'alternativa all'amoxicillina nei pazienti allergici alla penicillina
 - b. l'azitromicina ha una lunghissima emivita
 - c. per le sue caratteristiche farmacocinetiche l'azitromicina è un'alternativa all'amoxicillina in tutti i pazienti
 - d. l'azitromicina è un farmaco poco tossico