

STIMATORE DELLA FUNZIONE DI SOPRAVVIVENZA E SUE PROPRIETÀ

Per stimare la funzione di sopravvivenza $S(x)$, $x = a, a + 1, \dots, \omega$, di un modello di sopravvivenza non parametrico, si esprime la funzione di sopravvivenza come prodotto di probabilità condizionate di sopravvivenza

$$S(x) = \frac{S(x)}{S(x-1)} \cdot \frac{S(x-1)}{S(x-2)} \cdot \dots \cdot \frac{S(1)}{S(0)} = p_{x-1} \cdot p_{x-2} \cdot \dots \cdot p_0 = \prod_{j < x} p_j$$

infatti

$$\frac{S(j)}{S(j-1)} = \frac{P(T_0 > j)}{P(T_0 > j-1)} = \frac{P(T_0 > j, T_0 > j-1)}{P(T_0 > j-1)} = P(T_0 > j | T_0 > j-1) = p_{j-1}$$

Siano

$\hat{p}_x = 1 - \hat{q}_x$ la stima di p_x

n'_x l'esposizione nella classe di età $]x, x+1]$

con $x = a, a + 1, \dots, \omega - 1$

Si ottiene la seguente stima della funzione di sopravvivenza $S(x)$, $x = a, a + 1, \dots, \omega$

$$\hat{S}(x) = \hat{p}_{x-1} \cdot \hat{p}_{x-2} \cdot \dots \cdot \hat{p}_0$$

Stimatore della funzione di sopravvivenza e sue proprietà

Sia

\tilde{p}_x lo stimatore di p_x del quale \hat{p}_x è la stima, $x = a, a + 1, \dots, \omega - 1$

Indichiamo con

$$\tilde{S}(x) = \prod_{j < x} \tilde{p}_j, \quad x = a, a + 1, \dots, \omega$$

lo stimatore del quale $\hat{S}(x)$ è la stima.

Per valutare speranza matematica e varianza dello stimatore $\tilde{S}(x)$ occorre formulare delle ipotesi sui n.a. \tilde{p}_j , $j = a, a + 1, \dots, \omega - 1$

Siano $\mathcal{I} = \{n'_a, n'_{a+1}, \dots, n'_{\omega-1}\}$ le esposizioni nelle diverse classi di età.

Si formulano le seguenti ipotesi sui n.a. \tilde{p}_x

Condizionatamente a $\mathcal{J} = \{n'_a, n'_{a+1}, \dots, n'_{\omega-1}\}$, *i n.a.*

\tilde{p}_x , $x = a, a + 1, \dots, \omega - 1$ siano stocasticamente indipendenti

e siano

$$E(\tilde{p}_x | \mathcal{I}) = p_x \quad \text{Var}(\tilde{p}_x | \mathcal{I}) = \frac{p_x (1 - p_x)}{n'_x} \quad x = a, a + 1, \dots, \omega - 1$$

Stimatore della funzione di sopravvivenza e sue proprietà

Risulta allora che $\tilde{S}(x) = \prod_{j < x} \tilde{p}_j$ è uno stimatore non distorto, infatti

$$E(\tilde{S}(x)|I) = E\left(\prod_{j < x} \tilde{p}_j | I\right) = \prod_{j < x} p_j = S(x) \quad x = a, a + 1, \dots, \omega$$

La varianza dello stimatore $\tilde{S}(x)$ è

$$\text{Var}(\tilde{S}(x)|I) = [S(x)]^2 \left[\prod_{j < x} \left(1 + \frac{q_j}{p_j n'_j}\right) - 1 \right]$$

e può essere approssimata da

$$\text{Var}(\tilde{S}(x)|I) \cong [S(x)]^2 \sum_{j < x} \frac{q_j}{p_j n'_j}$$

dalla quale si ottiene la **formula di Greenwood**, che fornisce una stima della varianza dello stimatore $\tilde{S}(x)$

$$\hat{\text{Var}}(\tilde{S}(x)|I) = [\hat{S}(x)]^2 \sum_{j < x} \frac{\hat{q}_j}{\hat{p}_j n'_j}$$