

Piano della presentazione

- 1 Approssimazione normale alla binomiale
- 2 Inferenze per le proporzioni
- 3 Proporzioni campionaria
- 4 Approssimazione normale
- 5 Intervallo di confidenza
- 6 Test per una proporzione campionaria
- 7 Numerosità del campione
- 8 Differenza tra due proporzioni
- 9 Test di ipotesi per $\pi_1 - \pi_2$
- 10 Condizioni di validità
- 11 ~~Due campioni dipendenti: test di McNemar~~
- 12 ~~Campioni di piccole dimensioni~~
- 13 ~~Test esatto di Fisher~~
- 14 ~~Conclusioni~~

Approssimazione normale alla binomiale

Approssimazione normale alla binomiale

- Abbiamo detto che la distribuzione (discreta) binomiale è il modello probabilistico per il conteggio di k successi in n prove bernoulliane, che ammettono quindi due soli esiti: o "successo" o "insuccesso".
- Quando n è grande, non è conveniente calcolare le probabilità binomiali con la formula (*coefficiente binomiale*) enunciata in precedenza.
- Possiamo invece approssimare la distribuzione utilizzando la distribuzione normale avente la stessa media e deviazione standard della binomiale, ovvero $N(np, \sqrt{np(1-p)})$.

- Si commettono due errori approssimando la binomiale con la normale:
 1. La densità della distribuzione normale per uno specifico valore $X = k$, in generale, non è identica¹ alla probabilità binomiale $P(X = k)$.
 2. La distribuzione normale è continua mentre la distribuzione binomiale è discreta.
- L'approssimazione normale alla binomiale migliora al crescere di n ed è migliore per valori di p prossimi a 0.5 che per valori prossimi a 0 o 1.

¹In teoria non esiste affatto: dobbiamo immaginare che la densità normale per $X = k$ si estenda ad un intervallo di $X \pm 1/2$

- Una regola euristica per utilizzare l'approssimazione normale è che tale approssimazione è appropriata quando sia np che $n(1 - p)$ sono > 10 .
- L'approssimazione normale alla binomiale può essere migliorata utilizzando una **correzione per la continuità**, ma non ci sono molti casi in cui dobbiamo preoccuparci di questo: quando np o $n(1 - p)$ sono < 10 possiamo calcolare le probabilità esatte.

- Si calcoli la probabilità di osservare 10 o meno successi in 40 prove bernulliane con probabilità di successo uguale a 0.35.

```
sum(dbinom(0:10, 40, 0.35))  
[1] 0.1214919  
pnorm(10.5, 40 * 0.35, sqrt(40 * 0.35 * 0.65))  
[1] 0.1229758
```

Si noti come nell'approssimazione alla normale, utilizzando il comando `pnorm()`, il valore $k = 10$ sia stato corretto per una frazione pari ad $1/2$.

Inferenze per le proporzioni

- Le procedure di inferenza statistica per le proporzioni sono analoghe a quelle per le medie.
- Impareremo a costruire l'intervallo di confidenza per una proporzione e a usare il test per una proporzione e per la differenza tra due proporzioni.
- In seguito ci occuperemo del test di ipotesi per più di due proporzioni.
- Dato che in psicologia è comune osservare dati dicotomici (dati che assumono due sole modalità), le procedure di inferenza per le proporzioni si usano di frequente.

alcuni esempi

Singola proporzione. In un sondaggio svoltosi nel 1995, il 53.5% di 959 votanti del Quebec ha affermato che avrebbe votato 'sì' al referendum indipendentista svoltosi 5 giorni dopo.

- Lasciando da parte la possibilità di errori estranei al processo di campionamento, possiamo concludere che 5 giorni prima del referendum più della metà degli elettori aveva intenzione di votare 'sì' al referendum?

Due proporzioni. Due mesi prima, il 45.1% di un campione di 822 votanti aveva manifestato l'intenzione di votare 'sì'. La differenza tra le proporzioni dei due campioni è $0.535 - 0.451 = 0.084$ e dunque il sostegno per il 'sì' è più alto dell'8.4% nel secondo sondaggio.

- Possiamo concludere che, nel periodo di due mesi intercorso tra i due sondaggi, il supporto per il 'sì' è aumentato?

Più di due proporzioni. 1. In un sondaggio condotto da un primo istituto di ricerca, il 52.4% di 865 votanti ha affermato di avere intenzione di votare 'sì'. 2. Un secondo istituto di ricerca riporta che il 53.5% di 959 votanti ha affermato di avere intenzione di votare 'sì'. 3. Un terzo istituto di ricerca riporta che il 53.1% di 884 votanti ha affermato di avere intenzione di votare 'sì'.

- Queste differenze suggeriscono l'esistenza di errori sistematici nei risultati degli istituti di ricerca, oppure possono essere imputate alle variazioni dovute al campionamento?

Proporzione campionaria

Proporzione campionaria

La **proporzione di casi nella popolazione** che esibiscono una data caratteristica è rappresentata dalla lettera π .

La corrispondente **proporzione nel campione** è

$$\hat{\pi} = \frac{\text{numero di "successi" nel campione}}{\text{numero di osservazioni nel campione}}$$

laddove un "successo" è uno dei due possibili esiti di un evento, come per esempio avere intenzione di votare 'sì' al referendum.

Distribuzione campionaria di $\hat{\pi}$

- Quali sono le proprietà di $\hat{\pi}$ quale stimatore della proporzione di casi π nella popolazione?

Il numero di successi X in n prove segue la **distribuzione binomiale**.

Dal momento che $\hat{\pi} = \frac{X}{n}$, la sua distribuzione campionaria sarà

$$P\left(\hat{\pi} = \frac{k}{n}\right) = P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$$

Approssimazione normale

Per un campione casuale semplice di grandi dimensioni (oltre le 200 unità) estratto da una popolazione di dimensioni molto maggiori è conveniente usare l'**approssimazione normale alla distribuzione binomiale**.

- La distribuzione campionaria di $\hat{\pi}$ è approssimativamente normale.
- L'approssimazione migliora al crescere delle dimensioni n del campione ed è tanto migliore quanto più la proporzione di casi π nella popolazione è simile a $\pi = 0.5$.

Valore atteso di $\hat{\pi}$

- consideriamo k "successi", in n prove, il cui modello probabilistico corrisponde ad una distribuzione discreta binomiale.
- Il **valore atteso** della distribuzione campionaria di $\hat{\pi} = \frac{k}{n}$ è uguale a π .

$$E(\hat{\pi}) = E\left(k \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}E(k) = \frac{1}{n}np = \pi$$

- Ovvero, $\hat{\pi}$ è uno stimatore non distorto di π .

Deviazione standard di π

- La **deviazione standard** della distribuzione campionaria di $\hat{\pi}$ dipende da π ed è uguale a:

$$\begin{aligned}\sqrt{\text{Var}(\hat{\pi})} &= \sqrt{\text{Var}\left(\frac{1}{n}k\right)} = \sqrt{\frac{1}{n^2}\text{Var}(k)} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{n^2}np(1-p)} = \\ &= \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\end{aligned}$$

Approssimazione normale

Si notino i seguenti fatti.

- Dato che n è al denominatore, la variabilità di $\hat{\pi}$ diminuisce al crescere della numerosità del campione.
- Essendo n all'interno della radice quadrata, per diminuire la deviazione standard di $\hat{\pi}$ di un fattore di due dobbiamo aumentare di quattro volte la numerosità del campione.
- Tenendo fisso n , la deviazione standard di $\hat{\pi}$ assume il suo valore massimo quando $\pi = 0.5$ (e quindi $\pi(1-\pi) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$).

Approssimazione normale

Due utili regole forniscono le basi per l'inferenza statistica per le proporzioni.

- La distribuzione normale fornisce una approssimazione appropriata alla distribuzione campionaria di $\hat{\pi}$ quando due condizioni sono soddisfatte.
 1. $n\pi \geq 10$ e $n(1-\pi) \geq 10$
 2. La deviazione standard di $\hat{\pi}$ è ben approssimata da $\sqrt{\pi(1-\pi)/n}$ quando la popolazione è almeno 10 volte più grande del campione. Questa condizione è quasi sempre soddisfatta.

- I risultati precedenti non possono essere direttamente usati in quanto, non conoscendo la proporzione della popolazione π , non possiamo calcolare la deviazione standard di $\hat{\pi}$.
- È quindi necessario sostituire alla deviazione standard di $\hat{\pi}$ una sua stima, l'**errore standard stimato** di $\hat{\pi}$.
- Per fare questo, utilizziamo $\hat{\pi}$ in luogo di π nella formula della deviazione standard di $\hat{\pi}$:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}} = \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}}$$

Intervallo di confidenza

Intervallo di confidenza

L'intervallo di confidenza per una proporzione π avrà dunque la forma

$$\hat{\pi} \pm z^* \hat{\sigma}_{\hat{\pi}}$$

dove z^* è il valore critico della distribuzione normale standardizzata al livello $(1 - \alpha)$.

- Per un livello di confidenza al 95%, $z^* = 1.96$.

Intervallo di confidenza

Illustrazione

Consideriamo nuovamente il sondaggio in cui, 5 giorni prima del referendum independentista del 1995, il 53.5% di 959 votanti del Quebec ha affermato che avrebbe votato 'sì'.

- Costruiamo l'intervallo di confidenza al 95% della proporzione π di individui nella popolazione che intendono votare 'sì':

$$\hat{\pi} = \frac{513}{959} = 0.535$$
$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}} = \sqrt{\frac{0.535(1 - 0.535)}{959}} = 0.0161$$

- al livello di confidenza $1 - \alpha = 0.95$, per π si ha

$$\begin{aligned} \hat{\pi} \pm z^* \hat{\sigma}_{\hat{\pi}} &= 0.535 \pm 1.96 \times 0.0161 \\ &= 0.535 \pm 0.032 \\ &= (0.503; 0.567) \end{aligned}$$

- possiamo quindi scrivere

$$P(0.503 \leq \pi \leq 0.567) = 0.95$$

Interpretazione dell'intervallo di confidenza

La probabilità $1 - \alpha$ dell'intervallo di confidenza per π ha un significato identico a quello della probabilità dell'intervallo di confidenza per μ :

- se dalla popolazione di votanti del Quebec venissero estratti tutti i possibili campioni di numerosità $n = 959$ e venissero costruiti tutti i possibili intervalli di confidenza per π **usando la procedura sopra definita**:
- una frazione uguale a $1 - \alpha$ comprenderebbe il valore reale di π e
- la rimanente frazione α non lo comprenderebbe.

Intervallo di confidenza per π con R

- In R l'intervallo di confidenza per π si può calcolare nel modo seguente:

```
pihat <- 513 / 959
n <- 959
pihat + c(-1, 1)*qnorm(p = 0.975) * sqrt((pihat*(1 - pihat))/n)
## [1] 0.5033643 0.5665002
```

- oppure, più semplicemente, (sc)caricando la libreria **Hmisc**


```
library(Hmisc)
binconf(x=513, n=959, method='asymptotic')
## PointEst Lower Upper
## 0.5349322 0.5033643 0.5665002
```

laddove `method='asymptotic'` specifica l'uso della distribuzione normale, come nella discussione precedente.

Interpretazione dell'intervallo di confidenza


Non: 2,362,648 **50.58%**

Oui: 2,308,360 **49.42%**



Simulazione.

- 100 campioni casuali, di ampiezza $n = 959$, vengono estratti da una popolazione con $P("SI") = \pi = 0.4942$. [Ovviamente $P("NO") = 1 - \pi = 0.5058$]
- In ciascun campione si stima un intervallo di fiducia al 95% per la proporzione π
- Ci attendiamo una proporzione di (circa) 5 intervalli su 100 che non contengono la vera $\pi = 0.4942$ nota.



Test per una proporzione campionaria

Test per una proporzione

- L'ipotesi nulla

$$H_0 : \pi = \pi_0$$

specifica un valore π_0 per il parametro sconosciuto π .

- Dato che il test viene calcolato supponendo vera l'ipotesi nulla H_0 , π_0 può essere usato in luogo di π per stimare la deviazione standard di $\hat{\pi}$:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}} = \sqrt{\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n}}$$

Test per una proporzione

Sotto H_0 , dunque, la statistica test diventa:

$$z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n}}}$$

Se H_0 è vera, z seguirà la distribuzione normale standardizzata.

Test per una proporzione

- Per trovare il p -valore della statistica test dobbiamo specificare un'ipotesi alternativa H_a .
- L'ipotesi alternativa può essere **bilaterale**

$$H_a : \pi \neq \pi_0$$

o **unilaterale**

$$H_a : \pi < \pi_0 \quad \text{oppure} \quad H_a : \pi > \pi_0$$

Test per una proporzione

Illustrazione

Consideriamo nuovamente i dati del sondaggio esaminato in precedenza e verifichiamo l'ipotesi nulla $H_0 : \pi = 0.5$ contro l'alternativa (unilaterale, destra) che il 'sì' sia maggioritario, $H_a : \pi > 0.5$.

La statistica test assume il valore:

$$z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n}}} = \frac{0.535 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1 - 0.5)}{959}}} = 2.17$$

Con un livello di significatività $\alpha = 0.05$ (assumendoci quindi questa probabilità per un errore di I tipo), il valore critico è $z_{\alpha=0.05} = 1.645 < 2.17$.


Test per una proporzione

Poiché il p -valore della statistica test è basso (< 0.05), si rifiuta l'ipotesi nulla di uguaglianza degli orientamenti di voto:

possiamo essere ragionevolmente certi che a cinque giorni dal referendum la maggioranza dei votanti era orientata per il 'sì'.

Test per una proporzione

```
1-pnorm(2.17)
## [1] 0.01500342 # p-valore unilaterale (destro)
```



Test per una proporzione

- Se avessimo specificato un'ipotesi alternativa bilaterale $H_a : \pi \neq 0.5$ (potrebbe essere in vantaggio sia il 'sì' che il 'no'), il p -valore sarebbe stato

$$P = 2 \times 0.015 = 0.030$$

- Se avessimo specificato l'ipotesi alternativa $H_a : \pi < 0.5$ (il 'no' è in vantaggio), avremmo ottenuto

$$P = 1 - 0.015 = 0.985$$

dato che $H_0 : \pi \geq 0.5$ sarebbe andata nella direzione del nostro dato campionario $\hat{\pi} = 0.535$

Navigation icons

Navigation icons

Test per una proporzione con R

In R il test può essere eseguito nel modo seguente:

```
prop.test(513, 959, correct=F, alternative = "greater")
```

```
1-sample proportions test without continuity correction
```

```
data: 513 out of 959, null probability 0.5
X-squared = 4.6809, df = 1, p-value = 0.01525
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5
95 percent confidence interval:
 0.5083784 1.0000000
sample estimates:
      p
0.5349322
```

Navigation icons

Test per una proporzione con R

Facendo i calcoli esatti

```
z<-(513/959-0.5)/sqrt(0.25/959)
z
## [1] 2.163543
1-pnorm(z)
## [1] 0.01524973 # p-valore per il z-test
```

ed essendo $\chi^2_{\nu=1} = z^2$, otteniamo l'output della funzione `prop.test`:

```
chi_1<-z^2
chi_1
## [1] 4.680918
( 1-pchisq(chi_1,df=1) )/2 ## dal momento che
## esistono due valori: +z e -z
## [1] 0.01524973
```

Navigation icons

Test per una proporzione con R

Per un test bilaterale avremo:

```
prop.test(513, 959, correct=F)
```

```
1-sample proportions test without continuity correction
```

```
data: 513 out of 959, null probability 0.5
X-squared = 4.6809, df = 1, p-value = 0.0305
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.5032876 0.5662981
sample estimates:
      p
0.5349322
```



Condizioni di validità

Affinché siano valide le inferenze statistiche su π basate sulla distribuzione normale è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni

- I dati devono essere un campione casuale semplice estratto dalla popolazione di interesse.
- La popolazione deve essere almeno 10 volte più grande del campione.
- Per l'intervallo di confidenza, è necessario che $n\hat{\pi} \geq 10$ e $n(1 - \hat{\pi}) \geq 10$
- Per il test dell'ipotesi $H_0 : \pi = \pi_0$, è necessario che $n\pi_0 \geq 10$ e $n(1 - \pi_0) \geq 10$



Condizioni di validità

- Nel caso dell'esempio sul referendum del Quebec, le dimensioni del campione $n = 959$ sono sicuramente molto minori di 1/10 della popolazione, ma probabilmente il sondaggio non era basato su un campionamento casuale semplice.
- Per sapere se questo invalida l'intervallo di confidenza e il test di ipotesi che abbiamo calcolato dovremmo conoscere maggiori dettagli sulle procedure di campionamento utilizzate.



Condizioni di validità

- Per l'intervallo di confidenza, $n\hat{\pi} = 959(0.535) = 513$ e $n(1 - \hat{\pi}) = 959(1 - 0.535) = 446$ sono molto maggiori del valore richiesto di 10.
- Per il test dell'ipotesi $H_0 : \pi = \pi_0$, $n\pi_0 = n(1 - \pi_0) = 959(0.5) = 479.5 \gg 10$.



Numerosità del campione

- Consideriamo ora la numerosità del campione necessaria per la stima di una proporzione con errore prefissato.
- L'intervallo di confidenza per una proporzione al livello $(1 - \alpha)$ è

$$\hat{\pi} \pm z^* \hat{\sigma}_{\hat{\pi}}$$

Numerosità del campione

Numerosità del campione

- Quanti individui dobbiamo considerare per ottenere una stima campionaria della proporzione π con un errore che non superi la quantità m prefissata, alla probabilità α ?
- La differenza massima rispetto a $\hat{\pi}$ è

$$m = z^* \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}}$$

dove z^* è il valore critico della distribuzione normale standardizzata al livello di confidenza $1 - \alpha$ e $\hat{\pi}$ è la proporzione di "successi" nel campione.


- Prima di raccogliere i dati, il valore di $\hat{\pi}$ è ignoto e, quindi, non è possibile risolvere l'equazione precedente per n al fine di determinare le dimensioni del campione.
- Una soluzione è quella di utilizzare un valore approssimativo π^* al posto di $\hat{\pi}$ per giungere alla seguente formula:

$$n = \left(\frac{z^*}{m}\right)^2 \pi^* (1 - \pi^*)$$

dove il valore π^* è desunto da ricerche precedenti (per es., un sondaggio precedente) o dalla conoscenza del fenomeno studiato.

- In alternativa, è possibile porsi nella situazione sperimentale peggiore, cioè con la varianza massima. Poiché la varianza è massima quando $\pi = 0.5$

$$\begin{aligned}\pi^*(1 - \pi^*) &= 0.3(1 - 0.3) = 0.21 \\ &= 0.5(1 - 0.5) = 0.25 \\ &= 0.7(1 - 0.7) = 0.21\end{aligned}$$



- la formula precedente diventa

$$n = \left(\frac{z^*}{m}\right)^2 0.5 \times 0.5$$

Illustrazione

Illustrazione

Quanti votanti del Quebec è necessario intervistare per ottenere una stima di π che abbia un errore massimo di 0.01 (attorno alla $\hat{\pi}$ campionaria) con un rischio di sbagliare $\alpha = 0.05$?

Ponendo $\pi^* = 0.5$, il numero minimo di votanti da intervistare è

$$\begin{aligned}n &= \left(\frac{z^*}{m}\right)^2 \pi^*(1 - \pi^*) \\ &= \left(\frac{1.96}{0.01}\right)^2 0.25 = 9604 \approx 10000\end{aligned}$$

Differenza tra due proporzioni

Differenza tra due proporzioni

La notazione usata per confrontare due proporzioni provenienti da campioni indipendenti è simile a quella usata per confrontare due medie.

Popolazione	Dimensione del campione	Proporzione della popolazione	Proporzione del campione
1	n_1	π_1	$\hat{\pi}_1$
2	n_2	π_2	$\hat{\pi}_2$

Differenza tra due proporzioni

- La differenza tra le proporzioni dei due campioni $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ viene usata quale stimatore della differenza tra le proporzioni $\pi_1 - \pi_2$ nella popolazione.
- Come in precedenza, la distribuzione campionaria di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ fornisce le basi per l'inferenza statistica.

Differenza tra due proporzioni

Si notino i seguenti tre fatti:

1. La differenza tra le proporzioni dei campioni $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è uno stimatore non distorto della differenza tra le proporzioni $\pi_1 - \pi_2$ nella popolazione.

In altri termini, $\pi_1 - \pi_2$ è la media della distribuzione campionaria di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$.

Differenza tra due proporzioni

2. La varianza di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è uguale alla somma delle varianze di $\hat{\pi}_1$ e $\hat{\pi}_2$:

$$\sigma_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2}^2 = \frac{\pi_1(1 - \pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1 - \pi_2)}{n_2}$$

Quindi, la deviazione standard di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è

$$\sigma_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} = \sqrt{\frac{\pi_1(1 - \pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1 - \pi_2)}{n_2}}$$

Differenza tra due proporzioni

3. Quando le dimensioni dei due campioni n_1 e n_2 sono sufficientemente grandi, la distribuzione campionaria di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è approssimativamente normale:

$$\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2 \sim N \left(\pi_1 - \pi_2, \sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}} \right)$$

Intervallo di confidenza per $\pi_1 - \pi_2$

- Come in precedenza, non possiamo utilizzare direttamente la distribuzione campionaria di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ dato che la deviazione standard di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ dipende dalle proporzioni sconosciute π_1 e π_2 nella popolazione.
- La soluzione è nuovamente quella di calcolare l'errore standard stimato di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ utilizzando $\hat{\pi}_1$ e $\hat{\pi}_2$ quali stime di π_1 e π_2 .

$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} = \sqrt{\frac{\hat{\pi}_1(1-\hat{\pi}_1)}{n_1} + \frac{\hat{\pi}_2(1-\hat{\pi}_2)}{n_2}}$$

Intervallo di confidenza per $\pi_1 - \pi_2$

L'intervallo di confidenza per $\pi_1 - \pi_2$ al livello $1 - \alpha$ è dunque

$$(\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2) \pm z^* \hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2}$$

dove z^* è il percentile di una variabile normale standardizzata z tale che $P(-z^* \leq z \leq z^*) = 1 - \alpha$

Intervallo di confidenza per $\pi_1 - \pi_2$

Illustrazione

Si costruisca l'intervallo di confidenza al 95% per la differenza tra due proporzioni utilizzando i risultati di due dei sondaggi presentati in precedenza.

Popolazione	Descrizione della popolazione	Proporzione del campione	Dimensione del campione
1	Votanti 25 ott.	$\hat{\pi}_1 = 0.535$	$n_1 = 959$
2	Votanti 12 sett.	$\hat{\pi}_2 = 0.451$	$n_2 = 822$

L'errore standard stimato di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} &= \sqrt{\frac{0.535(1-0.535)}{959} + \frac{0.451(1-0.451)}{822}} \\ &= 0.0237 \end{aligned}$$

Intervallo di confidenza per $\pi_1 - \pi_2$

L'intervallo di confidenza al 95% per $\pi_1 - \pi_2$ diventa

$$\begin{aligned} & (\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2) \pm z^* \hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} \\ & ((0.535 - 0.451)) \pm 1.96 \times 0.0237 \\ & 0.084 \pm 0.046 = (0.038, 0.130) \end{aligned}$$

Test di ipotesi per $\pi_1 - \pi_2$

Test di ipotesi per $\pi_1 - \pi_2$

- Come nel caso di una singola proporzione, la stima dell'errore standard di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ nel test di ipotesi è leggermente diversa da quella usata per la costruzione degli intervalli di confidenza.
- L'ipotesi nulla per la differenza tra due proporzioni è $H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0$ o, in maniera equivalente, $H_0 : \pi_1 = \pi_2$.
- L'ipotesi alternativa può essere unilaterale o bilaterale, a seconda di ciò che ci aspettiamo a proposito della differenza tra $\pi_1 - \pi_2$.

Test di ipotesi per $\pi_1 - \pi_2$

Dato che l'ipotesi nulla afferma che π_1 e π_2 sono uguali, per calcolare l'errore standard di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ possiamo combinare i dati dei due campioni ottenendo così una stima migliore della proporzione comune π nella popolazione.

La stima $\hat{\pi}$ è data dal rapporto tra la somma dei successi in entrambi i campioni e la somma del numero di osservazioni in ciascun campione.

L'**Errore standard stimato** di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} = \sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

La **statistica di test** per l'ipotesi nulla $H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0$ è

$$z = \frac{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2}{\hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2}}$$

e segue approssimativamente la distribuzione normale standardizzata se l'ipotesi nulla è vera.

Illustrazione

Nell'esempio dei due sondaggi sull'indipendenza del Quebec, 513 su 959 votanti ($\hat{\pi}_1 = 0.535$) hanno manifestato l'intenzione di votare 'sì' nel sondaggio del 25 ottobre, mentre solo 371 su 822 votanti ($\hat{\pi}_2 = 0.451$) hanno manifestato l'intenzione di votare 'sì' nel sondaggio del 12 settembre.

- Verifichiamo l'ipotesi nulla secondo cui non c'è stato un cambiamento nelle intenzioni di voto, $H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0$, verso l'ipotesi alternativa secondo cui l'orientamento degli elettori è mutato, $H_a : \pi_1 - \pi_2 \neq 0$.

- Una stima della proporzione comune π è data da

$$\hat{\pi} = \frac{513 + 371}{959 + 822} = 0.496$$

- L'errore standard stimato di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2} = \sqrt{0.496(1 - 0.496) \left(\frac{1}{959} + \frac{1}{822} \right)} = 0.0238$$

- La statistica di test per l'ipotesi nulla $H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0$ è

$$z = \frac{0.535 - 0.451}{0.0238} = 3.53$$

a cui è associato il p -valore $P = 2 \times 0.0002 = 0.0004$

- Le evidenze empiriche sono a sostegno dell'ipotesi alternativa (bilaterale), secondo cui l'orientamento di voto degli elettori è mutato.

Possiamo utilizzare la funzione `prop.test()` di R per un test sulla differenza tra due proporzioni, per saggiare l'ipotesi $H_0 : \pi_1 = \pi_2$:

```
x <- c(513,371)
n <- c(959, 822)
prop.test(x,n, correct=F)
```

```
2-sample test for equality of proportions
without continuity correction
```

```
data: x out of n
X-squared = 12.3726, df = 1, p-value = 0.0004357
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 0.03718502 0.13000303
sample estimates:
 prop 1    prop 2
0.5349322 0.4513382
```

- p-value** è il livello di significatività osservato.
- Poiché il p -valore è molto basso (< 0.001), si rifiuta l'ipotesi di uguaglianza delle proporzioni fra i due gruppi.
- La probabilità di errore di I tipo è quindi $\alpha < 0.001$

La distribuzione campionaria di $\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2$ può essere approssimata alla normale standardizzata se le seguenti condizioni risultano soddisfatte.

- Due campioni **indipendenti** casuali semplici vengono estratti dalle rispettive popolazioni.
- Ciascuna popolazione è almeno 10 volte più grande del campione.
- Per gli intervalli di confidenza, ciascuno dei termini $n_1\hat{\pi}_1$, $n_1(1 - \hat{\pi}_1)$ e $n_2\hat{\pi}_2$, $n_2(1 - \hat{\pi}_2)$ deve essere maggiore di 5.
- Per il test di ipotesi, ciascuno dei termini $n_1\hat{\pi}$, $n_1(1 - \hat{\pi})$ e $n_2\hat{\pi}$, $n_2(1 - \hat{\pi})$ deve essere maggiore di 5.

Si noti che, a parte il requisito del campionamento casuale semplice e indipendente, tali requisiti sono facilmente soddisfatti.