

- Fungal phylogeny





Figure 17.17A


ZIGOMICETI

- Saprofiti e parassiti - Mucorali
- Spore non mobili
- Non dipendono dall' H₂O per la dispersione
- Ife cenocitiche (= senza setti) (!!)
- Riproduzione sessuata con produzione di sporangi (strutture bulbose a forma di giogo (ζυγος) = **zigosporangi** ancorati al substrato da **rizoidi**



Struktur *Rhizopus oligosporus*


Zigomiceti: ciclo riproduttivo sessuale



Meiosis during germination

Cariogamia dei nuclei n

Fertilization



Zigospora matura (con involucro spinoso), nuclei 2n


Mature zygosporangium
Young zygosporangium (2n)

Gametangia (n)

Gametangio (= gametocisti) plurinucleato, separato da setto dal resto del micelio → plasmogamia

GLOMEROMICETI

- **AMF**: arbuscular mycorrhizal fungi
- La maggior parte sono funghi ipogei
- Micelio cenocitico (!!)
- Riproduzione a sessuata via **blastospore** (produced by budding)



ASCOMICETI (PHYLUM ASCOMYCOTA)


30-40.000 specie a livello mondiale


Tre gruppi principali:

Pezizomycotina: taxa con micelio filamentoso e carpofori di varia forma;



Saccharomycotina: producono solo eccezionalmente un micelio, forma unicellulare (lieviti !!!)

Taphrinomycotina: dimorphic! producono una forma unicellulare (lieviti) ed una filamentosa







- Iife (se presenti) settate con setti trasversali perforati
- Micelio con cellule uni- o binucleate
- Produzione di meiospore aploidi all'interno di un sacco, chiamato **ASCO**




aschi in **APOTECI**
(discomiceti)



aschi in **PERITECI** (pirenomiceti
& loculomiceti)





Help keep Alberta Dutch Elm Disease free.

**DON'T PRUNE ELM TREES
FROM APRIL 1 TO SEPT 30**




Government
of Alberta

1-877-837-ELMS
www.stopded.org



Graphium (Ophiostoma ulmi è più aggressivo di ***O. novo-ulmi***) agenti eziologici della grafiosi dell'olmo (elm dutch disease)

Cryphonectria parasitica
(su *Castanea sativa*);



Fusarium oxysporum (su *Musa* sp.)







Claviceps purpurea

- segale cornuta
- ergot (=sperone in Francese)
- Alcaloidi vasocostrittori, recettore serotonina (SNC); resistenti ad alte temperature
→ ergotismo (pane di segala)





Pertusaria dispar (lichene dall'Italia)




Tuber oregonensis dagli U.S.A.



Ascomiceti: ciclo riproduttivo sessuale


formazione crozier con mitosi




fusione dei nuclei n



Asco con 8 nuclei (!!!)





crozier

Zygote nuclei, formed when two nuclei unite. They undergo meiosis prior to the development of ascospores.

fertilization

$2n$

$n + n$

n

meiosis

hymenium

sterile hyphae

ascogenous hyphae

nuclei pair



asci
ascospores

spore


spore

ascogonium
antheridium


Lieviti: funghi monocellulari che si riproducono principalmente per gemmazione. Alcuni possono assumere la forma filamentosa, e.g. black yeast (*Hotaea*, *Aureobasidium*)




*Hotaea
werneckii*



*Saccaromyces
spp.*



LIEVITI (Saccharomyces)



Gene per la resistenza antibiotico (Ampicillina)

Sito di origine per replicazione DNA



Saccharomyces cerevisiae :

- lievito (ascomycetous yeast)
- anaerobio facoltativo → energia ricavata
1. processo aerobico, 2. fermentazione
malo-alcolica (soprattutto in
Schizosaccharomyces, acido malico in alcol
etilico: $\text{COOH-CHOH-CH}_2\text{-COOH} \rightarrow \text{CH}_2\text{OH-CH}_3 + 2\text{CO}_2$)
- Glucosio, maltosio, fruttosio e trealosio
come substrati organici
- Ammonio (NH_4^+) ed urea ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) come
fonti di azoto
- Organismo modello
- Genoma sequenziato nel 1996, 23% dei
geni condivisi con l' uomo
- Tempo di moltiplicazione 1,5-2 ore a 30°C
- Meiosi (**n !!!**) mating types α ed a
- Uso industriale e per studi genetici




Leland Hartwell, premio Nobel 2001 per la Fisiologia e la Medicina grazie agli studi sul **ciclo cellulare** usando come sistema modello *S. cerevisiae*.

Tra il 1970 e il 1971, egli isolò cellule di lievito in cui i singoli geni che controllano il ciclo cellulare erano mutati

→ identificò specifici geni direttamente coinvolti nel controllo del ciclo cellulare, **CDC-genes** (cell division cycle genes"). Il **CDC28**, controlla il primo passo nella progressione di eventi della fase G1 del ciclo cellulare (la funzione "start").

→ identificò il ruolo dei specifici checkpoints della mitosi.

Lieviti in ingegneria genetica → trasformati per la produzione di sostanze secondarie direttamente *in vitro*.





TAXOLO, scoperto nel 1967 da Wall e Wani, che lo isolarono dalla corteccia del tasso del Pacifico (*Taxus brevifolia*).



Taxolo = **paxene** o **paclitaxel**, inibisce la mitosi cellulare (interazione con microtubuli, alterazione dell'equilibrio di polimerizzazione/ depolimerizzazione) → utilizzo in terapie anti cancro (neoplasie avanzate di carcinoma del polmone, dell'ovaio, della mammella, della regione testa-collo e delle forme avanzate del sarcoma di Kaposi)

100 mg / kg di scorza → abbattimenti considerati di popolazioni naturali di *Taxus brevifolia* → estrazione possibile anche dalle foglie, con necessità di eliminare altri alcaloidi presenti e fortemente tossici

Via metabolica del taxolo clonata in lievito fallito in *Agrobacterium* ed *Arabidopsis thaliana*.



BASIDIOMICETI



Circa **30-35.000 specie**

Tre gruppi principali (subphyla):

- **Agaricomycotina:** con basidiocarpi (=corpi fruttiferi) con un tessuto sporigeno (imenio) o meno.
- **Pucciniomycotina:** senza basidiocarpi, con basidi raggruppati in masserelle diffuse (sori) a ricoprire la superficie del micelio o del substrato, cicli riproduttivi molto complessi, parassiti di piante e animali.
- **Ustilagomycotina:** senza basidiocarpi, parassiti tumorigeni delle piante.

... la maggioranza dei funghi che raccogliamo e mangiamo: boleti, galletti, ovoli, manine, russole, chiodini, prataioli...



- Produzione di monoterpeni dall'aroma dolce (linalolo) o di rosa (geraniolo e nerolo; e.g. *Trametes odorata*); usati nella produzione del **mentolo**.



- Storicamente conosciuti per le loro proprietà medicinali, e.g. *Ganoderma lucidum*, *Trametes versicolor*, *Fomes fomentarius*; più di **270 specie** utilizzate nella medicina e coltivate a livello industriale.






- Demolitori di lignina («marciume bianco») → utilizzo a livello industriale (industria della carta), e ambientale (processi di biorimediazione).




Basidiocarpi:

- corpi fruttiferi in cui vengono prodotte le **basidiospore**;
- morfologia ed anatomia complesse
- effimeri, ma esistono anche forme perennanti.





- I miceli aploidi si fondono = plasmogamia,
- Cariogamia ritardata, i 2 nuclei compatibili rimangono indipendenti;
- successiva ripetuta divisione di questa cellula binucleata forma un **micelio dicarionico** o **DIKARYON**, resistente, vive a lungo.



Nucleo aploide




divisione a fibbia... ...mitosi e migrazione dei nuclei




...fusione della fibbia con la cellula che l' ha generata...

...mantenimento del dikaryon e sviluppo del basidio ...

Basidiomiceti: ciclo riproduttivo sessuale




Agaricales




Exobasidiales




Tulasnellales




Tremellales




Auriculariales



Dacrymycetales




„Gasteromycetes“




Pucciniales




Ustilaginales




teliospores =
probasidia



Ascomycota



Basidiomycota



Pucciniomiceti (ruggini)



Colpiscono le colture in modo devastante, sono altamente specializzate → è molto difficile combatterli




Spesso vivono su più ospiti contemporaneamente ed in momenti diversi dei loro cicli di vita (...complicatissimi!).



e.g. ***Puccinia graminis***, ruggine del grano → annerimento del culmo del grano ed altri cereali (orzo, avena, segale). Plinio il Vecchio (I° sec. d.C.) la descriveva come “*la peggiore infestazione dei raccolti*”, causa di moltissime carestie.



Ustilagomiceti (carboni)




e.g. *Ustilago maydis* (corn smut),
parassita del mais, rimozione e
distruzione delle colture infettate.



(a) Due **basidiospore aploidi** giungono sul mais dove avviene la **plasmogamia** (b) Il **micelio dicarionico** si sviluppa nelle infiorescenze maschili (c) e femminili (d), formando una massa di **teliospore dicarioniche** (e), nelle quali successivamente avviene la **cariogamia** (f); dopo la **meiosi** (g) le **teliospore** germinano (h) dando origine a basidi che producono **spore gemmanti** (i).

Huitlacoche: in Messico le galle di *U. maydis* vengo vendute come delicatezza culinaria







Exobasidium rhododendri




Basidiomycetes (*Tremella* sp.)
parasitic on lichens



3 mm

MYXOMICETA




•Slime moulds

- ca. 500 species ampiamente distribuite (no endemismi!)
- Funghi perché producono spore in sporangi
- Protisti perché morfologicamente nel loro stato assimilativo assomigliano ad amebe; fagocitosi di batteri (→ vacuolo digestivo);
- mancano di parete cellulare → **myxoamoeba**
- formazione dello sporangio indotta da mancanza di cibo o presenza di luce

Mycetozoa (DeBary 1887)




(a)




(b)




(c)



(d)





(e)



(f)







Mixomiceti: ciclo riproduttivo sessuale