


Clausole di Horn e computabilità

Eugenio G. Omodeo Trieste, 13–14/04/2021



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

(Alan Mathison Turing, 1912–1954)

- Di che si occupa la teoria della computabilità
-
-
-



- Di che si occupa la teoria della computabilità
- Un'esplicitazione del concetto di funzione calcolabile
-
-



- Di che si occupa la teoria della computabilità
- Un'esplicitazione del concetto di funzione calcolabile
- Completezza di Turing della programmaz. tramite clausole di Horn
-



- Di che si occupa la teoria della computabilità
- Un'esplicitazione del concetto di funzione calcolabile
- Completezza di Turing della programmaz. tramite clausole di Horn
- Indecidibilità della logica predicativa del 1^o ordine





Di che si occupa
la computabilità ?

(Mair Eluned Thomas Russell-Jones, 1917–2013)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

“Computability theory [...] is the theory of computation obtained when limitations of space and time are deliberately ignored.”

[Davis et al.(1994), pag. 237]



“Computability theory [· · ·] is the theory of computation obtained when limitations of space and time are deliberately ignored.”

[Davis et al.(1994), pag. 237]

“Computability theory (also called recursion theory) studies the class of partially computable functions.”

[Davis et al.(1994), pag. 31]



“Computability theory [· · ·] is the theory of computation obtained when limitations of space and time are deliberately ignored.”

[Davis et al.(1994), pag. 237]

“Computability theory (also called recursion theory) studies the class of partially computable functions.”

[Davis et al.(1994), pag. 31]





WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By **A. M. TURING**

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]


1. Computing machines.
2. Definitions.

Automatic machines.
Computing machines.
Circle and circle-free numbers.
Computable sequences and numbers.

3. Examples of computing machines.
4. Abbreviated tables

Further examples.

5. Enumeration of computable sequences.
6. The universal computing machine.
7. Detailed description of the universal machine.
8. Application of the diagonal process.
9. The extent of the computable numbers.
10. Examples of large classes of numbers which are computable.
11. Application to the Entscheidungsproblem.



Quando una funzione g è definita su un sottoinsieme di \mathbb{N}^a e assume valori in \mathbb{N} , ciò viene indicato così:

$$g : \mathbb{N}^a \longrightarrow \mathbb{N}.$$

Diciamo che tale funzione è *parziale*, di *arietà* a .



Quando una funzione g è definita su un sottoinsieme di \mathbb{N}^a e assume valori in \mathbb{N} , ciò viene indicato così:

$$g : \mathbb{N}^a \longrightarrow \mathbb{N}.$$

Diciamo che tale funzione è *parziale*, di *arietà* a .

Esempio: Qualsiasi polinomio

$$D \in \mathbb{Z}[k_1, \dots, k_a]$$

induce una funzione parziale g sulle a -uple

$$\langle n_1, \dots, n_a \rangle \in \mathbb{N}^a$$

secondo la regola:



Quando una funzione g è definita su un sottoinsieme di \mathbb{N}^a e assume valori in \mathbb{N} , ciò viene indicato così:

$$g : \mathbb{N}^a \rightarrow \mathbb{N}.$$

Diciamo che tale funzione è *parziale*, di *arità* a .

Esempio: Qualsiasi polinomio

$$D \in \mathbb{Z}[k_1, \dots, k_a]$$

induce una funzione parziale g sulle a -uple

$$\langle n_1, \dots, n_a \rangle \in \mathbb{N}^a$$

secondo la regola:

$$g(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} D(n_1, \dots, n_a) & \text{purché questo val. non sia negativo,} \\ \text{non definito} & \text{se invece è negativo} \end{cases}$$



Quando—come nel caso dei polinomi menzionato ora—i valori di una funzione sono *calcolabili*, al termine '*non definito*' possiamo attribuire il significato di un comportamento perpetuo. . .



Quando—come nel caso dei polinomi menzionato ora—i valori di una funzione sono *calcolabili*, al termine ‘*non definito*’ possiamo attribuire il significato di un comportamento perpetuo. . .

. . . non sempre desiderabile o intenzionale !



Quando—come nel caso dei polinomi menzionato ora—i valori di una funzione sono *calcolabili*, al termine '*non definito*' possiamo attribuire il significato di un comportamento perpetuo. . .

. . . non sempre desiderabile o intenzionale !

;)



OCCORRE FAR DI NECESSITÀ VIRTÙ ?

Generalizzando l'esempio di prima: Sia

$$D(\underbrace{k_1, \dots, k_a}_{\text{coefficients}}, \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{indeterminates}})$$

un pol. a coefficienti in \mathbb{Z} nelle indeterminate



OCCORRE FAR DI NECESSITÀ VIRTÙ ?

Generalizzando l'esempio di prima: Sia

$$D(\underbrace{k_1, \dots, k_a}_{\substack{\text{parametri} \\ \text{formali}}}, \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{incognite}})$$

un pol. a coefficienti in \mathbb{Z} nelle indeterminate k_i e x_j .



OCCORRE FAR DI NECESSITÀ VIRTÙ ?

Generalizzando l'esempio di prima: Sia

$$D(\underbrace{k_1, \dots, k_a}_{\text{parametri formali}}, \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{incognite}})$$

un pol. a coefficienti in \mathbb{Z} nelle indeterminate k_i e x_j .

Quali sono le a -uple

$$\langle n_1, \dots, n_a \rangle \in \mathbb{N}^a$$

per le quali l'eq.

$$D(\underbrace{n_1, \dots, n_a}_{\text{parametri impostati}}, \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{incognite}}) = 0$$

ammette soluzione su \mathbb{N} ?



Almeno una delle seguenti 2 funzioni è calcolabile ?

$$\tilde{g}(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(n_1, \dots, n_a, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ & \text{ha sol. su } \mathbb{N}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Almeno una delle seguenti 2 funzioni è calcolabile ?

$$\tilde{g}(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(n_1, \dots, n_a, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ & \text{ha sol. su } \mathbb{N}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\hat{g}(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(n_1, \dots, n_a, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ & \text{ha sol. su } \mathbb{N}, \\ \text{indef.} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Almeno una delle seguenti 2 funzioni è calcolabile ?

$$\tilde{g}(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(n_1, \dots, n_a, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ & \text{ha sol. su } \mathbb{N}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\hat{g}(n_1, \dots, n_a) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(n_1, \dots, n_a, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ & \text{ha sol. su } \mathbb{N}, \\ \text{indef.} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La \hat{g} sí, certo, ma la \tilde{g} chissà...



UN *déjà vu* ?



UN déjà vu ?





Quanto *superficiale* (?) è l'affinità fra l'enumerazione di tutte le dimostrazioni di una teoria e la ricerca sistematica degli zeri di un polinomio diofanteo?



Hilbert

David Hilbert avanzò 23 problemi in occasione
del *Congresso internazionale dei matematici*
a Parigi, l'8 agosto 1900





Hilbert

David Hilbert avanzò 23 problemi in occasione
del *Congresso internazionale dei matematici*
a Parigi, l'8 agosto 1900

10. Entscheidung der Lösbarkeit einer diophantischen Gleichung Eine diophantische Gleichung mit irgendwelchen Unbekannten und mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten sei vorgelegt: *Man soll ein Verfahren angeben, nach welchem sich mittels einer endlichen Anzahl von Operationen entscheiden läßt, ob die Gleichung in ganzen rationalen Zahlen lösbar ist.*




*Hilbert*

David Hilbert avanzò 23 problemi in occasione
del *Congresso internazionale dei matematici*
a Parigi, l'8 agosto 1900

10. Determinazione della risolubilità di un'equazione diofantea

Data un'equazione diofantea in qualsiasi numero d'incognite e a coefficienti interi razionali: *Ideare un procedimento per mezzo del quale si possa stabilire, in un numero finito di operazioni, se l'equazione sia o no risolubile negli interi razionali.*





David Hilbert avanzò 23 problemi in occasione
del *Congresso internazionale dei matematici*
a Parigi, l'8 agosto 1900

(Ipazia, ca. 370 / 415 d.C.)

10. Determinazione della risolubilità di un'equazione diofantea

Data un'equazione diofantea in qualsiasi numero d'incognite e a coefficienti interi razionali: *Ideare un procedimento per mezzo del quale si possa stabilire, in un numero finito di operazioni, se l'equazione sia o no risolubile negli interi razionali.*





Un'esplicitaz.
del concetto di
funzione calcolabile



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Basic Result, Part I *By means of detailed combinatorial studies (see, for example, Turing [1937] and Kleene [1936a],) the proposed characterizations of Turing and of Kleene, as well as those of Church, Post, Markov, and certain others, were all shown to be equivalent; that is to say, exactly the same class of partial functions (and hence of total functions) is obtained in each case.*

Definition The functions falling within this class are called *recursive functions*. The partial functions of this class might, naturally, be termed “recursive partial functions.” It has become standard usage, however, to call them *partial recursive functions*.

These equivalence demonstrations can be generalized to show that over certain very broad families of enlargements of these formal characterizations the class of partial functions obtained remains unchanged. (For example, if we allow

[Rogers(1967), pag. 18]



Chiamiamo g *funzione ricorsiva generale* (sui numeri naturali)
 sse esiste una lista

$$g_0, \dots, g_M,$$

con M numero naturale qualsiasi e $g_M = g$, di funzioni

$$g_i : \mathbb{N}^{a_i} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tali che ogni $i = 0, \dots, M$ soddisfi almeno una delle sei condiz.





Funzioni iniziali:

- 1 g_i è la funzione $n \mapsto 0$ di arità $a_i = 1$ che manda ogni numero nello 0;





Funzioni iniziali:

- ① g_i è la funzione $n \mapsto 0$ di arità $a_i = 1$ che manda ogni numero nello 0;
- ② g_i è la funzione $n \mapsto n + 1$ di arità $a_i = 1$ che manda ciascun numero n nel suo successore immediato $n + 1$;





Funzioni iniziali:

- ① g_i è la funzione $n \mapsto 0$ di arità $a_i = 1$ che manda ogni numero nello 0;
- ② g_i è la funzione $n \mapsto n + 1$ di arità $a_i = 1$ che manda ciascun numero n nel suo successore immediato $n + 1$;
- ③ g_i è la funzione $\langle n_1, \dots, n_{a_i} \rangle \mapsto n_j$ di arità $a_i > 0$ che manda—per qualche j con $0 < j \leq a_i$ —ogni a_i -upla $\langle n_1, \dots, n_{a_i} \rangle$ di numeri nella j -sima componente, n_j ;





- ④ g_i è ottenuta per *composizione* da funzioni

$$g_h, g_{\ell_1}, \dots, g_{\ell_m}, \text{ con } h, \ell_1, \dots, \ell_m < i,$$

dove ciascuna delle g_{ℓ_k} ha arità uguale all'arietà a_i di g_i ,
mentre g_h ha arità $a_h = m$.





- ④ g_i è ottenuta per *composizione* da funzioni

$$g_h, g_{\ell_1}, \dots, g_{\ell_m}, \text{ con } h, \ell_1, \dots, \ell_m < i,$$

dove ciascuna delle g_{ℓ_k} ha arità uguale all'arietà a_i di g_i ,
mentre g_h ha arità $a_h = m$.

Ciò significa che se in $\langle n_1, \dots, n_{a_i} \rangle$ tutte le g_{ℓ_k} sono definite,
e definito è anche il valore

$$g_h \left(g_{\ell_1}(n_1, \dots, n_{a_i}), \dots, g_{\ell_m}(n_1, \dots, n_{a_i}) \right),$$

quest'ultimo verrà a coincidere con $g_i(n_1, \dots, n_{a_i})$;





- ④ g_i è ottenuta per *composizione* da funzioni

$$g_h, g_{l_1}, \dots, g_{l_m}, \text{ con } h, l_1, \dots, l_m < i,$$

dove ciascuna delle g_{l_k} ha arità uguale all'arietà a_i di g_i ,
mentre g_h ha arità $a_h = m$.

Ciò significa che se in $\langle n_1, \dots, n_{a_i} \rangle$ tutte le g_{l_k} sono definite,
e definito è anche il valore

$$g_h \left(g_{l_1}(n_1, \dots, n_{a_i}), \dots, g_{l_m}(n_1, \dots, n_{a_i}) \right),$$

quest'ultimo verrà a coincidere con $g_i(n_1, \dots, n_{a_i})$;
altrimenti $g_i(n_1, \dots, n_{a_i})$ rimarrà *non definito*;





- ⑤ g_i è ottenuta per **ricorsione primitiva** da funzioni g_h e g_ℓ , con $h, \ell < i$, dove le arità a_i, a_h, a_ℓ di i, h, ℓ sono così legate fra loro: $a_\ell = a_i + 1 = a_h + 2$. Cioè a dire, g_i risulta definita dalla ricorrenza

$$\begin{cases} g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, 0) & = g_h(n_1, \dots, n_{a_h}), \\ g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n+1) & = g_\ell\left(n_1, \dots, n_{a_h}, n, g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n)\right), \end{cases}$$





- ⑥ g_i è ottenuta per *ricorsione primitiva* da funzioni g_h e g_ℓ , con $h, \ell < i$, dove le arità a_i, a_h, a_ℓ di i, h, ℓ sono così legate fra loro: $a_\ell = a_i + 1 = a_h + 2$. Cioè a dire, g_i risulta definita dalla ricorrenza

$$\begin{cases} g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, 0) & = g_h(n_1, \dots, n_{a_h}), \\ g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n+1) & = g_\ell\left(n_1, \dots, n_{a_h}, n, g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n)\right), \end{cases}$$

che, per ogni a_h -upla $\langle n_1, \dots, n_{a_h} \rangle$ di numeri, consente di determinare il valore $g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, 0)$ sse $g_h(n_1, \dots, n_{a_h})$ è definito e, in tal caso, fornisce anche i valori $g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, m)$ per $m = 1, 2, 3, \dots$,





- ⑥ g_i è ottenuta per **ricorsione primitiva** da funzioni g_h e g_ℓ , con $h, \ell < i$, dove le arità a_i, a_h, a_ℓ di i, h, ℓ sono così legate fra loro: $a_\ell = a_i + 1 = a_h + 2$. Cioè a dire, g_i risulta definita dalla ricorrenza

$$\begin{cases} g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, 0) & = g_h(n_1, \dots, n_{a_h}), \\ g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n + 1) & = g_\ell\left(n_1, \dots, n_{a_h}, n, g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, n)\right), \end{cases}$$

che, per ogni a_h -upla $\langle n_1, \dots, n_{a_h} \rangle$ di numeri, consente di determinare il valore $g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, 0)$ sse $g_h(n_1, \dots, n_{a_h})$ è definito e, in tal caso, fornisce anche i valori

$g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, m)$ per $m = 1, 2, 3, \dots$,

sin quando—se mai ciò accade—non risulti indefinito

$g_\ell\left(n_1, \dots, n_{a_h}, m - 1, g_i(n_1, \dots, n_{a_h}, m - 1)\right)$;





- 6 g_i è ottenuta per *minimalizzazione* da una funzione g_ℓ , con $\ell < i$, dove vige $a_\ell = a_i + 1$ fra le arità di g_ℓ e di g_i .

Indichiamo con \tilde{g}_i la funzione

$$\langle \vec{x}, m \rangle \xrightarrow{\tilde{g}_i} \min_{n \geq m} g_\ell(\vec{x}, n) = 0$$

di arità a_ℓ





- 6 g_i è ottenuta per *minimalizzazione* da una funzione g_ℓ , con $\ell < i$, dove vige $a_\ell = a_i + 1$ fra le arità di g_ℓ e di g_i .
Indichiamo con \tilde{g}_i la funzione

$$\langle \vec{x}, m \rangle \xrightarrow{\tilde{g}_i} \min_{n \geq m} g_\ell(\vec{x}, n) = 0$$

di arità a_ℓ tale che $\tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, m)$ è definita sse vi è un $n \geq m$ tale che

- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n) = 0$ ed inoltre (se $n > m$)
- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m), g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m+1), \dots, g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n-1)$ sono tutti definiti e diversi da 0.





- 6 g_i è ottenuta per *minimalizzazione* da una funzione g_ℓ , con $\ell < i$, dove vige $a_\ell = a_i + 1$ fra le arità di g_ℓ e di g_i .
Indichiamo con \tilde{g}_i la funzione

$$\langle \vec{x}, m \rangle \xrightarrow{\tilde{g}_i} \min_{n \geq m} g_\ell(\vec{x}, n) = 0$$

di arità a_ℓ tale che $\tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, m)$ è definita sse vi è un $n \geq m$ tale che

- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n) = 0$ ed inoltre (se $n > m$)
- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m), g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m+1), \dots, g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n-1)$ sono tutti definiti e diversi da 0.

Quando queste condizioni sono soddisfatte definiamo:

$$\tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, m) = n.$$





- 6 g_i è ottenuta per *minimalizzazione* da una funzione g_ℓ , con $\ell < i$, dove vige $a_\ell = a_i + 1$ fra le arità di g_ℓ e di g_i .
 Indichiamo con \tilde{g}_i la funzione

$$\langle \vec{x}, m \rangle \mapsto \min_{n \geq m} g_\ell(\vec{x}, n) = 0$$

di arità a_ℓ tale che $\tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, m)$ è definita sse vi è un $n \geq m$ tale che

- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n) = 0$ ed inoltre (se $n > m$)
- $g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m), g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, m+1), \dots, g_\ell(n_1, \dots, n_{a_i}, n-1)$ sono tutti definiti e diversi da 0.

Quando queste condizioni sono soddisfatte definiamo:

$$\tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, m) = n.$$

Si avrà allora, per come va intesa la minimalizzazione, che

$$g_i(n_1, \dots, n_{a_i}) = \tilde{g}_i(n_1, \dots, n_{a_i}, 0).$$



Supponendo che per ogni x in \mathbb{N} ed ogni y in \mathbb{N} :

- $g_0(x) = 0$,

queste funzioni sono *ricorsive generali* ?



Supponendo che per ogni x in \mathbb{N} ed ogni y in \mathbb{N} :

- $g_0(x) = 0$,
- $g_1(x) = x + 1$,

queste funzioni sono *ricorsive generali* ?



Supponendo che per ogni x in \mathbb{N} ed ogni y in \mathbb{N} :

- $g_0(x) = 0$,
- $g_1(x) = x + 1$,
- $g_2(x, y) = x$,

queste funzioni sono *ricorsive generali* ?



Supponendo che per ogni x in \mathbb{N} ed ogni y in \mathbb{N} :

- $g_0(x) = 0$,
- $g_1(x) = x + 1$,
- $g_2(x, y) = x$,
- $g_3(x, y) = x + 1$,

queste funzioni sono *ricorsive generali* ?



Supponendo che per ogni x in \mathbb{N} ed ogni y in \mathbb{N} :

- $g_0(x) = 0$,
- $g_1(x) = x + 1$,
- $g_2(x, y) = x$,
- $g_3(x, y) = x + 1$,
- $g_4(x)$ non sia definito ,

queste funzioni sono *ricorsive generali* ?



Mostrare che sono parzialm. computabili le funzioni qui specificate tramite clausole di Horn:

$$\text{suc}(s(X), X);$$



Mostrare che sono parzialm. computabili le funzioni qui specificate tramite clausole di Horn:

$$\begin{aligned} & \text{suc}(s(X), X); \\ & +(R, X, Y) \leftarrow \begin{array}{l} \text{suc}(X, P) \quad \& \\ +(Q, P, Y) \quad \& \\ \text{suc}(R, Q), \end{array} \\ & +(Y, 0, Y); \end{aligned}$$



Mostrare che sono parzialm. computabili le funzioni qui specificate tramite clausole di Horn:

$$\text{suc}(s(X), X);$$

$$\begin{aligned} +(R, X, Y) \leftarrow & \text{suc}(X, P) & \& \\ & +(Q, P, Y) & \& \\ & \text{suc}(R, Q), \end{aligned}$$

$$+(Y, 0, Y);$$

$$\begin{aligned} *(R, X, Y) \leftarrow & +(X, A_1, A_2) & \& \\ & *(R_1, A_1, Y) & \& \\ & *(R_2, A_2, Y) & \& \\ & +(R, R_1, R_2), \end{aligned}$$

$$*(0, 0, Y),$$

$$*(Y, s(0), Y).$$



The claim that each of the standard formal characterizations provides satisfactory counterparts to the informal notions of *algorithm* and *algorithmic function* cannot be proved. It must be accepted or rejected on grounds that are, in large part, empirical. (That the claim for one charac-

see question *10 in §1.1.) On the basis of this evidence, many mathematicians have accepted the claim that the standard characterizations give a satisfactory formalization, or “rational reconstruction,” of the (necessarily vague) informal notions. This claim is often referred to as *Church's Thesis*. Church's Thesis may be viewed as a *proposal* as well as a claim, a proposal that we agree henceforth to supply certain previously intuitive terms (e.g., “function computable by algorithm”) with certain precise meanings.

[Rogers(1967), pag. 20]





Completezza di Turing
della programmaz.
tramite clausole
di Horn

(S.-Å. Tjärnlund, 1976/77)
(J. Šebelík & P. Štěpánek, 1982)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

COME STABILIREMO LA COMPLETEZZA DI TURING

Per ogni lista di g_i del tipo su descritto, costruiremo basi

$$\emptyset = \mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}_2 \subset \dots \subset \mathcal{B}_{M+1}$$
$$g_0 \quad g_1 \quad g_2 \quad \dots \quad g_M$$

di clausole



COME STABILIREMO LA COMPLETEZZA DI TURING

Per ogni lista di g_i del tipo su descritto, costruiremo basi

$$\emptyset = \mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}_2 \subset \dots \subset \mathcal{B}_{M+1}$$
$$g_0 \quad g_1 \quad g_2 \quad \dots \quad g_M$$

di clausole nella quale compariranno solo la costante 0 , il funtore monadico $s(_)$ di *successore* e letterali

$$p_i(t_0, \dots, t_{a_i}), \quad q_i(t_0, \dots, t_{a_i+1})$$

e relative negazioni, dove $i = 0, 1, \dots, M$.



COME STABILIREMO LA COMPLETEZZA DI TURING

Per ogni lista di g_i del tipo su descritto, costruiremo basi

$$\emptyset = \mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}_2 \subset \dots \subset \mathcal{B}_{M+1}$$
$$g_0 \qquad g_1 \qquad g_2 \quad \dots \quad g_M$$

di clausole nella quale compariranno solo la costante 0 , il funtore monadico $s(_)$ di *successore* e letterali

$$p_i(t_0, \dots, t_{a_i}), \quad q_i(t_0, \dots, t_{a_i+1})$$

e relative negazioni, dove $i = 0, 1, \dots, M$.

Ciascun simbolo predicativo p_i sta a rappresentare, nelle nostre intenzioni, la funzione g_i , mentre il simbolo q_i svolge un ruolo ausiliario e rappresenta la funzione \tilde{g}_i quando g_i è definita per minimalizzazione.



COME STABILIREMO LA COMPLETEZZA DI TURING

Per ogni lista di g_i del tipo su descritto, costruiremo basi

$$\emptyset = \mathcal{B}_0 \subset \underset{g_0}{\mathcal{B}_1} \subset \underset{g_1}{\mathcal{B}_2} \subset \dots \subset \underset{g_M}{\mathcal{B}_{M+1}}$$

di clausole nella quale compariranno solo la costante 0 , il funtore monadico $s(_)$ di *successore* e letterali

$$p_i(t_0, \dots, t_{a_i}), \quad q_i(t_0, \dots, t_{a_i+1})$$

e relative negazioni, dove $i = 0, 1, \dots, M$.

Ciascun simbolo predicativo p_i sta a rappresentare, nelle nostre intenzioni, la funzione g_i , mentre il simbolo q_i svolge un ruolo ausiliario e rappresenta la funzione \tilde{g}_i quando g_i è definita per minimalizzazione.

Ogni \mathcal{B}_{i+1} verrà a specificare la g_i .



I termini così definiti:

$$\begin{aligned} \underline{0} &=_{\text{Def}} 0, \\ \underline{m+1} &=_{\text{Def}} s(\underline{m}), \end{aligned}$$

designano in modo univoco tutti i numeri naturali. Formano un universo di Herbrand: l'universo dei *numerali* (in base 1).



I termini così definiti:

$$\begin{aligned} \underline{0} &=_{\text{Def}} 0, \\ \underline{m+1} &=_{\text{Def}} s(\underline{m}), \end{aligned}$$

designano in modo univoco tutti i numeri naturali. Formano un universo di Herbrand: l'universo dei *numerali* (in base 1).

La nostra costruzione dei \mathcal{B}_i sarà tale che ogni domanda ('goal') della forma $\neg p_i(Y, \underline{n_1}, \dots, \underline{n_{a_i}})$ ammetta risposte corrette se e solo se $\underline{g_i(n_1, \dots, n_{a_i})}$ è definito, in tal caso avendo come unica risposta la sostituzione

$$Y \mapsto \underline{g_i(n_1, \dots, n_{a_i})}.$$



Indichiamo per ciascuno dei casi (1)–(3), (4)–(6) contemplati piú su quali siano le clausole che formano

$$\mathcal{B}_{i+1} \setminus \mathcal{B}_i$$

(quando i ricade in piú di un caso, ci si regoli a piacere):



Indichiamo per ciascuno dei casi (1)–(3), (4)–(6) contemplati piú su quali siano le clausole che formano

$$\mathcal{B}_{i+1} \setminus \mathcal{B}_i$$

(quando i ricade in piú di un caso, ci si regoli a piacere):

① $p_i(0, X)$;



Indichiamo per ciascuno dei casi (1)–(3), (4)–(6) contemplati piú su quali siano le clausole che formano

$$\mathcal{B}_{i+1} \setminus \mathcal{B}_i$$

(quando i ricade in piú di un caso, ci si regoli a piacere):

- ① $p_i(0, X)$;
- ② $p_i(s(X), X)$;



Indichiamo per ciascuno dei casi (1)–(3), (4)–(6) contemplati piú su quali siano le clausole che formano

$$\mathcal{B}_{i+1} \setminus \mathcal{B}_i$$

(quando i ricade in piú di un caso, ci si regoli a piacere):

- ① $p_i(0, X)$;
- ② $p_i(s(X), X)$;
- ③ $p_i(X_j, X_1, \dots, X_{a_i})$;



$$\textcircled{4} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \quad \leftarrow$$

$$p_h(Y, Y_{l_1}, \dots, Y_{l_{a_h}}) \quad \&$$

$$p_{l_1}(Y_{l_1}, X_1, \dots, X_{a_i}) \quad \&$$

...

...

&

$$p_{l_{a_h}}(Y_{l_{a_h}}, X_1, \dots, X_{a_i});$$



$$\textcircled{4} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \leftarrow$$

$$p_h(Y, Y_{l_1}, \dots, Y_{l_{a_h}}) \quad \&$$

$$p_{l_1}(Y_{l_1}, X_1, \dots, X_{a_i}) \quad \&$$

...

...

&

$$p_{l_{a_h}}(Y_{l_{a_h}}, X_1, \dots, X_{a_i});$$

$$\textcircled{5} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_h}, 0) \leftarrow p_h(Y, X_1, \dots, X_{a_h}),$$



$$\textcircled{4} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \leftarrow$$

$$p_h(Y, Y_{l_1}, \dots, Y_{l_{a_h}}) \quad \&$$

$$p_{l_1}(Y_{l_1}, X_1, \dots, X_{a_i}) \quad \&$$

...

...

&

$$p_{l_{a_h}}(Y_{l_{a_h}}, X_1, \dots, X_{a_i});$$

$$\textcircled{5} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_h}, 0) \leftarrow p_h(Y, X_1, \dots, X_{a_h}),$$

$$p_i(Y_\ell, X_1, \dots, X_{a_h}, s(X)) \leftarrow$$

$$p_\ell(Y_\ell, X_1, \dots, X_{a_h}, X, Y_i) \quad \&$$

$$p_i(Y_i, X_1, \dots, X_{a_h}, X);$$



$$\textcircled{6} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \leftarrow q_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}, 0),$$

—Fine della costruzione / dimostrazione—



$$\textcircled{6} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \leftarrow q_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}, 0),$$

$$q_i(Z, X_1, \dots, X_{a_i}, Z) \leftarrow p_i(0, X_1, \dots, X_{a_i}, Z),$$

—Fine della costruzione / dimostrazione—



$$\textcircled{6} \quad p_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}) \leftarrow q_i(Y, X_1, \dots, X_{a_i}, 0),$$

$$q_i(Z, X_1, \dots, X_{a_i}, Z) \leftarrow p_i(0, X_1, \dots, X_{a_i}, Z),$$

$$q_i(Y_i, X_1, \dots, X_{a_i}, Z) \leftarrow$$

$$p_i(s(Y), X_1, \dots, X_{a_i}, Z) \& \\ q_i(Y_i, X_1, \dots, X_{a_i}, s(Z)).$$

—Fine della costruzione / dimostrazione—





Indecidibilità della logica predicativa del 1° ordine



La vedremo ben presto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



Martin D. Davis, Ron Sigal, and Elaine J. Weyuker.

Computability, complexity, and languages - Fundamentals of theoretical computer science.

Computer Science ad scientific computing. Academic Press, 1994.



J.W. Lloyd.

Foundations of Logic Programming.

Springer-Verlag, Berlin, 2nd edition, 1987.



Hartley Rogers, Jr.

Theory of Recursive Functions and Effective Computability.

Series in Higher Mathematics. McGraw-Hill, 1967.

