DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI – gruppo acilico

Acido carbossilico

Alogenuro acilico
(X = Cl, Br)

Anidride

Estere

Ammide

Tioestere

Fosfato acilico

La tipica reazione dei gruppi acilici è la sostituzione nucleofila acilica

NOMENCLATURA

Acido carbossilico

acido -ico
(acido carbossilico)

Alogenuro acilico

-ile alogenuro
(-carbonile alogenuro)

Anidride

anidride

Ammide

-amide
(-carbossammide)

Estere

-ato
(-carbossilato)

Differente reattività dei gruppi acili e dei gruppi carbonilici

MECCANISMO GENERALE DELLA SOSTITUZIONE NUCLEOFILA ACILICA

dove Y = F, Cl, Br, I (alogenuro acilico); OR (estere); OCOR (anidride);
o NH₂ (ammide)

MECCANISMO GENERALE DELLA SOSTITUZIONE NUCLEOFILA ACILICA

FIGURA 21.1 MECCANISMO:
Meccanismo generale di una reazione di sostituzione nucleofila acilica.

Avviene l'addizione di un nucleofilo al gruppo carbonilico, con formazione di un intermedio tetraedrico.

Una coppia di elettroni dell'ossigeno sposta il gruppo uscente Y, generando come prodotto un nuovo composto carbonilico.

Tutti i derivati acilici subiscono idrolisi (Nu=H₂O) per dare acidi carbossilici

Perciò vengono anche considerati
derivati degli acidi carbossilici

10¹¹

10⁷

1.0

< 10⁻²

REATTIVITA' DEI GRUPPI ACILICI

Il carbonio è elettrofilo. Gli atomi elettronegativi aumentano la sua reattività elettrofila

Tioestere

Fosfato acilico

Estere

Anidride

Reattività e stabilità del gruppo uscente

più reattivo

meno reattivo

base
debole

base
forte

gruppo
uscente

acido
coniugato

pKa -7 3-5 15-16 15.7 36

Aldeidi e chetoni non danno reazioni di sostituzione nucleofila acilica perchè i gruppi uscenti sarebbero basi fortissime

	H^-	R^-
pKa	40	50

REAZIONI DEI GRUPPI ACILICI

FIGURA 21.3 Alcune reazioni generali dei derivati degli acidi carbossilici.

Interconversion dei derivati degli acidi carbossilici

ALUGENURI ACILICI

ALOGENURI ACILICI

Acetile cloruro
(dall'acido acetico)

Benzoile bromuro
(dall'acido benzoico)

Cicloesanocarbonile cloruro
(dall'acido cicloesancarbossilico)

CONVERSIONE DI ACIDI CARBOSSILICI IN CLORURI ACILICI MEDIANTE CLORURO DI TIONILE

Acido 2,4,6-Trimetilbenzoico

**2,4,6-Trimetilbenzoile
cloruro (90%)**

CONVERSIONE DI ACIDI CARBOSSILICI IN CLORURI ACILICI MEDIANTE CLORURO DI TIONILE

Una volta trasformato il gruppo carbossilico in cloruro acilico, il C acilico diviene più reattivo verso l'attacco di specie nucleofile

Idrolisi degli alogenuri acilici

Alogenuri acilici nella SINTESI di ANIDRIDI

Sintesi da alogenuri acilici

Sintesi da acido carbossilico

neutralizzato con una base
man mano che si forma

ALOGENURO ACILICO + ALCOL

alcolisi

Sintesi di esteri

ALOGENURO ACILICO + ALCOL

Alcolisi - meccanismo

meccanismo:

Sintesi di esteri

Presenza di una base per neutralizzare l'acido che si forma

Alogenuro acilico + alcol

Ulteriori esempi

Sintesi di esteri

Alogenuro acilico + 2 moli di ammina / ammoniacca amminolisi

**Sintesi ammidi:
Eccesso di
nucleofilo/base
per neutralizzare
l'acido che si
forma**

Servono due moli equivalenti di ammina perché viene liberato acido cloridrico che protona il nucleofilo inattivandolo

Sintesi ammidi

ANIDRIDI

Anidride acetica

Anidride benzoica

Anidride succinica

Anidridi simmetriche

Anidride ciclica

Anidride **acetico** benzoica

Anidride mista

Alogenuri acilici nella SINTESI di ANIDRIDI

Sintesi da alogenuri acilici

Sintesi da acido carbossilico

neutralizzato con una base
man mano che si forma

Le anidridi cicliche si ottengono mediante disidratazione del corrispondente acido bicarbossilico

Acido succinico

Anidride succinica

Anidridi cicliche: Anidride ftalica

Acido ftalico

anidride 1,2-benzenedicarbossilica
(anidride ftalica)

Le anidridi cicliche danno immidi, per riscaldamento con ammoniacca

Le anidridi cicliche danno immidi

La ftalimide ha un pKa pari a 8.30

Viene usata, come sale di potassio, nella preparazione di ammine primarie (Sintesi di Gabriel).

Reazioni delle anidridi

FIGURA 21.7 Alcune reazioni delle anidridi.

Le anidridi sono efficaci reagenti acilanti di gruppi nucleofili

Reazioni delle anidridi

Idrolisi delle anidridi

Le anidridi sono agenti acilanti di gruppi nucleofili: per es. ammine e ammoniacca

Sintesi di ammidi

Anche in questo caso si libera acido che va a protonare il nucleofilo inattivandolo, per cui si deve operare in presenza di una base per tamponare l'acido liberato

Le anidridi sono agenti acilanti di gruppi nucleofili: per es. ammine

Reazioni di acetilazione di un gruppo $-NH_2$ sintesi del paracetamolo (tachipirina)

Le anidridi sono efficaci reagenti acilanti di gruppi nucleofili: per es. –OH alcolico

Anidride + R-OH = estere

Le anidridi sono efficaci reagenti acilanti di gruppi nucleofili: per es. –OH fenolico

Anidride + R-OH = estere

**Reazione di acetilazione: sintesi dell'acido acetilsalicilico
(aspirina)**

Anche le anidridi cicliche sono efficaci reagenti acilanti di gruppi nucleofili: per es. alcol

Anidride + alcol = estere

ESTERI

ESTERI

Etile acetato
(estere etilico
dell'acido acetico)

Dimetil malonato
(estere metilico
dell'acido malonico)

***tert*-Butile cicloesancarbossilato**
(estere *tert*-butilico dell'acido
cicloesancarbossilico)

Acido carbossilico + alcol + cat. acido

Sintesi di esteri secondo Fischer

Acido carbossilico + alcol + cat. Acido = estere

FIGURA 21.5 MECCANISMO:
L'esterificazione di Fischer. La reazione è una sostituzione nucleofila acilica acido-catalizzata di un acido carbossilico.

Reazione all'equilibrio

La protonazione dell'ossigeno carbonilico attiva l'acido carbossilico...

...nei confronti dell'attacco nucleofilo da parte dell'alcol, dando origine a un intermedio tetraedrico.

Il trasferimento di un protone da un ossigeno all'altro genera un secondo intermedio tetraedrico e trasforma il gruppo —OH in un buon gruppo uscente.

La perdita di un protone e l'eliminazione di una molecola d'acqua rigenera il catalizzatore e porta alla formazione dell'estere finale.

Estere + acqua + cat. Acido = acido carbossilico

Acido carbossilico + alcol + cat. acido

Sintesi di esteri secondo Fischer

Sintesi di esteri
ESTERIFICAZIONE MEDIANTE S_N2
Carbossilato + alogenuro alchilico

Alcuni esteri

trigliceride

Butile ftalato (plastificante)

Esteri come aromi alimentari

ottil etanoato
(ottil acetato)

arancia

etil butanoato
(etil butirrato)

ananas

3-metilbutil etanoato
(isopentil acetato, isoamil acetato)

banana

metil 2-idrossibenzoato
(metil salicilato)

menta

Sostituzioni nucleofile aciliche negli esteri

Idrolisi acida degli esteri

FIGURA 21.10 MECCANISMO: Idrolisi degli esteri acido-catalizzata. La reazione diretta è un'idrolisi, quella inversa è un'esterificazione di Fischer (Figura 21.5).

Il
nucleofilo
è l'acqua

H⁺ catalizza

La protonazione attiva il carbonile...

...nei confronti dell'attacco nucleofilo da parte dell'acqua, che produce un intermedio tetraedrico.

Il trasferimento di un protone trasforma OR' in un buon gruppo uscente.

L'espulsione dell'alcol fornisce l'acido carbossilico e rigenera il catalizzatore acido.

Idrolisi basica degli esteri

Idrolisi basica di trigliceridi: saponificazione

Grasso

(R=catene alifatiche C₁₁-C₁₉)

Trigliceride

Idrolisi basica degli esteri

FIGURA 21.9 MECCANISMO:
idrolisi degli esteri indotta dalle
basi (saponificazione).

Il nucleofilo
è OH^-

Il nucleofilo è
molto reattivo
per cui non
serve un
catalizzatore

L'addizione nucleofila dello ione
ossidrilico al carbonio carbonilico
fornisce il consueto intermedio
tetraedrico a carattere di alcossido.

L'eliminazione dello ione alcossido
genera poi l'acido carbossilico.

Lo ione alcossido strappa il protone
acido dall'acido carbossilico e fornisce
lo ione carbossilato.

La protonazione dello ione
carbossilato per aggiunta di un acido
nella soluzione acquosa in un
passaggio successivo genera l'acido
carbossilico.

Estere + ammina = ammido

Metile benzoato

Benzamido

Esteri ciclici = lattoni

Butirrolattone

Nomenclatura dei lattoni

Dare il nome all'acido carbossilico, tagliare il suffisso **-ico**, e aggiungere **-lattone**.

β -lattone

3-propionolattone
 β -propionolattone

γ -lattone

4-butanolattone
 γ -butirolattone

δ -lattone

5-pentanolattone
 δ -valerolattone

3-butanolattone
 β -butirolattone

5-estanolattone
 δ -caprolattone

Sintesi di lattoni

La reazione intramolecolare è facile, se si formano anelli stabili (5 e 6 termini)

AMMIDI

- Le ammidi sono poco reattive

AMMIDI

Acetammide
(dall'acido acetico)

Esanammide
(dall'acido esanoico)

Ciclopentancarbossammide
(dall'acido ciclopentancarbossilico)

N-Metilpropanammide

N,N-Dietilcicloesancarbossammide

IUPAC: *N*-alchilalcanammide
comune: acido -ico + ammide

Idrolisi di ammidi

Idrolisi acida

Idrolisi basica

Il legame ammidico è meno reattivo rispetto al legame estereo.
Le ammidi subiscono idrolisi solo in condizioni molto drastiche

TIOESTERI

a) Alogenuri acilici

es:

Tioesteri: importanza biologica

Donatore di gruppi acili

Acetilazione di glucosammina

L'Acetil CoA dona un gruppo acetile ed acila il gruppo amminico

Il **peptidoglicano**, noto anche come **mureina**, è un polimero costituito da zuccheri e amminoacidi che forma uno strato simile a una rete al di fuori della membrana plasmatica della maggior parte dei batteri, formando la parete cellulare. La componente zuccherina consiste in residui alternati di N-acetilglucosamina (NAG) e acido N-acetilmuramico (NAM).

Riduzioni di gruppi acili

Riduzione di alogenuri acilici con LiAlH_4

Riduzione di ammidi

Riduzione di esteri

Lattone

1,4-Pentandiolo (86%)

Ammidi cicliche = lattami

Colonia di muffa *Penicillium* in una capsula di Petri.

Cefalexina
(una cefalosporina)

Sostituente acilamminico

Benzilpenicillina
(Penicillina G)

Anello β -lattamico

D. Ammidi cicliche o lattami

Dare il nome all'acido carbossilico, tagliare il suffisso **-ico**, e aggiungere **-olattame**.

β-lattame

β-propionolattame

γ-lattame

γ-butirolattame

δ-lattame

δ-pentanolattame

3-butanolattame

β-butirolattame

6-esanolattame

ε-caprolattame

Lattami

penicilline

penicillina G

cefalosporine

cefalexina

Cefetamet

Nitrili

Un nitrile—tre legami con un atomo di azoto

Un acido—tre legami con due atomi di ossigeno

Nitrili

IUPAC: alcanonitrile

comune: nome dell'acido -ico + onitrile

etanonitrile
(acetonitrile)

2-metilpropanonitrile
(isobutirronitrile)

benzenecarbonitrile
(benzonitrile)

Nitrili

Acetonitrile
(dall'acido acetico)

Benzonitrile
(dall'acido benzoico)

2,2-Dimetilcicloesancarbonitrile
(dall'acido 2,2-dimetilcicloesancarbossilico)

Nitrili: sintesi

Agenti disidratanti

Sn2

Usando sali dello ione cianuro

Nitrili: reattività

Sostituzione nucleofila acilica

Composto carbonilico

Nitrile

Idrolisi di nitrili:
-basica
-acido catalizzata

FIGURA 20.4 MECCANISMO:
L'idrolisi basica di un nitrile fornisce prima un'ammide, che viene poi idrolizzata ad anione carbossilato.

Meccanismo dell'idrolisi basica dei nitrili:

L'attacco della prima mole di OH^- porta ad una **ammide**.

L'attacco della seconda mole di OH^- porta al **carbossilato**

L'addizione nucleofila dello ione idrossido al triplo legame CN dà come prodotto un anione imminico.

La protonazione dell'anione imminico da parte di una molecola di acqua fornisce un'idrossiimmina e rigenera il catalizzatore basico.

Il doppio legame tautomerizza per dare un'ammide, con una reazione simile alla tautomerizzazione di un enolo a chetone.

L'addizione nucleofila di uno ione idrossido al gruppo carbonile dell'ammide fornisce uno ione alcossido intermedio ibridizzato sp^3 ...

....che viene deprotonato dalla base per dare il dianione.

L'espulsione di NH_2^- come gruppo uscente genera quindi l'anione carbossilato.

Nitrili: riduzione ad ammine