

Nome e Cognome

Corso di studi: Fisica Matematica

Esercizio 1. (4+4 pt) Si calcolino i seguenti limiti

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\frac{\pi}{2} + \arcsin(x)}{\sqrt{x+1}} = \boxed{}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x + 5x)(\sqrt{x^2 + 2} - x) = \boxed{}.$$

Esercizio 2. (8 pt) Si studi la funzione

$$f(x) = (x - 5)e^x,$$

determinando:

i) Dominio:

ii) Limiti importanti:

iii) Eventuali asintoti:

iv) Derivata prima $f'(x) =$
e suo segno.

v) Intervalli di crescita e decrescenza. Eventuali punti di massimo e di minimo locali o globali.

vi) Derivata seconda $f''(x) =$
e suo segno.

vii) Intervalli di convessità e concavità. Eventuali punti di flesso.

viii) Eventuali simmetrie.

ix) Grafico di f .

Esercizio 3. (2+2+2+2 pt) Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile due volte tale che

$$f(-2) = -4, \quad f(-1) = -5, \quad f(1) = 5, \quad f(2) = 4.$$

Dimostrare che:

i) la funzione non è né convessa né concava;

ii) la funzione derivata $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $[-1, 5] \subseteq f'(\mathbb{R})$;

iii) esiste almeno un punto in cui la derivata seconda si annulla;

iv) la funzione derivata seconda $f'' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $[-2, 2] \subseteq f''(\mathbb{R})$.

Esercizio 4. (4+4 pt) Si calcolino:

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos(2x) dx = \boxed{}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin(x^2)} \int_{4x^2}^{9x^2} (1+2 \cos(\sqrt{t})) dt = \boxed{}.$$