





Le paradentiti



La paradentite

- È un processo infiammatorio che colpisce i tessuti posti attorno alla radice del dente con i quali sono in connessione anatomica e funzionale
- Ai processi infiammatori legati più strettamente al legamento parodontale può accompagnarsi una reazione infiammatoria dell'osso alveolare circostante



La paradentite

- Distinzione locoregionale:
 - ◆ Apicali (da trauma occlusale e non, da necrosi pulpare)
 - ◆ Periradicolari (di origine parodontale)
- Distinzione clinica:
 - ◆ Acute
 - ◆ Croniche

La paradentite apicale acuta

- Sierosa (da fenomeni infiammatori non settici)
- Purulenta (da formazione di liquido purulento settico, premessa per un ascesso odontogeno, conseguente a un processo settico della polpa)

La paradentite apicale acuta

Eziologia

- ◆ Infettiva (diffusione batterica e prodotti di degradazione della polpa necrotica)
- ◆ Iatrogena (pasta arsenicale, clorofenolo, sovrastrumentazione, cementi endocanalari irritanti, terapia canalare incongrua per sottostrumentazione)
- ◆ Da trauma occlusale (otturazione troppo alta o protesi incongrua, spostamento elementi dentari da terzo molare in eruzione con mancanza di spazio)

La paradentite apicale acuta

- L'essudato purulento tende a propagarsi nei tessuti circostanti verso un'esteriorizzazione attraverso i tessuti molli (gengiva o cute)
- Varie fasi ascessuali di evoluzione settica (periodontale, osteitica, subperiosteale, sottomucosa, sottocutanea)

La paradentite apicale acuta

- Dolore spontaneo e dolorabilità notevole
- Tumefazione
- Linfadenopatia satellite (a livello sottomandibolare)
- Febbre (non sempre presente)
- Sensazione di allungamento del dente e comparsa di mobilità
- Fistolizzazione conseguente

La paradentite apicale cronica

- Forma cronica essudativo-purulenta
- Forma cronica granulomatosa (granuloma)

Paradentite cronica essudativo-purulenta

- Evoluzione di una forma acuta
- Presenza di tragitto fistoloso
- Alternanza di periodi di remissione a periodi di riacutizzazione

Paradentite cronica granulomatosa

- Processo i cui fenomeni demolitivi e infiammatori procedono a pari passo con tentativi di guarigione
- 30-40% evoluzione cistica (residui epiteliali del Malassez)
- Struttura dinamicamente attiva che tende sempre ad accrescersi

Paradentite cronica granulomatosa

- Sintomatologia sfumata o totalmente asintomatica
- Sensazione di allungamento del dente, dolore alla percussione verticale
- Colorazione scura del dente (necrosi)
- Dolore alla palpazione vestibolare

Paradentite cronica granulomatosa

- Forma di resistenza dell'organismo alla diffusione di germi e materiale necrotico nell'osso
- Tessuto granulomatoso con capsula connettivale
- Origine della “malattia focale” (grave patologia sistemica)
- Evoluzione ascessuale o stabile per anni