LIPIDI E

MEMBRANE BIOLOGICHE

Definizione (la parola deriva dal greco *lípos*, grasso):

MOLECOLE INSOLUBILI IN ACQUA
SOLUBILI NEI SOLVENTI ORGANICI NON POLARI

Molecole con struttura chimica e funzioni molto diverse
Prevalenza di gruppi non polari
Scarsa presenza di atomi elettronegativi

Lipidi lineari

Lipidi ciclici (steroidi)

Lipidi carichi (gruppi ionizzati)

Lipidi neutri (privi di carica)

Costituiscono una delle quattro principali classi di sostanze di interesse biologico
(con carboidrati, proteine e acidi nucleici)

Funzioni dei lipidi

Molecole con struttura chimica e funzioni molto diverse

Immagazzinare “energia” (Tessuto adiposo)

Costituire le membrane cellulari

- ☞ **Creare una barriera con l'esterno**
- ☞ **Creare compartimenti specializzati**
- ☞ **Controllare il flusso di materiale**

Comunicazione tra cellule (segnali)

Vitamine (cofattori di attività proteiche).

LIPIDI LINEARI

LIPIDI SEMPLICI:

ACIDI GRASSI

acidi carbossilici con una catena idrocarburica da 4 a 36 atomi di C

LIPIDI COMPLESSI:

TRIACILGLICEROLI (trigliceridi)

FOSFOLIPIDI

CEREBROSIDI O GLICOLIPIDI

CERE

punti di fusione

acido stearico (18:0)

acido oleico (18:1)

acido linoleico (18:2)

gli acidi grassi sono acidi deboli

$$10^{-4} > K_a < 10^{-5}$$

Molecole Anfi-Patiche

porzione idrofobica

porzione idrofilica

Il sistema tende spontaneamente ad organizzarsi nella struttura sopramolecolare a minor energia

micella

Triglicilgliceroli (trigliceridi)

Grassi ed oli sono triesteri del glicerolo
TRIGLICERIDI.

GLICEROLO

Gliceridi: esteri del glicerolo

TRIACILGLICEROLI (trigliceridi)

LIPIDI NEUTRI e totalmente INSOLUBILI:
l'esterificazione elimina sia gli ossidrili che
gli acidi carbossilici

Altamente insolubili in acqua

Excess fat is stored in lipocytes, which expand in size until the fat is used for fuel

Importanza biologica:

- Riserva energetica
- Isolamento termico
- Protezione meccanica

FOSFOLIPIDI

I fosfolipidi costituiscono circa il 40% delle membrane cellulari (l'altro 60% sono proteine);

Si distinguono in

GLICEROFOSFOLIPIDI

costituiti da glicerolo, acidi grassi, fosfato

SFINGOFOSFOLIPIDI

costituiti da sfingosina, acidi grassi, fosfato

GLICEROFOSFOLIPIDI

Derivati dell'ACIDO FOSFATIDICO

Legame FOSFO-Estere

Il legame fosfoestere con un alcol

GLICEROFOSFOLIPIDI

Glicerofosfolipide
(struttura generale)

Nome del glicerofosfolipide	Nome di X	Formula di X	Carica netta (a pH 7,0)
Acido fosfatidico	—	— H	—1
Fosfatidiletanolammina	Etanolammina	— CH ₂ —CH ₂ —NH ₃ ⁺	0
Fosfatidilcolina	Colina	— CH ₂ —CH ₂ —N ⁺ (CH ₃) ₃	0
Fosfatidilserina	Serina	— CH ₂ —CH—NH ₃ ⁺ COO ⁻	—1
Fosfatidilglicerolo	Glicerolo	— CH ₂ —CH—CH ₂ —OH OH	—1
Fosfatidilinositolo 4,5-bisfosfato	<i>mio</i> -Inositolo 4,5-bisfosfato		—4

Testa idrofila

(a) Formula di struttura

(b) Modello compatto

MEMBRANE BIOLOGICHE

Acido Grasso

Acido Grasso

Le singole unità hanno una forma a cuneo (la sezione trasversale della testa è più grande di quella della catena idrofobica)

(a) Micella

Fosfolipide

(b) Doppio strato

Cavità
acquosa

(c) Liposoma

Strutture sopramolecolari dei lipidi polari

micella

doppio strato

liposoma

Steroidi

La caratteristica strutturale comune a tutti gli steroidi è un sistema di quattro anelli condensati.

Gli anelli A, B e C sono a sei termini, l'anello D è a cinque termini.

STRUTTURA PLANARE e RIGIDA

COLESTEROLO

27 atomi di carbonio

Componente **essenziale** di tutte le membrane delle cellule animali.

Precursore di

- Acidi biliari
- Ormoni steroidei

C'è una relazione diretta fra un'eccessiva concentrazione del colesterolo nel sangue e le malattie coronariche e cardiache.

• **Le membrane biologiche sono strutture fluide e dinamiche -**

la fluidità dipende dalla *LUNGHEZZA* e *GRADO di INSATURAZIONE* delle catene aciliche nei fosfolipidi, dalla *TEMPERATURA* e dalla presenza di *COLESTEROLO*

Massima RIGIDITA':
AG saturi
Molto colesterolo

Massima FLUIDITA':
AG insaturi
Niente colesterolo

Proteine di Membrana: strutture

- **Proteine Intrinseche**
 - Sono *Anfipatiche*
 - Alcune attraversano completamente la membrana, altre solo in parte.
- **Proteine Estrinseche**
 - Non sono incluse nel doppio strato lipidico, ma sulla superficie interna o esterna.
 - Interagiscono con le proteine intrinseche attraverso interazioni non-covalenti.

Proteine di Membrana

- Le proteine costituiscono circa il 60% della massa della membrana.

Sono gli esecutori di tutte le attività della membrana.

- *Trasporto*
- *Catalisi*
- *Recettori*
 - ↳ di molecole
 - ↳ di altre cellule
- *Adesione (ad altre cellule)*
- *Ancoraggio*
 - alla matrice extra-cellulare

MECCANISMI di TRASPORTO di MEMBRANA

Barriera di selettività tra cellule e ambiente extracellulare

Mantenimento delle differenze tra l'ambiente intra ed extracellulare

Scambio SELETTIVO di materia tra l'ambiente intra ed extracellulare

Mantenimento delle differenze tra compartimento interno e citoplasma cellulare
(Membrane degli organuli sub-cellulari)

Sistemi di trasporto di membrana

TRASPORTO PASSIVO

☞ **DIFFUSIONE (semplice o facilitata)**

AVVIENE SECONDO GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE

☞ l'equilibrio si raggiunge quando la concentrazione è uniforme

☞ **PROCESSO SPONTANEO ($\Delta G < 0$)**

Permeabilità dei doppi strati lipidici

Differenze cinetiche tra la diffusione semplice e la diffusione facilitata

DIFFUSIONE SEMPLICE
il flusso è proporzionale
al gradiente

$$C_2 - C_1 = G$$

DIFFUSIONE FACILITATA
ad elevate concentrazioni
si ha saturazione delle
molecole trasportatrici

Il trasporto è specifico e la
sua velocità dipende da

- Gradiente di concentrazione
- Quantità di trasportatore
- Affinità del trasportatore

$$K_D = \frac{[L][T]}{[LT]}$$

$$V_{\text{trasporto}} = \frac{V_{\text{max}} G}{K_D + G}$$

Se C1 è costante G è proporzionale a [C2]

- A. Utilizzo del grafico dei doppi reciproci per calcolare K_D e V_{max}
- B. Inibizione da parte di molecole esogene (es. farmaci)
- C. Cinetiche di inibizione competitiva e non competitiva

I trasportatori hanno generalmente due stati conformazionali (E1 e E2),
uno con i siti leganti rivolti all'esterno E1
l'altro con i siti leganti rivolti internamente E2.

L'effetto del ligando è quello di stabilizzare lo stato E2

ESEMPIO: la PERMEASI del GLUCOSIO

IMPORTANTE:

Sia nel caso della diffusione semplice che in quella della diffusione facilitata la direzione del trasporto è **SEMPRE** quella del **GRADIENTE** di **CONCENTRAZIONE**

La molecola si muoverà **SEMPRE** dal compartimento a concentrazione maggiore al compartimento a concentrazione minore

- ☞ **Dissipa il gradiente di concentrazione**
- ☞ **Tende a raggiungere l'equilibrio**
- ☞ **PROCESSO SPONTANEO ($\Delta G < 0$)**

Se non c'è gradiente di concentrazione il flusso si arresta

Se il gradiente si inverte, si inverte anche la direzione del trasporto

La cinetica di trasporto del glucosio è stata misurata a diverse concentrazioni di ligando in presenza ed in assenza di un inibitore.

I valori ottenuti dall'esperimento sono i seguenti:

[L] $\mu\text{mol/L}$	Trasporto ($\mu\text{mol/L})\text{min}^{-1}$	
	Senza inibitore	Con inibitore
3	10,4	4,1
5	14,5	6,4
10	22,5	11,3
30	33,8	22,6
90	40,5	33,8

- Determinare K_d e V_T in assenza e in presenza di inibitore
- Definire di che tipo di inibizione si tratta

$1/[S] =$	0,334	$1/V_t =$	0,096	$1/V_t^* =$	0,243
	0,200		0,069		0,156
	0,100		0,044		0,088
	0,030		0,029		0,044
	0,011		0,024		0,029

1/[S] =	0,334	1/Vt =	0,096	1/Vt* =	0,243
	0,200		0,069		0,156
	0,100		0,044		0,088
	0,030		0,029		0,044
	0,011		0,024		0,029

$K_M = 1,1 \mu M$

$K_{M^*} = 3,1 \mu M$

INIBIZIONE COMPETITIVA

Sistemi di trasporto di membrana

Trasporto passivo

$-\Delta G$

Diffusione semplice

Diffusione facilitata

Indipendente da un vettore

Dipendente da vettore proteico

Canali ionici

Permeasi

TRASPORTO ATTIVO

Sempre mediato da **PROTEINE**

AVVIENE CONTRO GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE

- ☞ Preserva il gradiente di concentrazione
- ☞ Non permette di raggiungere l'equilibrio
- ☞ **PROCESSO non SPONTANEO ($\Delta G > 0$)**

Richiede ENERGIA

TRASPORTO ATTIVO SECONDARIO

Sono 2 le forze che guidano il trasporto di ioni:

1. GRADIENTE DI
CONCENTRAZIONE (CHIMICO)

GRADIENTE ELETTRO-CHIMICO

2. GRADIENTE ELETTRICO

Extracellular space

$[Na] = 140 \text{ mM}$

$\Delta\Phi = -60 \text{ mV (media)}$

$[Na] = 10 \text{ mM}$

Intracellular space

TRASPORTO ATTIVO SECONDARIO

L'energia per il trasporto contro gradiente è data dalla contemporanea diffusione di Na^+

L'energia, conservata sotto forma di gradiente **ELETTROCHIMICO** di Na^+ , viene utilizzata permettendone la diffusione.

- ☞ Il gradiente di Na^+ tende a dissiparsi
- ☞ Si mantiene un gradiente a spese di un altro
- ☞ Se il gradiente di Na^+ si dissipa, l'altra molecola non viene trasportata

Es:

- co-trasporto Na^+ /glucosio

Epitelio intestinale, tubulo prossimale del rene

- co-trasporto Na^+ /aminoacidi

tutti i tessuti

Lume Intestinale:

GRANDE VOLUME

**Bassa
concentrazione
di soluti
(glucosio, AA)**

Tubulo prossimale renale:
permette il riassorbimento del glucosio
contro gradiente di concentrazione,
limitandone l'escrezione

Renal Glucose Reabsorption by SGLT2

Glucosio e aminoacidi sono assorbiti grazie a un meccanismo di trasporto attivo secondario Na^+ -dipendente

Lume Intestinale:

bassa
concentrazione
(glucosio, AA)

TRASPORTO ATTIVO PRIMARIO

L'energia per il trasporto contro gradiente è data dall'IDROLISI dell'ATP associata alla fosforilazione transitoria del trasportatore

Trasporto attivo di ioni (POMPE IONICHE) = Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , H^+ .

La Na^+/K^+ -ATPasi (Pompa Na^+/K^+) mantiene i gradienti di Na^+ e K^+ tra l'ambiente intra e quello extra-cellulare

Tali gradienti tendono ad essere dissipati quando si aprono dei canali di membrana specifici per il Na^+ e per il K^+ o quando opera un trasportatore Na^+ dipendente

Glucosio e aminoacidi sono assorbiti grazie a un meccanismo di trasporto attivo secondario Na^+ -dipendente

Lume Intestinale:

bassa
concentrazione
(glucosio, AA)

TRASPORTO ATTIVO PRIMARIO

L'energia per il trasporto contro gradiente è data dall'IDROLISI dell'ATP associata alla fosforilazione transitoria del trasportatore

ABC = ATP Binding Cassette

ABC superfamily

Bacterial plasma membranes (amino acid, sugar, and peptide transporters)

Mammalian plasma membranes (transporters of phospholipids, small lipophilic drugs, cholesterol, other small molecules)

I RECETTORI

Un sistema vivente è capace di **ricevere, rispondere e adattarsi** ai cambiamenti dell'ambiente circostante.

I cambiamenti si manifestano sotto forma di **SEGNALI** (fisici o chimici).

Il "contatto" con un segnale genera una **RISPOSTA** da parte del sistema.

Le modificazioni dell'ambiente sono codificate da

SEGNALI EXTRACELLULARI

Fisici:

radiazione elettromagnetica

deformazione

pressione

CHIMICI :

aminoacidi e loro derivati

piccole molecole idrofiliche
o idrofobiche (steroidi)

peptidi e proteine

RECETTORI:

PROTEINE la cui espressione

definisce la *cellula bersaglio*

Sono le “antenne” in
grado di captare il
segnale in arrivo

“TRASDUZIONE DEL SEGNALE”

FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

I recettori sono le “antenne” in grado di captare il segnale in arrivo

La trasduzione è il processo che **decodifica** l'informazione del segnale captato in linguaggio biochimico

La risposta cellulare dipende dalla **decodifica** di diversi segnali contemporanei e dalla loro **integrazione**

variazioni
nel flusso
metabolico

Es: anabolismo vs catabolismo

Segnali liposolubili

Le membrane biologiche NON costituiscono una barriera alla loro diffusione

RECCETTORI INTRACELLULARI

Segnali idrosolubili

Le membrane biologiche costituiscono una barriera alla loro diffusione

RECCETTORI DI MEMBRANA

Segnali liposolubili

Figure 7-6: Steroid hormones are derived from cholesterol

I recettori intracellulari legano la molecola segnale nel citoplasma, subiscono una transizione allosterica e traslocano nel nucleo dove mediano la trascrizione genica.

Il controllo della trascrizione rappresenta un livello cruciale per la regolazione dell'espressione genica perché con esso le cellule eucariote determinano quali geni devono essere attivati o spenti e di conseguenza **quali proteine devono essere sintetizzate** in ogni preciso momento della vita cellulare.

Molecole idrosolubili

Le membrane biologiche costituiscono una barriera alla loro diffusione

RECCETTORI DI MEMBRANA

Le molecole segnale non entrano nella cellula. L'informazione contenuta nel complesso Segnale-Recettore viene DECODIFICATA

Variazione di 3 parametri

Permeabilità ionica

Fosforilazione delle proteine

Secondi messaggeri

3 parametri interdipendenti

I recettori di membrana si dividono in 3 grandi famiglie

(b) **Ion-channel receptors** (acetylcholine)

Recettori protein chinasici

Permeabilità ionica

Fosforilazione delle proteine

(a) **Recettori associati a proteine G**

Secondi messaggeri