

Rivestimenti

X e Y spazi topologici.

Def. $p: X \rightarrow Y$ rivestimento se p continua e $\exists J = J_{\text{dis}}$ t.c. $\forall y \in Y \exists V \subset Y$ intorno aperto di y con

$$p^{-1}(V) = \bigsqcup_{j \in J} U_j, \quad U_j \subset X \text{ aperto } \forall j \in J \text{ e}$$

$$p_j := p|_{U_j}: U_j \xrightarrow{\cong} V \text{ omeo } \forall j \in J.$$

Terminologia: X spazio totale; Y base di p ; $p^{-1}(y)$ fibra di y ; J fibra tipo; V aperto banalizzante; U_j foglio; $p_j^{-1}: V \xrightarrow{\cong} U_j$ inversa locale di p .

Oss. $p^{-1}(y) \cap U_j = \{p_j^{-1}(y)\}, \forall j \in J \Rightarrow p^{-1}(y) \cong J_{\text{dis}}, \forall y \in Y$.

Oss. $\varphi: V \times J_{\text{dis}} \xrightarrow{\cong} p^{-1}(V), \varphi(y, j) := p_j^{-1}(y)$ omeo e $p \circ \varphi = \pi_V$.

Oss. p rivestimento $\Rightarrow p$ omeo loc. e suriettiva $\Rightarrow p$ aperta.

Oss. X II-numerabile $\Rightarrow J$ numerabile.

Def. Un rivestimento $p: X \rightarrow Y$ è:

- 1) connesso (risp. connesso per archi) se X è connesso (risp. cpa);
- 2) finito se $d(p) := |J| < \infty$ (grado o numero di fogli di p);
- 3) infinito se $d(p) = \infty$;
- 4) banale se Y aperto banalizzante per p .

Oss. p banale $\Leftrightarrow \exists \varphi: Y \times J_{\text{dis}} \xrightarrow{\cong} X$ omeo t.c. $p \circ \varphi = \pi_Y$.

Oss. $p: X \rightarrow Y$ rivestimento ad un foglio $\Leftrightarrow p$ omeo.

Rivestimento universale di S^1 . $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1, p(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.


$p^{-1}(1, 0) = \mathbb{Z}, p^{-1}(-1, 0) = \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$. p di periodo 1: $p(t+1) = p(t)$.

$V = S^1 - \{(1, 0)\} \cong \mathbb{R}, V' = S^1 - \{(-1, 0)\} \cong \mathbb{R}$ (proiezione stereografica).

$$p^{-1}(V) = \mathbb{R} - \mathbb{Z} = \bigsqcup_{j \in \mathbb{Z}} U_j \quad U_j := [j, j+1[$$

$$p^{-1}(V') = \mathbb{R} - (\mathbb{Z} + \frac{1}{2}) = \bigsqcup_{j \in \mathbb{Z}} U'_j \quad U'_j := [j - \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2}[$$


$S^1 = V \cup V'$. $p|_{U_j}: U_j \rightarrow V$ e $p|_{U'_j}: U'_j \rightarrow V'$ continue biiettive \Rightarrow omeo $\Rightarrow V$ e V' banalizzanti $\Rightarrow p$ rivestimento con fibra \mathbb{Z} .



Esempio. $q_n: S^1 \rightarrow S^1$, $q_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $S^1 \subset \mathbb{C}$.



$$J = q_n^{-1}(1) = \{\text{radici } n\text{-esime di 1}\} \cong \mathbb{Z}_n \Rightarrow d(q_n) = n.$$

V, V' aperti banalizzanti. Per $j = 0, \dots, n-1$ consideriamo

$$U_j = \left\{ z \in S^1 \mid \arg z \in \left[\frac{2j\pi}{n}, \frac{2(j+1)\pi}{n} \right] \right\}$$

$$U'_j = \left\{ z \in S^1 \mid \arg z \in \left[\frac{(2j-1)\pi}{n}, \frac{(2j+1)\pi}{n} \right] \right\}$$

$q_n|_{U_j}: U_j \rightarrow V$ e $q_n|_{U'_j}: U'_j \rightarrow V'$ omeo con inversa $\sqrt[n]{z}$.



Rivestimento doppio di \mathbb{RP}^n . $p_n = \pi|_{S^n}: S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$, $p_n(x) = [x]$.

$$p_n^{-1}([x]) = \{\pm x\} \Rightarrow d(p) = 2.$$

$$H_i: x_i = 0 \text{ iper piano in } \mathbb{RP}^n \Rightarrow H_i \cong \mathbb{RP}^{n-1} \rightsquigarrow V_i = \mathbb{RP}^n - H_i \cong \mathbb{R}^n.$$

$$\mathbb{RP}^n = V_0 \cup \dots \cup V_n. U_{i,\pm} = \{(x_0, \dots, x_n) \in S^n \mid \pm x_i > 0\} \text{ aperti in } S^n.$$

$$p_{n,i,\pm} = p|_{U_{i,\pm}}: U_{i,\pm} \rightarrow V_i, p_{n,i,\pm}^{-1}([x_0, \dots, x_n]) = \pm \operatorname{sgn}(x_i)(x_0, \dots, x_n).$$

Def. Siano $p: X \rightarrow Y$ rivestimento e $f: Z \rightarrow Y$ continua.

$\tilde{f}: Z \rightarrow X$ è un sollevamento di f se \tilde{f} è continua e $p \circ \tilde{f} = f$.

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \nearrow \tilde{f} & & \downarrow p \\ Z & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Lemma del numero di Lebesgue. Sia (X, d) spazio metrico compatto, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto. $\exists \delta > 0$ t.c. $\forall S \subset X$, $\operatorname{diam} S < \delta \Rightarrow S \subset U_\alpha$ per un certo $\alpha \in A$.

Def. δ è detto numero di Lebesgue del ricoprimento aperto.

Dim. Se $\exists \alpha \in A$ t.c. $U_\alpha = X \rightsquigarrow \delta = 1$ numero di Lebesgue.

Supponiamo $\emptyset \neq U_\alpha \subsetneq X$, $\forall \alpha \in A$. $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento.

$$K_i = X - U_{\alpha_i} \text{ chiuso} \Rightarrow K_i \text{ compatto e } \bigcap_{i=1}^n K_i = X - \bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_i} = \emptyset \rightsquigarrow$$

$$\bar{d}: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{d}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x, K_i) \quad (\text{distanza media})$$

$\Rightarrow \bar{d}(x) > 0$, $\forall x \in X \Rightarrow \delta := \min \bar{d} > 0$. $\forall S \subset X$ t.c. $\operatorname{diam} S < \delta \Rightarrow S \subset B_d(s, \delta)$ con $s \in S$. $\exists i$ t.c. $\delta \leq \bar{d}(s) \leq d(s, K_i) \Rightarrow B_d(s, \delta) \cap K_i = \emptyset$
 $\Rightarrow S \subset B_d(s, \delta) \subset X - K_i = U_{\alpha_i} \Rightarrow \delta$ numero di Lebesgue. \square