ESPERIENZA 7

SINTESI DI UN COMPLESSO DI Cu(II) CON UNA BASE DI SCHIFF



Ugo Schiff


Sintesi in due stadi:

- 1.Sintesi, isolamento e caratterizzazione di una base di Schiff
- 2. Sintesi e caratterizzazione del complesso di Cu(II)

BASI DI SCHIFF

$$R^2$$
 $O + RNH_2$
 R^1
 R^2
 R^2
 R^2
 R^2
 R^2
 R^2
 R^2
 R^3
 R^4

EFFETTO CHELANTE ED EFFETTO MACROCICLO



Legante tetradentato N₂O₂

Complesso tipo macrociclo

EFFETTO CHELANTE: principale contributo entropico alla maggiore stabilizzazione

EFFETTO MACROCICLO: oltre al fattore entropico, gioca un ruolo importante un addizionale contributo energetico che deriva dalla "natura pre-organizzata" del legante macrociclico in grado di favorire la coordinazione dello ione metallico

SINTESI DELLA BASE DI SCHIFF

- Reazione condotta a freddo
- NON scaldare in stufa la base di Schiff al termine della reazione
- Caratterizzazione via spettroscopia IR allo stato solido e NMR in CDCI₃ (¹H, ¹³C)

Tautomeria cheto-enolica

SINTESI DEL COMPLESSO DI Cu(II)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

- Reazione scaldata a riflusso per 1 ora
- Lasciare a riposo a la miscela al termine della reazione
- Aggiunta di acqua per favorire la precipitazione del prodotto (eventualmente lasciare a riposo per tutta la notte)
- Caratterizzazione via spettroscopia IR allo stato solido