

Fossil-lagerstaetten

Il termine *Fossil Lagerstätten* fu introdotto da Seilacher nel 1970 per definire quei giacimenti dove "il numero e la varietà dei fossili e la perfezione della loro conservazione sono straordinari".

DEPOSITI DI CONCENTRAZIONE

Fossili accumulati da fattori fisici (correnti, moto ondoso).

Importanti per la quantità e la diversità dei reperti, più che per la qualità di conservazione.

Esempi: "Coquinas" - "Bone Beds" - Depositi di fessura

DEPOSITI DI CONSERVAZIONE

Caratterizzati da una conservazione ottimale, indipendentemente dalla quantità dei reperti, dovuto alla mancanza di processi biostratinomici distruttivi e alla rapidità della mineralizzazione rispetto alla putrefazione.

Si dividono in:

Depositi di stagnazione

Depositi di soffocamento

Trappole di conservazione

DEPOSITI DI CONSERVAZIONE

Si dividono in:

Depositi di stagnazione

Si formano nelle parti profonde di bacini lacustri o marini a circolazione limitata, poverissimi o del tutto privi di Ossigeno. Sono ambienti di energia meccanica assente, sedimentazione fine. I fossili sono quasi esclusivamente organismi planktonici o nectonici, che vivono al di sopra della zona anaerobica.

Esempi: Holzmaden, Solnhofen, Bolca.

Depositi di soffocamento

Si formano in seguito della sedimentazione repentina di grandi quantità di sedimento, che seppelliscono istantaneamente gli organismi e i loro resti. Di norma vi si trovano organismi bentonici.

Esempi: Burgess Shale, Hunsrück.

Trappole di conservazione

Si tratta di resine secrete dagli alberi, affioramenti di petrolio greggio, sabbie mobili, stagni, paludi, ... Sono trappole naturali dove gli organismi restano imprigionati, rapidamente sepolti e conservati in modo ottimale grazie alla mancanza di ossigeno, di fluidi in movimento, etc.

Esempi: Rancho La Brea, ambra, Messel

The best of

Ediacara	Precambriano,	Australia
Chengjiang	Cambriano inf.	China
Burgess Shale	Cambriano med.	British Columbia
Orsten	Cambriano sup.	Svezia
Hunsrückshifer	Devoniano Inf.	Germania
Budenbach	Pennsylvaniano inf.	Illinois, USA
Mazon Creek	Giurassico inf.	Germania
Holzmaden	Giurassico	Salerno, Italia
Pietraroia	Giurassico sup.	Germania
Solnhofen	Eocene inf.	Verona
Bolca	Eocene med.	Germania
Grube Messel	Pleistocene sup.-Olocene inf.	Los Angeles, USA
Rancho La Brea		

CRESCITA		UNIPOLARE		BIPOLARE		RADIALE	
		 <i>Parvancorina</i> <i>Vendomia</i> <i>Vendia</i>	 <i>Spriggina</i>	 <i>Pteridium</i>	 <i>Dickinsonia</i>	 <i>Phyllozoon</i>	 <i>Charnia</i>
							 <i>Rangea</i> <i>Glæssnerina</i>
		 <i>Nasepia</i>	 <i>Dickinsonia</i>	 forma a fuso	 forma a fuso	 forma a fuso	 struttura pneumatica
		 <i>Ovatoscutum</i>	 <i>Cyclomedusa</i>	 <i>Tribrachidium</i>	 <i>Rugocoonites</i>	 <i>Albumares</i>	 forma a cespuglio



Spriggina floundersi




Dickinsonia costata

Mawsonites



Chengjiang - Cina - Cambriano inferiore (525-520 Ma)




Burgess Shale - B.C., Canada - Cambriano medio (480 Ma)

Depositi di soffocamento




Burgess Shale - B.C., Canada - Cambriano medio (480 Ma)

Depositi di soffocamento




Burgess Shale - B.C., Canada - Cambriano medio (480 Ma)

Depositi di soffocamento



Orsten - Svezia - Cambriano superiore

Concrezioni di calcari carboniosi con solfuri negli "Alum Shales"






A-C) Ostracodi

D-G) Trilobiti


Hunsrück Budenbach - Germania - Devoniano Inf. (400 Ma)

Depositi di soffocamento




Mazon Creek - Illinois, U.S.A. - Carbonifero medio

Trappole di conservazione-stagnazione





Holzmaden - Germania - Giurassico Inferiore

Depositi di stagnazione




Pietraroia (BN) - Italia - Giurassico

Depositi di stagnazione





Pietraroia (BN) - Italia - Giurassico
Depositi di stagnazione



Solnhofen - Germania - Giurassico Superiore

Depositi di stagnazione



Bolca (VR) - Italia - Eocene inferiore

Depositi di stagnazione



Grube Messel - Germania - Eocene medio

Trappole di conservazione



Argilliti bituminose laminate depositatesi in un bacino lacustre attorniato da una foresta tropicale.

Condizioni anossiche, con assenza di fauna bentonica. Carcasse dei vertebrati spesso articolate.

Fossilizzazione di batteri.




Rancho La Brea - Los Angeles, U.S.A. - Pleistocene sup.-Olocene inf.
Trappole di conservazione



Rancho La Brea - Los Angeles, U.S.A. - Pleistocene sup.-Olocene inf.

Trappole di conservazione



.....

Haquel, Libano
Cretaceo medio




Cyclobatis majer

Florissant Lake
Beds, Teller Co.,
Colorado, USA
Oligocene,



Alepidophora pealei

Madagascar
Triassico



Resti vegetali e animali di ambienti lacustri