



Procedura per effettuare un'iniezione in farmacia



Procedure Operative Standard (SOP) preparatorie a iniezione

1. Preparare la somministrazione in un'area di lavoro pulita;
2. Igiene delle mani;
3. Indossare sempre guanti durante le pratiche iniettive e possibilmente mascherina;
4. Igienizzare con salvietta disinfettante (o soluzione idroalcolica al 60-70%) la superficie esterna della fiala di infusione;
5. Verificare l'integrità del contenitore della formulazione da iniettare, del contenitore della siringa e dall'ago sterile e la data di scadenza;

SOP per iniezione IM sulla spalla

1. Trasferire la formulazione da iniettare all'interno della siringa tramite aspirazione diretta dalla fialetta;
2. Eliminare l'eccesso d'aria contenuto nella siringa (Fig. A);
4. Disinfettare con soluzione alcolica al 60-70% la zona cutanea di iniezione (Fig. B)
5. Inserire con decisione l'ago nel muscolo deltoide mantenendo un angolo di 90° tra ago e pelle (Fig. B-C)
6. Aspirare un piccolo volume con la siringa per verificare che l'iniezione non stia avvenendo in un vaso sanguigno (manovra di Lesser, Fig. D)
6. Iniettare la formulazione con decisione;
7. Estrarre l'ago, disinfettare la pelle nell'area interessata dall'iniezione e apporre un cerotto;

SOP post iniezione

1. Trattenere il paziente in farmacia per i 15 min. successivi all'iniezione per valutare eventuali effetti collaterali a breve termine (e.g., reazione allergica/anafilattica)




Corretta inoculazione Intramuscolare su muscolo deltoide



A



B



C



D



NELLE ATTIVITÀ SVOLTE
ALL'INTERNO DEL SIMULATORE
DI ESERCIZIO FARMACEUTICO
PRESSO UNITS VERRÀ
UTILIZZATO UN
BRACCIO ARTIFICIALE
PER INIEZIONI
INTRAMUSCOLARI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE