

FOSSILI UTILI IN BIOSTRATIGRAFIA

Ammonoidi


Ammonoidi

Gli ammonoidea sono **cefalopodi** che forniscono un'eccezionale dettaglio biostratigrafico ad alta risoluzione dal Devoniano Medio al Cretaceo.




Cefalopodi

I **Cefalopodi** sono **Molluschi**, adattati essenzialmente ad una vita natante; sono un gruppo estremamente specializzato e sono dotati di un'efficienza e di una complessità strutturale superiore a qualsiasi altro gruppo di invertebrati. Possono avere una conchiglia esterna suddivisa in camere da pareti, detti setti.




Cefalopodi

I **Cefalopodi** sono **Molluschi**, adattati essenzialmente ad una vita natante; sono un gruppo estremamente specializzato e sono dotati di un'efficienza e di una complessità strutturale superiore a qualsiasi altro gruppo di invertebrati. Possono avere una conchiglia esterna suddivisa in camere da pareti, detti setti.




Cefalopodi



Distribuzione e abbondanza delle 3 sottoclassi (modified from Dzik 1984 and House 1987)


Cefalopodi

La **linea di sutura** è l'intersezione dei setti con la conchiglia.
E' un importante carattere diagnostico utilizzato nella classificazione.



Cefalopodi

- 1) Sutura **ortoceratitica**: non vi sono veri e propri lobi e selle, ma al massimo ampie ondulazioni dolcemente arrotondate.
- 2) Sutura **agoniatitica**: pochi lobi e selle semplici; sempre presenti uno stretto lobo ventrale ed un ampio lobo laterale; talvolta anche lobi e selle addizionali. Tipica del Devoniano Inf. e Medio.
- 3) Sutura **goniatitica**: otto lobi strettamente arrotondati o appuntiti; quello ventrale comunemente diviso in due lobi appuntiti da una sella mediana. In linea generale, ma non sempre, le selle sono tipicamente arrotondate. Tipica dal Devoniano Sup. al Permiano; rara durante il Triassico e Cretaceo.
- 4) Sutura **ceratitica**: lobi dotati di una caratteristica dentellatura e selle arrotondate. Comparsa durante il Carbonifero inf., si nota in alcuni cefalopodi del Permiano, nella maggior parte delle Ammoniti triassiche e in qualche forma cretacea.
- 5) Sutura **ammonitica**: lobi e selle molto suddivisi e frastagliati. Presente dal Permiano al Cretaceo ma tipica soprattutto delle Ammoniti giurassiche e cretacee.



Cefalopodi

1) Sutura ortoceratitica.

NAUTILOIDI

2) Sutura agoniaticita.


3) Sutura goniaticita.

4) Sutura ceratitica.

AMMONOIDI

5) Sutura ammonitica.


AMMONITI



Caratteristiche

Oltre per la linea di sutura, gli Ammonoidea sono caratterizzati da:

- I **setti** planari, ondulati o leggermente irregolari con la convessità verso l'apertura
- Il **sifuncolo** in posizione dorsale o ventrale (mai centrale)




Caratteristiche

Inoltre:

La **camera d'abitazione** si conserva molto raramente perché non rinforzata da nessuna struttura scheletrica interna. La sua lunghezza varia può variare da mezzo giro di spira a quasi un intero giro.

La sua apertura o peristoma è molto varia: da molto semplice nelle ammoniti paleozoiche a molto complessa, raggiungendo il massimo durante il Giurassico.




Caratteristiche

Inoltre:

L'**ornamentazione**, soprattutto nelle forme mesozoiche, è ben evidente e costituita da elementi trasversali o longitudinali.

I primi sono rappresentati in particolare da coste dotate di diversa forma e variamente sporgenti. Sono presenti inoltre una molteplicità di altri elementi (tubercoli, “bullae”, “clavi”) che possono presentarsi allineati o raggruppati in determinate zone della conchiglia.

Fra le ornamentazioni longitudinali ci sono le “chiglie” ventrali e “solchi” che separano le “creste” con andamento parallelo allo sviluppo dell'avvolgimento.




Caratteristiche

Nelle ammoniti esiste un forte **dimorfismo sessuale** che si rispecchia non solo in alcuni particolari morfologici ma soprattutto nelle dimensioni dei gusci.

Il maschio molto più piccolo con peristoma modificato (chiamato per convenzione forma «**microconca**»), e la femmina notevolmente grande, chiamata forma «**macroconca**».

A lato due coppie dimorfiche; entrambe le forme rappresentano individui adulti.




Storia evolutiva

PALEOZOICO

I primi Ammonoidi sono comparsi durante l'Emsiano ed erano caratterizzati da linee di sutura molto semplici.

Nel Paleozoico la storia evolutiva è discontinua e segnata da varie estinzioni, che hanno quasi portato all'estinzione del gruppo, e altrettante radiazioni.




Storia evolutiva

PALEOZOICO

I primi Ammonoidi sono comparsi durante l'Emsiano ed erano caratterizzati da linee di sutura molto semplici.

Nel Paleozoico la storia evolutiva è discontinua e segnata da varie estinzioni, che hanno quasi portato all'estinzione del gruppo, e altrettante radiazioni. Già dalla loro comparsa gli ammonoidi sono discreti fossili guida.



Stratigrafia


TRIASSICO

La storia degli ammonoidi triassici è racchiusa tra due grandi estinzioni avvenute al limite Permiano/Triassico (P/T) e Triassico/Giurassico (T/J).

Attualmente, la maggior parte degli schemi sistematici di ammonoidi triassici propone tre ordini.

Le ammoniti propriamente dette (Ammonitina) sono documentate nell'ultima parte del Periodo.


Dal punto di vista della biostratigrafia i conodonti sono più abbondanti e diffusi ma consentono una risoluzione migliore a quella della zonazione ad ammonoidi.



Stratigrafia

GIURASSICO


Nel Giurassico si registra la grande radiazione degli Ammonitina e, verso la fine del periodo, la comparsa di Ammonoidi eteromorfi.



Stratigrafia

GIURASSICO

Nel Giurassico (che dura circa 54 Ma) sono distinte 80 biozone ad ammonoidi, con due schemi di biozonazione parzialmente diversi per la Tetide e le aree più a nord.




Stratigrafia

CRETACEO

Nel Cretaceo si registra l'ultima differenziazione degli radiazione degli Ammonoidi.

Il gruppo si estingue alla fine del periodo, ma era già in crisi qualche milione di anni prima.




Stratigrafia

CRETACEO


Nel Cretaceo si registra l'ultima differenziazione degli radiazione degli Ammonoidi.

Il gruppo si estingue alla fine del periodo, ma era già in crisi qualche milione di anni prima.

Nel Cretaceo (80 Ma) si contano oltre 130 biozone ad ammonoidei.



Cronostratigrafia



Cronostratigrafia

GSSPs of the Triassic Stages, with location and primary correlation criteria

Stage	GSSP Location	Latitude, Longitude	Boundary Level	Correlation Events	Reference
<i>Rhaetian</i>	<i>Candidates are Pizzo Mondello, Sicily, Italy, and Steinbergkogel, Austria</i>			<i>Near FADs of conodont Misikella posthernsteini s.s. or Misikella posthernsteini s.l.</i>	
<i>Norian</i>	<i>Candidates are Black Bear Ridge in British Columbia (Canada) and Pizzo Mondello, Sicily, Italy</i>			<i>FAD of conodont Metapolygnathus parvus. Near base of Stikinoceras kerri ammonoid zone and FAD of bivalve Halobia austriaca</i>	
Carnian	Section at Prati di Stuares, Dolomites, Italy	46°31'37"N 11°55'49"E	GSSP is base of marly limestone bed SW4, 45 m from base of San Cassiano Formation	FAD of ammonoid <i>Daxatina canadensis</i> , conodont <i>Quadralella polygnathiformis</i> and <i>Halobia</i> bivalves	Episodes 35/3, 2012
Ladinian	Bagolino, Province of Brescia, Northern Italy	45°49'09.5"N 10°28'15.5"E	base of a 15 – 20 cm thick limestone bed overlying a distinctive groove ("Chiesense groove") of limestone nodules in a shaly matrix, located about 5 m above the base of the Buchenstein Beds	Ammonoid, FAD of <i>Eoprotrachyceras curionii</i>	Episodes 28/4, 2005
<i>Anisian</i>	<i>Candidates are Desli Caira (Romania), Kçira (Albania), Wantou (Guangxi Province, S. China) and Guandao (Guizhou Province, S. China)</i>			<i>FAD of conodont Chiosella timorensis or base of magnetic normal- polarity chronozone MT1n</i>	
<i>Olenekian</i>	<i>Candidates are Chaohu, China and Mud (Muth) village, Spiti Valley, India</i>			<i>FAD of conodont Novispathodus waageni, near base of Flemingites ammonoid genera</i>	
Induan	Meishan, Zhejiang Province, China	31°4'47.28"N 119°42'20.90"E	base of Bed 27c in the Meishan Section	Conodont, FAD of <i>Hindeodus parvus</i>	Episodes 24/2, 2001

* according to Google Earth

*

*

Cronostratigrafia

GSSPs of the Jurassic Stages, with location and primary correlation criteria

Stage	GSSP Location	Latitude, Longitude	Boundary Level	Correlation Events	Reference
<i>Tithonian</i>	<i>candidates are Mt. Crussol or Canjuers (SE France) and Swabia, Germany</i>			<i>Near bases of Hybonotoceras hybonotum ammonite zone, of Gravesia genus, and of polarity chron M22An</i>	
<i>Kimmeridgian</i>	<i>candidate is Flodigarry (Isle of Skye, NW Scotland)</i>			<i>Ammonite, FAD of Pictonia flodigarriensis (base of Pict. baylei Zone) of Sub-Boreal realm, and base of polarity chron M26r</i>	
<i>Oxfordian</i>	<i>candidates are Thuoux and Saint-Pierre d'Argençon sections, SE France</i>			<i>Ammonite, FAD of Brightia thuouxensis (base of Quenstedtoceras mariae Zone)</i>	
<i>Callovian</i>	<i>candidates are Pfeffingen, Swabian Alb, SW Germany, and Novgorod region, Russia</i>			<i>Ammonite, FAD of Kepplerites (Kosmoceratidae); defines base of Macrocephalites herveyi Zone in UK and SW Germany</i>	
Bathonian	Ravin du Bès, Bas-Auran area, Alpes de Haute Provence, France	43°57'38"N 6°18'55"E*	base of limestone bed RB071	Ammonite, FAD of <i>Gonolkites convergens</i>	Episodes 32/4 , 2009
Bajocian	Murtinheira Section, Cabo Mondego, Portugal	40°11'57"N 8°54'15"W*	base of Bed AB11 of the Murtinheira Section	Ammonite, FAD of <i>Hyperlioceras mundum</i>	Episodes 21/1 , 1997
Aalenian	Fuentelsaz, Spain	41°10'15"N 1°50'W	base of Bed FZ 107 in Fuentelsaz Section	Ammonite, FAD of <i>Leioceras opalinum</i>	Episodes 24/3 , 2001
Toarcian	Ponta do Trovao, Peniche, Lusitanian Basin, Portugal	39°22'15"N 9°23'07"W	base of micritic limestone bed 15e	Ammonite, FAD of <i>Dactylioceras (Eodactylioceras) simplex</i>	Episodes 39/3 , 2016
Pliensbachian	Robin Hood's Bay, Yorkshire Coast, England	41°10'15"N 1°50'W	base of Bed 73b at Wine Haven, Robin Hood's Bay	Ammonite, FAD of <i>Bifericeras donovani</i>	Episodes 29/2 , 2006
Sinemurian	East Quantoxhead, SW England	51°11'27.3"N 3°14'11.2"W*	0.90 m above the base of Bed 145	Ammonite, FAD of <i>Vermiceras quantoxense</i>	Episodes 25/1 , 2002
Hettangian	Kuhjoch Section, Karwendel Mtns, Austria	47°29'02"N 11°31'50"E	5.80 m above base of the Tiefengraben Mbr. of the Kendelbach Formation	Ammonite, FAD of <i>Psiloceras spelae</i>	Episodes 36/3 , 2013

* according to Google Earth

