

Lezione 2

L'unità statistica e le variabili statistiche

PROF. ROBERTO COSTA

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - STATISTICA SOCIALE (305SF)

Calendario delle lezioni

1^ lezione Lunedì 22/9 ore 10.00 – 13.00

2^ lezione Lunedì 29/09 ore 10.00 – 13.00

3^ lezione Lunedì 6/10 ore 10.00 – 13.00

4^ lezione Lunedì 13/10 ore 10.00 – 13.00

5^ lezione Lunedì 20/10 ore 10.00 – 13.00

6^ lezione Lunedì 27/10 ore 10.00 – 13.00

7^ lezione Lunedì 3/11 ore 10.00 – 13.00

8^ lezione Lunedì 10/11 ore 10.00 – 13.00

9^ lezione Lunedì 24/11 ore 10.00 – 13.00

10^ lezione Lunedì 1/12 ore 10.00 – 13.00

Dove eravamo rimasti

Nella scorsa lezione abbiamo parlato di cos'è la statistica e perché è importante conoscerla.

Abbiamo visto le fasi di una ricerca quantitativa (progettazione, rilevazione, analisi, diffusione).

Abbiamo approfondito il concetto di dato (microdati, macrodati, metadati).

C'era anche un piccolo lavoro da fare, ci siete riusciti? Avete trovato i metadati?

Dove eravamo rimasti

Ecco le definizioni:

OCCUPATI: Persone tra 15 e 89 anni che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti familiari non retribuiti;
- sono temporaneamente assenti dal lavoro perché in ferie, con orario flessibile (part time verticale, recupero ore, etc.), in malattia, in maternità/paternità obbligatoria, in formazione professionale retribuita dal datore di lavoro;
- sono in congedo parentale e ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al lavoro, indipendentemente dalla durata dell'assenza;
- sono assenti in quanto lavoratori stagionali ma continuano a svolgere regolarmente mansioni e compiti necessari al proseguimento dell'attività (da tali mansioni e compiti va escluso l'adempimento di obblighi legali o amministrativi);
- sono temporaneamente assenti per altri motivi e la durata prevista dell'assenza è pari o inferiore a tre mesi.

DISOCCUPATI: Persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che:

- hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana a cui le informazioni sono riferite e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure
- inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.

Dove eravamo rimasti

INATTIVI: Persone che non fanno parte delle forze di lavoro, cioè quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione (disoccupate). Rientrano nella categoria coloro che:

- non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e non sono disponibili a lavorare entro due settimane dall'intervista;
- pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane si sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall'intervista;
- hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma che non sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall'intervista.

Script QB01 (obbligatorio da leggere)

Le prossime domande riguardano l'attività lavorativa svolta "LA SCORSA SETTIMANA", cioè la settimana che va "DA LUNEDÌ" ... A DOMENICA...". Consideri qualsiasi attività lavorativa retribuita, in proprio o alle dipendenze, con o senza contratto.

QB01 "LA SCORSA SETTIMANA" [NOME] ha svolto almeno un'ora di lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno?

Se necessario leggere: Deve escludere le ore di lavoro svolte al fine di percepire il reddito di cittadinanza o la frequenza di un corso di dottorato di ricerca nel caso siano le uniche ore di lavoro svolte.

ATTENZIONE: NON va considerato il lavoro NON RETRIBUITO svolto presso la ditta di un familiare.

Si 1 ☐
No 2 ☐

QB02 Sempre nella settimana che va "DA LUNEDÌ" ... A DOMENICA...", [NOME] ha lavorato almeno un'ora, senza essere pagata/o, presso la ditta di un familiare?

Si 1 ☐
No 2 ☐

QB03 Sempre in quella settimana, [NOME] aveva comunque un lavoro che non ha svolto, ad esempio per un periodo limitato di ridotta attività, per malattia, per vacanza, per un corso di formazione legato al suo lavoro, per cassa integrazione guadagni, etc.?

Se necessario leggere: consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.

Si 1 ☐
No 2 ☐

QB04 E invece, nelle quattro settimane che vanno "DA LUNEDÌ" 4 settimane precedenti ... A DOMENICA...", "NOME", ha svolto lavori occasionali o lavoretti guadagnando qualcosa, ad esempio come baby-sitter, cameriere, ripetizioni, consegne, etc.?

Se necessario leggere: Deve escludere le ore di lavoro svolte al fine di percepire il reddito di cittadinanza nel caso siano le uniche ore di lavoro svolte.

Si (escluse eventuali ore di lavoro per percepire il reddito di cittadinanza) 1 ☐
No, ho lavorato solo poche ore per percepire il reddito di cittadinanza 2 ☐
No, nessuna ora di lavoro 3 ☐

QB05 [NOME] ha svolto almeno un'ora di questi lavori nella settimana che va "DA LUNEDÌ" ... A DOMENICA..."?

QB06 Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato in quella settimana?

Ferie e festività 1 ☐
Regimi di orario flessibile (incluso part time verticale) o
compensazione delle ore di lavoro straordinario 2 ☐
Malattia, problemi di salute, infortunio 3 ☐
Congedo di maternità obbligatorio o congedo di paternità 4 ☐
Congedo parentale, ossia assenza facoltativa fino al dodicesimo
anno del bambino 5 ☐
Altri motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria
e congedo parentale) 6 ☐
Formazione professionale direttamente collegata al lavoro oppure
retribuita dal datore di lavoro (incluso il dottorato retribuito) 7 ☐
Formazione professionale non direttamente
collegata al lavoro oppure non retribuita dal datore di lavoro 8 ☐
Cassa Integrazione Guadagni (CIG ordinaria o straordinaria) 9 ☐
Ridotta attività/mancanza lavoro (esclusa CIG) 10 ☐
Lavoro stagionale (ad es. bagnino,
raccoltore di frutta, cameriere in montagna d'inverno etc.) 11 ☐
Ha un lavoro che non ha ancora iniziato 12 ☐
Fa un lavoro occasionale 994 ☐
Altro motivo (specificare) (QB06_a) _____ 996 ☐

QB07 In quella settimana era assente o proprio non aveva impegni di lavoro?

Aveva un lavoro ma era assente 1 ☐
Non aveva un lavoro 2 ☐

QB08 Durante il periodo di assenza continua a percepire una remunerazione (congedo parentale retribuito)?

Se necessario leggere: consideri anche il solo versamento dei contributi previdenziali.

Si il 50% o più della retribuzione 1 ☐
Si meno del 50% della retribuzione 2 ☐
No, non retribuito, solo contributi 3 ☐
No, non retribuito 4 ☐

QB09 Questo periodo di assenza dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, da quando è iniziato a quando terminerà?

Consideri solo il periodo di assenza facoltativa escludendo l'assenza obbligatoria per la nascita del bambino (se l'assenza facoltativa avviene subito dopo il periodo di assenza obbligatoria)

Meno di tre mesi 1 ☐
Tre mesi o più 2 ☐

L'unità statistica

L'unità statistica è l'unità elementare su cui vengono rilevate le variabili oggetto delle analisi statistiche.

Nella ricerca sociale l'unità statistica è solitamente l'essere umano, del quale voglio studiare i comportamenti, le abitudini culturali, le relazioni interpersonali, lo status socio economico, ecc.

L'individuo non è l'unica unità statistica, possono costituire un'unità statistica le famiglie, le classi scolastiche, le aziende, le organizzazioni non profit, ecc.

Dobbiamo distinguere tra:

Unità di raccolta (o di rilevamento): presso le quali vengono raccolte le informazioni.

Unità di analisi (o di riferimento): a cui si riferiscono le informazioni raccolte.

Ad es. intervisto il responsabile del personale (unità di raccolta) per acquisire informazioni sul benessere degli addetti di un'impresa (unità di analisi).

La popolazione

La popolazione (o collettivo) è un insieme di unità omogenee rispetto a una o più caratteristiche. Nella ricerca sociale le popolazioni devono essere contestualizzate nello spazio e nel tempo.

A questo proposito si distinguono:

Popolazioni o collettivi di stato: definibili un unico istante di tempo (ad es. residenti in un comune al 1.1.2022);

Popolazioni o collettivi di movimento: definibili in un intervallo di tempo (nati in un comune nel 2022, i laureati dell'Università di Trieste nell'anno accademico 2022-2023).

La popolazione

Si distingue inoltre tra:

La **popolazione empirica**: se tutte le unità che la compongono possono effettivamente fare parte della ricerca (immatricolati al primo anno del corso di studi di scienze dell'educazione nell'a. a. 2022-23).

La **popolazione teorica**: se alcune unità non possono essere osservate (persone entrate clandestinamente in Italia nel 2021).

Questo impatta ad esempio sulla costruzione del campione casuale rappresentativo della popolazione.

Tipo di rilevazione

Una volta definita la popolazione e le sue unità, il ricercatore decide se la raccolta dei dati debba riguardare tutta la popolazione o solo una parte di essa.

Si parla nel primo caso di **rilevazione totale o censuaria** e nel secondo caso di **rilevazione parziale o campionaria**.

Il contenimento dei tempi e dei costi di una ricerca sono il motivo principale per optare per una rilevazione campionaria.

Ci sono anche altri motivi, come ad esempio nei test di qualità di certi prodotti, laddove il test determina l'inutilizzabilità del prodotto (ad es. analisi della durata di una lampadina).

La numerosità campionaria dev'essere congrua alle analisi sui dati che si intende fare.

Ad esempio devo garantire una adeguata numerosità a eventuali sottogruppi della popolazione che voglio analizzare (per genere, territorio, età, ecc.).

La rilevazione parziale o campionaria

Il campione deve riprodurre in scala le caratteristiche della popolazione da cui viene estratto.

Le unità che comporranno il campione devono essere estratte in modo casuale, ovvero nel rispetto delle leggi della probabilità (**campione probabilistico**).

In questo caso potremo generalizzare i risultati della rilevazione all'intera popolazione di riferimento.

Come acquisire i dati

Definiti gli obiettivi e la popolazione di riferimento, bisogna decidere come si vogliono raccogliere i dati.

Nella ricerca sociale quantitativa lo strumento più utilizzato è il **questionario**, formato da diverse domande predefinite, che seguono un preciso ordine.

In base ai contenuti del questionario si distinguono questionari **strutturati**, **semi strutturati** e **non strutturati**.

Abbiamo già visto che una possibile alternativa è il ricorso a dati secondari, ovvero già raccolti, seppur con finalità diverse, in altre circostanze (ad es. dati di fonte amministrativa, big data, ecc.).

Come acquisire i dati

Il **questionario strutturato** prevede l'uso esclusivo o prevalente di risposte fisse precodificate ed è particolarmente idoneo nel caso di indagini su campionature molto ampie.

Il **questionario semi strutturato** viene formulato in modo da lasciare una certa libertà alle risposte dell'intervistato, seppure all'interno di griglie predefinite dal ricercatore.

Il **questionario non strutturato** fa invece ricorso a domande aperte, permettendo all'intervistato di dare una risposta il più possibile personale e non condizionata dall'ottica del ricercatore.

Il questionario non strutturato viene utilizzato soprattutto se l'obiettivo è soprattutto esplorativo, mentre con il questionario strutturato l'obiettivo è soprattutto la misurazione.

Esempi di domande

3.3 Con che frequenza si vede con amici nel tempo libero?

- Tutti i giorni1 ☐
- Più di una volta a settimana2 ☐
- Una volta a settimana3 ☐
- Qualche volta al mese (meno di 4)4 ☐
- Qualche volta durante l'anno5 ☐
- Mai6 ☐
- Non ho amici7 ☐

5.9 Può dirmi il nome della sua professione?

Nel caso in cui svolga più attività lavorative, faccia sempre riferimento alla principale e indichi nel modo più dettagliato possibile qual è il lavoro, la professione o il mestiere svolto (es.: commercialista, professore di lettere, camionista, ecc.) evitando termini generici come impiegato o operaio.

Specificare.....
.....
.....
.....
.....

5.4 Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato da lunedì a domenica della scorsa settimana ?

- Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)01 ☐
- Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG)02 ☐
- Sciopero03 ☐
- Vertenza sindacale, controversia di lavoro04 ☐
- Maltempo05 ☐
- Malattia, problemi di salute personali, infortunio06 ☐
- Ferie07 ☐
- Festività nella settimana08 ☐
- Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)09 ☐
- Part time verticale10 ☐
- Studio o formazione non organizzata nell'ambito del proprio lavoro11 ☐
- Assenza obbligatoria per maternità12 ☐
- Assenza facoltativa fino all'ottavo anno del bambino (congedo parentale)13 ☐
- Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)14 ☐
- Mancanza di occasioni di maggior lavoro15 ☐
- Fa un lavoro occasionale16 ☐
- Fa un lavoro stagionale alle dipendenze17 ☐
- Altro motivo18 ☐

(specificare)

Qui possiamo vedere:

- ✓ Una domanda chiusa (3.3), con le modalità di risposta già codificate.
- ✓ Una domanda aperta (5.9), dove l'intervistato può rispondere liberamente.
- ✓ Una domanda chiusa, con una modalità residua (5.4), dove si possono raccogliere ulteriori modalità di risposta.

Le variabili statistiche

Ogni unità presenta delle **caratteristiche** che vogliamo rilevare (ad es. il genere, l'età, l'occupazione, l'orientamento politico, ecc.).

Ogni caratteristica può assumere valori differenti tra le varie unità. In questo caso la caratteristica viene chiamata **variabile** (o anche **carattere**).

I valori che può assumere una variabile vengono chiamati **modalità**.

Ad esempio: se voglio rilevare il mezzo utilizzato per arrivare all'università stamattina immagino che potrò avere diverse modalità di risposta, come ad esempio «treno», «automobile», «motocicletta/scooter», «bicicletta», «monopattino», «a piedi», ecc.

Inoltre si potrebbero utilizzare uno o più mezzi di trasporto, per cui posso dare una o più risposte (domande a risposta multipla).

Le variabili statistiche

Le variabili si distinguono a seconda di come vengono espresse le modalità.

Se le modalità sono espresse in numeri cardinali, si chiamano **variabili quantitative** (o cardinali).

Altrimenti si chiamano **variabili qualitative** (o mutabili).

Ad esempio l'età è una variabile quantitativa, il comune di residenza è una variabile qualitativa.

Le variabili qualitative

Le variabili qualitative, a loro volta, si distinguono tra:

Mutabili rettilinee, che sono ordinabili secondo un determinato criterio (ad es. titolo di studio: primario, secondario, terziario).

Mutabili sconnesse, per le quali un ordinamento non ha motivi per essere preferibile ad un altro (ad es. settore di attività: agricoltura, industria, servizi).

Questa distinzione determina le operazioni statistiche che potremo fare su queste variabili.

La definizione operativa per creare questo tipo di variabili si chiama **classificazione**, ovvero raggruppare le unità in classi in base a una determinata caratteristica. Il ricercatore deve prevedere tutte le possibili classi (classificazione esaustiva).

Mutabili sconnesse

Proviamo a fare qualche esempio di **mutabili sconnesse**:

Genere, Corso di studio, Comune di nascita, stato civile, religione, nazionalità, ecc.

Tra le modalità di queste variabili possiamo solo verificare **uguaglianza** o **diversità**.

Mutabili rettilinee

Proviamo a fare qualche esempio di **mutabili rettilinee**:

Titolo di studio, grado gerarchico militare, categoria sportiva, categorie contrattuali, ecc.

Tra le modalità di queste variabili, oltre a verificare uguaglianza o diversità, possiamo anche utilizzare un ordinamento e definire delle relazioni **maggiore di** o **minore di**.

La laurea è un titolo più elevato del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il generale è un grado gerarchico più elevato del sergente, ecc.

Rivediamo gli esempi

3.3 Con che frequenza si vede con amici nel tempo libero?

- Tutti i giorni1 ☐
- Più di una volta a settimana2 ☐
- Una volta a settimana3 ☐
- Qualche volta al mese (meno di 4)4 ☐
- Qualche volta durante l'anno5 ☐
- Mai6 ☐
- Non ho amici7 ☐

5.4 Qual è il motivo principale per cui non ha lavorato da lunedì a domenica della scorsa settimana ?

- Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria)01 ☐
- Ridotta attività dell'impresa per motivi economici e/o tecnici (esclusa CIG)02 ☐
- Sciopero03 ☐
- Vertenza sindacale, controversia di lavoro04 ☐
- Maltempo05 ☐
- Malattia, problemi di salute personali, infortunio06 ☐
- Ferie07 ☐
- Festività nella settimana08 ☐
- Orario variabile o flessibile (ad es. riposo compensativo)09 ☐
- Part time verticale10 ☐
- Studio o formazione non organizzata nell'ambito del proprio lavoro11 ☐
- Assenza obbligatoria per maternità12 ☐
- Assenza facoltativa fino all'ottavo anno del bambino (congedo parentale)13 ☐
- Motivi familiari (esclusa maternità obbligatoria e congedo parentale)14 ☐
- Mancanza di occasioni di maggior lavoro15 ☐
- Fa un lavoro occasionale16 ☐
- Fa un lavoro stagionale alle dipendenze17 ☐
- Altro motivo18 ☐

(specificare)

Qui possiamo vedere:

- ✓ Una mutabile rettilinea (3.3), con le modalità di risposta che indicano una frequenza di incontri con gli amici calante.
- ✓ Una mutabile sconnessa (5.4), dove non c'è un criterio che possa fornire un ordinamento.

Le variabili quantitative

Le **variabili quantitative** sono quelle le cui modalità vengono espresse con numeri cardinali.

Tra le modalità di queste variabili sono effettuabili le relazioni *maggiore di* o *minore di*, ma anche tutte le operazioni aritmetiche.

Sono ad esempio variabili quantitative: l'età, il numero di figli, la statura, il peso, il numero di esami sostenuti, ecc.

Le variabili quantitative

Le variabili quantitative si distinguono ulteriormente tra **variabili discrete** e **variabili continue**.

Nel caso di variabili discrete, le modalità sono espresse da numeri interi e tra una modalità e un'altra non ci sono stati intermedi. Ad esempio il numero di figli può essere 0, 1, 2,... ma non 1,3!

Si tratta quindi di variabili quantitative a proprietà discrete, esito di un **conteggio**.

Le variabili quantitative

Nel caso di variabili continue, le modalità sono espresse da numeri reali e le modalità possono essere in numero pressoché infinito, di norma aggregato in classi.

Si tratta quindi di variabili quantitative a proprietà continue, esito di una **misurazione**.

Le variabili quantitative

Tra le variabili quantitative distinguiamo anche tra **scale a intervalli** e **scale di rapporti**.

La scala a intervalli non ha uno zero assoluto che corrisponde ad una mancanza totale di proprietà.

La scala di rapporti ha invece uno zero non arbitrario che corrisponde alla mancanza di proprietà.

Le variabili quantitative

Un esempio tipico di scala a intervalli è la temperatura, dove si usano diverse scale (ad es. Celsius o Fahrenheit).

Lo zero in gradi Celsius corrisponde alla temperatura alla quale gela l'acqua.

Non è quindi un'assenza di temperatura!

Le differenze di grandezza possono quindi essere fatte solo in termini di distanze.

Ad esempio se in due città misuro una temperatura rispettivamente di 10° e 20° Celsius, non è corretto dire che in una città la temperatura è doppia dell'altra.

Se usassi la scala Fahrenheit, le temperature sarebbero di 50 e 68 gradi.

Altri esempi di scale a intervalli sono: l'anno di nascita, i voti (di un esame, di diploma di laurea, ecc.), latitudine e longitudine,...

Le variabili quantitative

Nelle scale di rapporti, siccome il punto zero è naturale si possono confrontare due modalità mettendole a rapporto.

Se un individuo ha due figli e un altro ne ha uno, posso affermare che il primo ha il doppio dei figli dell'altro.

Se un operaio percepisce uno stipendio netto mensile di 1.500 euro e un dirigente ne ha uno di 4.500 euro, posso dire che il quest'ultimo riceve uno stipendio pari a tre volte quello dell'operaio.

Esempi di scale di rapporti sono: età, reddito, statura, peso, spese per consumi, ammontare dei depositi sul C/C,...

Sentirete parlare anche di...

Si distinguono le variabili qualitative in base al numero di modalità che possono assumere:

Variabili dicotomiche (con due modalità di risposta come: sì o no, presente o assente, ecc.).

Variabili politomiche (che possono assumere più di due modalità di risposta come corso di laurea, titolo di studio, ecc.).

Possiamo distinguere anche le variabili in base al ruolo assunto nella spiegazione dei fenomeni sociali. Possiamo ad esempio assumere una dipendenza tra due variabili, individuandone una come causa e l'altra come effetto.

Variabili indipendenti: la variabile individuata come causa (ad es. titolo di studio).

Variabili dipendenti. la variabile individuata come effetto (ad es. reddito mensile netto).

Variabili e analisi statistica

Per le finalità di questo corso ci concentreremo, parlando di analisi dei dati sulla seguente classificazione delle variabili:

- ✓ Variabili qualitative sconnesse (con categorie non ordinate)
- ✓ Variabili qualitative rettilinee (con categorie ordinate)
- ✓ Variabili quantitative discrete
- ✓ Variabili quantitative continue

Rappresentazione dei dati

La matrice dei dati, soprattutto se composta da tante variabili raccolte su tante unità statistiche, non è certo lo strumento più efficace per sintetizzare i risultati.

La forma più semplice per rappresentare una variabile è la distribuzione semplice.

Adesso facciamo un esempio pratico.

Rappresentazione dei dati

Supponiamo di aver raccolto i risultati degli studenti che hanno sostenuto l'esame di statistica sociale nell'anno accademico 2022-23.

Questi sono i risultati:

30, 27, 22, 24, 21, 19, 26, 18, 28, 21, 24, 22, 30, 28, 18, 19, 23, 26, 29, 27, 20, 30, 27, 26, 30, 30, 26, 24, 28, 27.

Rappresentazione dei dati

La prima cosa che possiamo fare è la **distribuzione delle frequenze assolute** della variabile **voto**.

In questo modo rappresento il numero di volte che si è presentata una modalità.

Voto	Frequenza assoluta
18	2
19	2
20	1
21	2
22	2
23	1
24	3
26	4
27	4
28	3
29	1
30	5
Totale	30

Rappresentazione dei dati

Generalizzando, se in un insieme di N casi una variabile X assume k modalità ($x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_k$) di cui $n_1, n_2, \dots, n_j, \dots, n_k$ sono le rispettive frequenze assolute, la tabella seguente rappresenta la distribuzione delle frequenze.

Modalità della variabile X	Frequenza assoluta
x_1	n_1
x_2	n_2
...	...
x_j	n_j
...	...
x_k	n_k
Totale	N

Rappresentazione dei dati

Spesso capita di dover mettere a confronto distribuzioni di frequenza della stessa variabile, risultato di due diverse rilevazioni, ad esempio la variabile voto nell'esame di statistica sociale nell'a.a. 2021-22 e 2022-23.

La tabella così com'è non è di facilissima interpretazione.

In questo caso è più utile la **distribuzione delle frequenze relative e percentuali** della variabile **voto**.

Voto	2022/23	2021/22
18	2	2
19	2	4
20	1	2
21	2	3
22	2	3
23	1	5
24	3	4
25	0	3
26	4	6
27	4	4
28	3	5
29	1	3
30	5	6
Totale	30	50

Rappresentazione dei dati

La distribuzione delle **frequenze relative** si ottiene dividendo la frequenza assoluta delle modalità per il numero totale dei casi.

La **frequenza percentuale** si ottiene moltiplicando per 100 la frequenza relativa.

Modalità della variabile X	Frequenza assoluta	Frequenza relativa	Frequenza percentuale
x_1	n_1	n_1/N	$n_1/N \times 100$
x_2	n_2	n_2/N	$n_2/N \times 100$
...	...	...	...
x_j	n_j	n_j/N	$n_j/N \times 100$
...	...	...	...
x_k	n_k	n_k/N	$n_k/N \times 100$
Totale	N	1	100

Voto 2022/23	Frequenza assoluta	Frequenza relativa	Frequenza percentuale
18	2	0,06667	6,666667
19	2	0,06667	6,666667
20	1	0,03333	3,333333
21	2	0,06667	6,666667
22	2	0,06667	6,666667
23	1	0,03333	3,333333
24	3	0,1	10
25	0	0	0
26	4	0,13333	13,33333
27	4	0,13333	13,33333
28	3	0,1	10
29	1	0,03333	3,333333
30	5	0,16667	16,66667
Totale	30	1	100

Voto 2021/22	Frequenza assoluta	Frequenza relativa	Frequenza percentuale
18	2	0,04	4
19	4	0,08	8
20	2	0,04	4
21	3	0,06	6
22	3	0,06	6
23	5	0,1	10
24	4	0,08	8
25	3	0,06	6
26	6	0,12	12
27	4	0,08	8
28	5	0,1	10
29	3	0,06	6
30	6	0,12	12
Totale	50	1	100

La frequenza cumulata

Nel caso di variabili qualitative rettilinee o variabili quantitative per il ricercatore può essere utile conoscere con che frequenza si presentano le modalità di ordine inferiore o superiore a una specifica modalità.

Ad esempio, quanti studenti hanno preso più di un determinato voto.

Si utilizza la **frequenza cumulata**, ovvero il numero di casi che hanno un valore uguale o inferiore a quello della categoria di riferimento.

Ripetiamo che questo non si può utilizzare con le variabili qualitative sconnesse.

Distribuzioni cumulate

Guardando il nostro esempio, 5 studenti su 30 (il 16,67%) hanno preso un voto inferiore o uguale a 20.

Per calcolare le frequenze cumulate bisogna iniziare dalla frequenza associata alla modalità più bassa e man mano sommando le frequenze delle modalità successive.

Generalizzando:

Frequenze assolute $N_j = n_1 + n_2 + \dots n_{j-1} + n_j$

Frequenze relative $F_j = f_1 + f_2 + \dots f_{j-1} + f_j$

Frequenze percentuali $P_j = p_1 + p_2 + \dots p_{j-1} + p_j$

Voto 2022/23	Frequenza assoluta	Frequenza relativa	Frequenza %	Freq. cumulata relativa	Freq. cumulata %
18	2	0,07	6,67	0,07	6,67
19	2	0,07	6,67	0,13	13,33
20	1	0,03	3,33	0,17	16,67
21	2	0,07	6,67	0,23	23,33
22	2	0,07	6,67	0,30	30,00
23	1	0,03	3,33	0,33	33,33
24	3	0,10	10,00	0,43	43,33
25	0	0,00	0,00	0,43	43,33
26	4	0,13	13,33	0,57	56,67
27	4	0,13	13,33	0,70	70,00
28	3	0,10	10,00	0,80	80,00
29	1	0,03	3,33	0,83	83,33
30	5	0,17	16,67	1,00	100,00
Totale	30	1,00	100,00	1,00	100,00

Esercitiamoci assieme...

Il contenuto di una cella di una distribuzione di frequenze dei dati viene chiamato:

- a. Un microdato ☐
- b. Un macrodato ☐
- c. Un metadato ☐

Un'unità elementare di informazione, cioè un dato sulla singola unità statistica si definisce.

- a. Un microdato ☐
- b. Un macrodato ☐
- c. Un metadato ☐

Esercitiamoci assieme...

In quale fase bisogna definire operativamente i concetti della ricerca:

- a. Progettazione ☐
- b. Raccolta dei dati ☐
- c. Analisi dei dati ☐
- d. Diffusione ☐

Per *operazionalizzazione* intendiamo.

- a. La definizione delle elaborazioni che si faranno una volta raccolti i dati ☐
- b. La trasformazione di un concetto in variabili che andranno rilevate sul campo ☐
- c. La costruzione di tabelle di frequenza ☐

Esercitiamoci assieme...

L'età è una variabile:

- a. qualitativa sconnessa ☐
- b. qualitativa ordinata ☐
- c. quantitativa discreta ☐
- d. quantitativa continua ☐

Per una variabile qualitativa sconnessa, posso fare quale operazione.

- a. uguale/diverso ☐
- b. maggiore/minore ☐

Esercitiamoci assieme - risposte

Il contenuto di una cella di una distribuzione di frequenze dei dati viene chiamato:

- a. Un microdato ☐
- b. **Un macrodato** ☐
- c. Un metadato ☐

Un'unità elementare di informazione, cioè un dato sulla singola unità statistica si definisce.

- a. **Un microdato** ☐
- b. Un macrodato ☐
- c. Un metadato ☐

Esercitiamoci assieme - risposte

In quale fase bisogna definire operativamente i concetti della ricerca:

- a. **Progettazione** ☒
- b. Raccolta dei dati ☐
- c. Analisi dei dati ☐
- d. Diffusione ☐

Per *operazionalizzazione* intendiamo.

- a. La definizione delle elaborazioni che si faranno una volta raccolti i dati ☐
- b. **La trasformazione di un concetto in variabili che andranno rilevate sul campo** ☒
- c. La costruzione di tabelle di frequenza ☐

Esercitiamoci assieme...

L'età è una variabile:

- a. qualitativa sconnessa ☐
- b. qualitativa ordinata ☐
- c. quantitativa discreta ☐
- d. **quantitativa continua** ☐

Per una variabile qualitativa sconnessa, posso fare quale operazione.

- a. **uguale/diverso** ☐
- b. maggiore/minore ☐