

Università degli Studi di Trieste
CORSO DI LAUREA IN INFIERIERISTICA

LABORATORIO 2° ANNO: POSIZIONAMENTO DI SONDINO NASO GASTRICO - SCOPO EVACUATIVO				
OBIETTIVI				
<p>Lo studente al termine del laboratorio deve essere in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saper posizionare il sondino senza complicanze, dopo aver valutato le indicazioni alla procedura - Eseguire la procedura in sicurezza - Tempo previsto per la procedura 15 minuti 				
	FASI E SEQUENZA OPERATIVA	ESEGUITO CORRETTAMENTE	ESEGUITO NON CORRETTAMENTE	NON ESEGUITO
ACCERTAMENTO	Identifica ed informa la persona			
	Valuta lo stato di coscienza ed il grado di collaborazione della persona			
	Accerta che la persona assistita abbia dato il proprio consenso			
PREPARAZIONE AMBIENTE E MATERIALE	Predisponde il carrello con il materiale occorrente: sng (adeguato alle indicazioni), lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50 ml cono catetere, sacca di raccolta () se necessaria), bicchiere d'acqua con cannuccia, garze, telino, guanti, occhiali di protezione, cerotto o sistema di fissaggio, eventuale tappo per il sng, strisce reattive del pH, pennarello indelebile			
	Garantisce la privacy ed il comfort			
SICUREZZA ASSISTITO ED OPERATORE	Esegue l'igiene delle mani			
	Indossa i DPI			
	Fa assumere alla persona la posizione di Fowler alta, posiziona il telino sul torace, ispeziona e fa soffiare il naso per verificare la pervietà delle narici, rimuove eventuali protesi dentarie/occhiali.			

Università degli Studi di Trieste
CORSO DI LAUREA IN INFIERIERISTICA

ESECUZIONE	Determina la lunghezza del SNG (punta del naso-lobo orecchio-processo xifoideo + 10 cm), marca il sondino con il pennarello o cerotto.			
	Lubrifica la porzione terminale del sondino per 10-15 cm (con lubrificante e garza)			
	Sostiene la nuca dell'assistito e lo invita ad estendere la testa all'indietro dandogli in mano il bicchiere d'acqua, inserisce delicatamente la sonda nella narice prescelta facendola avanzare verso il naso-faringe posteriore.			
	Raggiunto l'oro-faringe, invita l'assistito a flettere la testa in avanti, lo incoraggia a bere lentamente (se non disfagico) facendo avanzare la sonda, mentre deglutisce, fino alla misura determinata in precedenza (la comparsa di tosse, cianosi e dispnea sono segni di inserimento accidentale nelle vie aeree, ritrarre il sondino). Fissa la sonda			
	Raccorda la siringa alla sonda ed estrarre una piccola quantità di liquido gastrico, da mettere sulla striscia reattiva per fare il test del pH. Controlla le secrezioni aspirate (colore, aspetto)			
	Collega il sondino alla sacca di raccolta oppure lo chiude con l'apposito tappo			
	Posiziona l'eventuale sacca di raccolta			

Università degli Studi di Trieste
CORSO DI LAUREA IN INFERNIERISTICA

FASE FINALE	Accerta che l'assistito assuma una posizione comoda ed appropriata			
	Smaltisce i materiali come da normativa vigente			
	Esegue il lavaggio delle mani			
	Registra la procedura eseguita, annotando: - la data e l'ora del posizionamento - dimensioni ed il materiale della sonda utilizzata - lunghezza della porzione esterna del SNG -qualità e quantità del contenuto gastrico			
	- Controlla l'assistito per rilevare la comparsa di eventuali eventi avversi. -Informa l'équipe di aver svolto la procedura			