Corso di Laurea Triennale in Matematica

Geometria 3
Topologia

Docente: Prof. Daniele Zuddas

Indice

Lezione 1: Spazi topologici	1
Lezione 2: Spazi topologici	4
Lezione 3: Sottospazi topologici e spazi metrici	7
Lezione 4: Applicazioni continue	10
Lezione 5: Spazi vettoriali normati	14
Lezione 6: Operazioni topologiche	17
Lezione 7: Spazio quoziente	23
Lezione 8: Assiomi di separazione T_1 e T_2	25
Lezione 9: Assiomi di separazione T_3 e T_4	27
Lezione 10: Assiomi di numerabilità	29
Lezione 11: Spazi compatti	32
Lezione 12: Proprietà degli spazi compatti	34
Lezione 13: Prodotti topologici arbitrari	37
Lezione 14: Incollamenti topologici	40
Lezione 15: Proiezione stereografica	44
Lezione 16: Spazi proiettivi	47
Lezione 17: Spazi connessi per archi	50
Lezione 18: Componenti connesse degli aperti di $\mathbb{R}^n$	53
Lezione 19: Rivestimenti	56
Lezione 20: Teoremi di sollevamento	58
Lezione 21: Gruppo fondamentale	60
Lezione 22: Gruppo fondamentale	62
Lezione 23: Teoremi di non retrazione e di Brouwer	65
Lezione 24: Teorema di Borsuk-Ulam	69

Lezione 1
Spazi topologici

Def. Dato un insieme X si chiama *insieme delle parti* (o *insieme potenza*) di X l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X

$$\mathcal{P}(X) = \{U \mid U \subset X\}.$$

Oss. $\mathcal{P}(X) \cong \{0,1\}^X = \{\text{funzioni } X \to \{0,1\}\} \Rightarrow |\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$.

Leggi di De Morgan.
$$X - \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha = \bigcap_{\alpha\in A}(X - U_\alpha)$$
$$X - \bigcap_{\alpha\in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha\in A}(X - U_\alpha).$$

Def. Una *topologia* su X è una famiglia $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ di sottoinsiemi di X che soddisfa:

1) $\emptyset \in \mathcal{T}$

2) $X \in \mathcal{T}$

3) $\forall \{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \subset \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$

4) $\forall U, V \in \mathcal{T} \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{T}$.

La coppia $(X, \mathcal{T})$ è detta *spazio topologico*. Gli elementi di X sono detti *punti*. Scriviamo semplicemente X se $\mathcal{T}$ è sottinteso.

Def. $(X, \mathcal{T})$ spazio topologico.

- $U \subset X$ *aperto* in $X \Leftrightarrow U \in \mathcal{T}$.
- $C \subset X$ *chiuso* in $X \Leftrightarrow X - C$ aperto $\Leftrightarrow X - C \in \mathcal{T}$.

Oss. Per una topologia $\mathcal{T}$ su X abbiamo:

1) $\emptyset$ aperto e chiuso in X

2) X aperto e chiuso in X

3) unioni arbitrarie di aperti di X sono aperte in X

4) intersezioni finite di aperti di X sono aperte in X (per induzione):
$\forall n \in \mathbb{N}, \forall U_1 \ldots, U_n \in \mathcal{T} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{n} U_i \in \mathcal{T}$.

(3′) intersezioni arbitrarie di chiusi sono chiuse:
$\forall \{C_\alpha\}_{\alpha\in A}$ famiglia di chiusi in $X \Rightarrow \bigcap_{\alpha\in A} C_\alpha$ chiuso in X

(4′) unioni finite di chiusi sono chiuse:
$\forall n \in \mathbb{N}, \forall C_1 \ldots, C_n$ chiusi in $X \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{n} C_i$ chiuso in X.

Oss. Per determinare $\mathcal{T}$ è sufficiente dichiarare gli aperti (oppure i chiusi) in modo che siano soddisfatte le proprietà precedenti.

Esempio. I seguenti esempi sono basilari e verranno usati spesso.

1) Topologia banale su X: $\mathcal{T}_{\text{ban}} = \{\emptyset, X\} \rightsquigarrow X_{\text{ban}} = (X, \mathcal{T}_{\text{ban}})$.
È la topologia minimale, gli unici aperti sono il vuoto e lo spazio.
2) Topologia discreta su X: $\mathcal{T}_{\text{dis}} = \mathcal{P}(X) \rightsquigarrow X_{\text{dis}} = (X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$.
È la topologia massimale, tutti i sottoinsiemi sono aperti e chiusi.
3) Topologia cofinita su X: $\mathcal{T}_{\text{cof}} = \{U \subset X \mid X - U \text{ finito}\} \cup \{\emptyset\} \rightsquigarrow X_{\text{cof}} = (X, \mathcal{T}_{\text{cof}})$.
Gli aperti sono i complementari dei sottoinsiemi finiti e il vuoto.
I chiusi sono i sottoinsiemi finiti e X.

Oss.

1) X discreto $\Leftrightarrow$ i singoletti dei punti sono aperti.
2) $\mathcal{T}_{\text{dis}} = \mathcal{T}_{\text{cof}} \Leftrightarrow X$ finito.

Basi di topologie

Def. Una famiglia $\mathcal{B}$ di aperti di uno spazio topologico X è detta *base* per X se $\forall\, U \subset X$ aperto, $\exists\, \{B_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{B}$ t.c. $U = \bigcup_{i\in I} B_i$. Gli elementi di $\mathcal{B}$ sono detti *aperti basici*.

In altre parole $\mathcal{B}$ è base per $X \Leftrightarrow$ gli elementi di $\mathcal{B}$ sono aperti e ogni aperto di X è unione di elementi di $\mathcal{B}$.

Oss. Sia $\mathcal{B}$ base per X. $U \subset X$ aperto $\Leftrightarrow \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B \subset U$.

Esempio. La famiglia dei singoletti $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$ è base per la topologia discreta.

Teor. *Sia X un insieme e $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ una famiglia di sottoinsiemi di X. Allora $\exists\, \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ topologia su X t.c. $\mathcal{B}$ è base per $\mathcal{T}_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow$*

1) $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$
2) $\forall\, B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \forall\, x \in B_1 \cap B_2 \Rightarrow \exists\, B \in \mathcal{B}$ *t.c.* $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.



Inoltre $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ è unica (topologia generata da $\mathcal{B}$).

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ Segue subito dalla definizione e osservazione precedente.
$\boxed{\Leftarrow}$ Definiamo

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{B\in J} B \mid J \subset \mathcal{B} \right\}$$

l'insieme di tutte e sole le unioni di elementi di $\mathcal{B}$.

Oss. $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}} \Leftrightarrow \forall x \in U,\ \exists\, B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B \subset U$.

Mostriamo che $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ è una topologia su X.

1) $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, ottenuto con $J = \emptyset$

2) $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, ottenuto con $J = \mathcal{B}$ in virtù di (*1*)

3) $\forall\, \{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}} \Rightarrow \forall \alpha \in A,\ \exists\, J_\alpha \subset \mathcal{B}$ t.c.

$$U_\alpha = \bigcup_{B\in J_\alpha} B \ \Rightarrow\ \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha = \bigcup_{B\in J} B \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}} \ \text{ con } \ J = \bigcup_{\alpha\in A} J_\alpha \subset \mathcal{B}$$

4) $\forall\, U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}},\ \forall\, x \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow \exists\, B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B_1 \subset U_1$ e $x \in B_2 \subset U_2 \Rightarrow x \in B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2 \underset{(2)}{\Rightarrow} \exists B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B \subset B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2 \Rightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

$\forall\, B \in \mathcal{B} \Rightarrow B \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ ottenuto con $J = \{B\} \Rightarrow \mathcal{B}$ è base per $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

L'unicità segue subito dalle due osservazioni precedenti. □

Topologie notevoli su $\mathbb{R}$

Topologia Euclidea su $\mathbb{R}$. $\mathcal{B} = \{]a, b[\mid a < b\}$ è base per una topologia su $\mathbb{R}$. Infatti

1) l'unione di tutti gli intervalli aperti limitati è $\mathbb{R}$

2) l'intersezione di due intervalli aperti limitati è vuota oppure un intervallo aperto limitato ($\in \mathcal{B}$).

Si ha: $U \subset \mathbb{R}$ aperto $\Leftrightarrow \forall\, x \in U\ \exists\, a < b$ t.c. $x \in]a, b[\subset U$.

$]a, +\infty[= \bigcup_{b>a}]a, b[$, $]-\infty, b[$ aperti.

$\{a\}$, $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $]-\infty, b]$ chiusi (ma esistono molti altri chiusi).

$[a, b[$ e $]a, b]$ non sono né aperti né chiusi in $\mathbb{R}$, $\forall a < b$.

Retta di Sorgenfrey. $\mathcal{B}_\ell = \{[a, b[\mid a < b\}$ è base per una topologia su $\mathbb{R}$ detta *topologia di Sorgenfrey* o *topologia degli intervalli aperti a destra*. Denotiamo con $\mathbb{R}_\ell$ questo spazio topologico (*retta di Sorgenfrey*).

Oss. $]a, b[= \bigcup_{c\in]a,b[} [c, b[$ aperto in $\mathbb{R}_\ell \Rightarrow$ aperti Euclidei sono aperti in $\mathbb{R}_\ell$ (ma non viceversa). I chiusi Euclidei di $\mathbb{R}$ sono chiusi in $\mathbb{R}_\ell$.

$[a, +\infty[= \bigcup_{c>a} [a, c[$ aperto in $\mathbb{R}_\ell$.

$[a, b]$ chiuso in $\mathbb{R}_\ell$ (perché chiuso in $\mathbb{R}$).

$[a, b[= \mathbb{R}_\ell - \big(]-\infty, a[\cup [b, +\infty[\big) \Rightarrow [a, b[$ chiuso (e aperto) in $\mathbb{R}_\ell$.

Lezione 2

Intorni e basi di intorni

Def. X spazio topologico, $J \subset X$ è *intorno* di $x \in X$ se $\exists\, U \subset X$ aperto t.c. $x \in U \subset J$.

Oss.

1) $\emptyset \neq U \subset X \Rightarrow U$ intorno di ogni suo punto (*intorno aperto*).

2) $U \subset X$ aperto $\Leftrightarrow \forall x \in U$, $\exists J \subset X$ intorno di x in X t.c. $J \subset U$.

Esempio. $[-1,1] \subset \mathbb{R}$ intorno di ogni $x \in]-1,1[$ ma non di ± 1.
Infatti $1 \in]a,b[\subset [-1,1]$ è impossibile.

Def. X spazio topologico, $\mathcal{J}$ famiglia di intorni di $x \in X$ è *base* (o *sistema fondamentale*) *di intorni* di x se $\forall L \subset X$ intorno di x, $\exists J \in \mathcal{J}$ t.c. $J \subset L$.

Oss. Nella definizione possiamo limitarci a L intorno aperto di x.

Esempio. $x \in \mathbb{R} \rightsquigarrow \mathcal{J}_x = \left\{\left]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right[\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ base d'intorni di x.

Def. $J \subset X$ è *intorno* di $A \subset X$ se $\exists U \subset X$ aperto t.c. $A \subset U \subset J$.

Def. $\mathcal{J}$ famiglia di intorni di $A \subset X$ è *base* (o *sistema fondamentale*) *di intorni* di A se $\forall L \subset X$ intorno di A, $\exists J \in \mathcal{J}$ t.c. $J \subset L$.

Sottospazi topologici

Teor. *Sia X uno spazio topologico e $Y \subset X$ un sottoinsieme. Allora la famiglia*

$$\mathcal{T}_Y \stackrel{\text{def}}{=} \{U \cap Y \mid U \subset X \text{ aperto}\}$$

è una topologia su Y detta topologia indotta da X o topologia relativa o anche topologia di sottospazio.

Dim. Dimostriamo che valgono le proprietà della definizione di topologia.

1) $\emptyset = \emptyset \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.

2) $Y = X \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.

3) $\forall \{V_\alpha\}_{\alpha\in A} \subset \mathcal{T}_Y$ $\exists \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ aperti di X t.c. $V_\alpha = U_\alpha \cap Y$ $\forall\, \alpha \in A \Rightarrow$

$$\bigcup_{\alpha\in A} V_\alpha = \bigcup_{\alpha\in A} (U_\alpha \cap Y) = \left(\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha\right) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

4) $\forall\, V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y$ $\exists\, U_1, U_2$ aperti in X t.c. $V_1 = U_1 \cap Y$ e $V_2 = U_2 \cap Y \Rightarrow$
$V_1 \cap V_2 = (U_1 \cap U_2) \cap Y \in \mathcal{T}_Y$. □

Def. $Y \subset X$ con la topologia relativa è detto *sottospazio topologico*.

Oss.

1) Qualunque sottoinsieme di uno spazio topologico è un sottospazio topologico con la topologia relativa.

2) Un sottospazio topologico $Y \subset X$ è a sua volta uno spazio topologico.

3) $V \subset Y$ aperto in $Y \Leftrightarrow \exists\, U \subset X$ aperto in X t.c. $V = U \cap Y$.

4) $C \subset Y$ chiuso in $Y \Leftrightarrow \exists\, A \subset X$ chiuso in X t.c. $C = A \cap Y$.

5) I sottoinsiemi di uno spazio topologico saranno sempre considerati con la topologia relativa, se non specificato diversamente.

Esempi. $I := [0,1] \subset \mathbb{R}$ è un importante sottospazio topologico e lo consideriamo con la topologia Euclidea indotta da $\mathbb{R}$.
$\mathbb{R}_+ := [0, +\infty[\subset \mathbb{R}$ è un altro esempio interessante.

Prop. *$Y \subset X$ sottospazio topologico e $\mathcal{B}$ base per $X \Rightarrow$*

$$\mathcal{B}_Y \stackrel{\text{def}}{=} \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$$

base per Y.

Dim. Esercizio (usare le definizioni di topologia relativa e di base).

Prop. *$Y \subset X$ sottospazio, $y \in Y$ e $\mathcal{J}_y$ base di intorni di y in $X \Rightarrow$*

$$\mathcal{J}_{Y,y} \stackrel{\text{def}}{=} \{J \cap Y \mid J \in \mathcal{J}_y\}$$

base di intorni di y in Y.

Dim. Esercizio (usare le definizioni).

Operatori topologici

X spazio topologico, $A \subset X$ sottospazio topologico di X.

Def (Interno)**.** Si chiama *interno* di A in X il sottospazio

$$\mathrm{Int}_X A \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{\substack{U \subset A \\ U \text{ aperto}}} U$$

unione di tutti gli aperti di X contenuti in A.

Oss.

1) $\mathrm{Int}_X A$ è il più grande aperto di X contenuto in A.

2) $\mathrm{Int}_X A \subset A$ e si ha $\mathrm{Int}_X A = A \Leftrightarrow A$ aperto in X.

3) $U \subset A$ e U aperto in $X \Rightarrow U \subset \mathrm{Int}_X A$.

4) $x \in \mathrm{Int}_X A \Leftrightarrow \exists U \subset X$ intorno di x t.c. $U \subset A \Leftrightarrow A$ intorno di x.

Esempio. $\mathrm{Int}_{\mathbb{R}}[0,1[=]0,1[$, $\mathrm{Int}_{[0,1]}[0,1[= [0,1[$, $\mathrm{Int}_{\mathbb{R}}\{0\} = \emptyset$
$\mathrm{Int}_{\mathbb{R}_\ell}[0,1] = [0,1[$

Def (Esterno)**.** Si chiama *esterno* di A in X il sottospazio

$$\mathrm{Ext}_X A \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{Int}_X(X - A).$$

Def (Chiusura)**.** Si chiama *chiusura* di A in X il sottospazio

$$\mathrm{Cl}_X A \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{\substack{C \supset A \\ C \text{ chiuso}}} C$$

intersezione di tutti i chiusi di X che contengono A.

Oss. $\mathrm{Cl}_X A$ è il più piccolo chiuso di X che contiene A.
$A \subset \mathrm{Cl}_X A$ e vale $= \Leftrightarrow A$ chiuso in X.
$A \subset C$ e C chiuso in $X \Rightarrow \mathrm{Cl}_X A \subset C$.

Prop. *$x \in \mathrm{Cl}_X A \Leftrightarrow \forall\, U \subset X$ intorno (aperto) di x in X si ha $U \cap A \neq \emptyset$.*

Dim. Senza perdita di generalità basta considerare U intorno aperto di x.
$\boxed{\Rightarrow}$ Per assurdo, supponiamo $U \cap A = \emptyset \Rightarrow A \subset X - U$ chiuso $\Rightarrow$ $\mathrm{Cl}_X A \subset X - U \Rightarrow x \in X - U$ assurdo perché $x \in U$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Per assurdo, supponiamo $x \notin \mathrm{Cl}_X A \Rightarrow x \in U := X - \mathrm{Cl}_X A$ aperto $\Rightarrow U \cap A \subset U \cap \mathrm{Cl}_X A = \emptyset \Rightarrow U \cap A = \emptyset$ assurdo. □

Def (Frontiera)**.** Si chiama *frontiera* (o *bordo*) di A in X il sottoinsieme

$$\mathrm{Fr}_X A \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{Cl}_X A \cap \mathrm{Cl}_X(X - A)$$

intersezione delle chiusure di A e del complementare.

Si usa anche la notazione $\mathrm{Fr}_X A = \partial_X A = \partial A$.

Oss. $\mathrm{Fr}_X A$ è chiuso in X e $\mathrm{Fr}_X A \subset \mathrm{Cl}_X A$.
$x \in \mathrm{Fr}_X A \Leftrightarrow \forall\, U \subset X$ intorno di x in X, si ha $U \cap A \neq \emptyset$ e $U \cap (X - A) \neq \emptyset$.

Teor. *Valgono le seguenti uguaglianze:*
(1) $\mathrm{Cl}_X A = X - \mathrm{Ext}_X A$
(2) $\mathrm{Fr}_X A = \mathrm{Cl}_X A - \mathrm{Int}_X A$.

Dim. *(1)* $X - \mathrm{Ext}_X A$ chiuso e $A \subset X - \mathrm{Ext}_X A \Rightarrow \mathrm{Cl}_X A \subset X - \mathrm{Ext}_X A$.
$X - \mathrm{Cl}_X A$ aperto e $X - \mathrm{Cl}_X A \subset X - A \Rightarrow X - \mathrm{Cl}_X A \subset \mathrm{Ext}_X A \Rightarrow$ $\mathrm{Cl}_X A \supset X - \mathrm{Ext}_X A$.

(2) $\mathrm{Fr}_X A = \mathrm{Cl}_X A \cap \mathrm{Cl}_X(X - A) = \mathrm{Cl}_X A \cap (X - \mathrm{Ext}_X(X - A)) =$ $\mathrm{Cl}_X A \cap (X - \mathrm{Int}_X A) = \mathrm{Cl}_X A - \mathrm{Int}_X A$. □

Lezione 3

Spazi metrici

Def. Sia X un insieme non vuoto. Una funzione $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ è detta *metrica* o *distanza* su X se valgono le seguenti proprietà $\forall\, x, y, z \in X$:

1) $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2) $d(x,y) = d(y,x)$

3) $d(x,y) \leqslant d(x,z) + d(z,y)$ (*disuguaglianza triangolare*).

Oss. $d \geqslant 0$ infatti $\forall\, x, y \in X$ si ha

$$0 = d(x,x) \leqslant d(x,y) + d(y,x) = 2d(x,y).$$

Def. Uno *spazio metrico* (X,d) è un insieme non vuoto X munito di una metrica d su X.

Esempio. Per ogni insieme non vuoto X consideriamo la *metrica discreta*

$$d_{\text{dis}} : X \times X \to \mathbb{R}$$

$$d_{\text{dis}}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases}$$

(X, d_{dis}) è detto *spazio metrico discreto*.

Esempio. *Metrica Euclidea* su $\mathbb{R}$: $d(x,y) = |x-y|$, $\forall\, x, y \in \mathbb{R}$.

Def. (X,d) spazio metrico, $x \in X$, $r > 0$. Il sottoinsieme

$$B_d(x,r) := \{y \in X \mid d(x,y) < r\} \subset X$$

è detto *boccia aperta di centro x e raggio r*.

$$\bar{B}_d(x,r) := \{y \in X \mid d(x,y) \leqslant r\} \subset X$$

è detto *boccia chiusa di centro x e raggio r*.

Oss. $x \in B_d(x,r) \subset \bar{B}_d(x,r)$.

Teor. (X,d) *spazio metrico* $\Rightarrow$

$$\mathcal{B}_d := \{B_d(x,r) \mid x \in X, r > 0\}$$

base per una topologia $\mathcal{T}_d$ su X (topologia indotta da d o top. metrica).

Dim. Oss. precedente $\Rightarrow \bigcup_{x,r} B(x,r) = X$ (proprietà (*1*) delle basi).

$$\forall\, x_1, x_2 \in X\ \forall\, r_1, r_2 > 0\ \forall\, y \in B(x_1,r_1) \cap B(x_2,r_2) \rightsquigarrow$$

$$r := \min(r_1 - d(x_1,y), r_2 - d(x_2,y)) > 0$$

$\forall\, z \in B(y,r) \Rightarrow d(x_1,z) \leqslant d(x_1,y) + d(y,z) < d(x_1,y) + r \leqslant r_1 \Rightarrow$ $z \in B(x_1,r_1)$ e similmente $z \in B(x_2,r_2) \Rightarrow$

$y \in B(y,r) \subset B(x_1,r_1) \cap B(x_2,r_2)$ (proprietà (*2*) delle basi). $\square$

Oss. $U \in \mathcal{T}_d \Leftrightarrow \forall\, x \in U\ \exists\, r > 0$ t.c. $B_d(x,r) \subset U$.

Def. Uno spazio topologico $(X, \mathcal{T})$ è detto *spazio metrizzabile* se esiste una metrica d su X che induce la topologia di X, ossia $\mathcal{T} = \mathcal{T}_d$.

Esempio. Gli intervalli aperti limitati di $\mathbb{R}$ sono le bocce aperte rispetto alla metrica Euclidea $\Rightarrow \mathbb{R}$ metrizzabile.

Oss. X_{dis} metrizzabile perché $B_{d_{\text{dis}}}(x, 1) = \{x\}$, $\forall\, x \in X$.

Oss. X_{ban} non metrizzabile se $|X| \geqslant 2$.

Spazi Euclidei. Su $\mathbb{R}^n$ consideriamo la *metrica Euclidea*

$$d(x, y) = \|x - y\| = \left(\sum_{j=1}^{n} (x_j - y_j)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

per ogni $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Ricordiamo che la disuguaglianza triangolare consegue dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz per il prodotto scalare canonico di $\mathbb{R}^n$.

Def. La topologia su $\mathbb{R}^n$ indotta dalla metrica Euclidea si chiama *topologia Euclidea*.

Oss. Consideriamo sempre $\mathbb{R}^n$ con la topologia Euclidea, se non specificato diversamente.

In modo simile si definisce la topologia Euclidea su $\mathbb{C}^n$ come quella indotta dalla metrica Euclidea

$$d(x, y) = \|x - y\| = \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j - y_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

per ogni $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{C}^n$.

Prop. *Sia (X, d) spazio metrico e $Y \subset X$ sottospazio topologico. Allora la restrizione $d_Y = d|_{Y \times Y} : Y \times Y \to \mathbb{R}$ è una metrica su Y che induce la topologia di sottospazio.*

Dim. Che d_Y sia una metrica segue subito dal fatto che lo è d.

Che la topologia indotta su Y da d_Y sia la topologia di sottospazio segue subito dall'uguaglianza

$$B_{d_Y}(y, r) = B_d(y, r) \cap Y,$$

$\forall\, y \in Y$ e $\forall\, r > 0$, che è di immediata verifica. □

Cor. *X spazio metrizzabile e $Y \subset X$ sottospazio $\Rightarrow$ Y metrizzabile.*

Sottospazi notevoli di $\mathbb{R}^n$

$B^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leqslant 1\} \subset \mathbb{R}^n$ *disco* o *boccia* n*-dimensionale*.
$S^n := \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ *sfera* o *ipersfera* n*-dimensionale*.
$I := [0, 1] \subset \mathbb{R}$ *intervallo (chiuso)*.
$\mathbb{R}_+ := [0, +\infty[\subset \mathbb{R}$ *semiretta (chiusa)*.

Oss. $S^n \subset B^{n+1} \subset \mathbb{R}^{n+1}$.
$B^0 = \{0\}$.
$B^1 = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$.
B^2 è il disco chiuso unitario in $\mathbb{R}^2$.
B^3 è la boccia chiusa unitaria in $\mathbb{R}^3$.
$S^0 = \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$ è uno spazio discreto con due punti.
$S^1 \subset \mathbb{R}^2$ è la circonferenza unitaria.
$S^2 \subset \mathbb{R}^3$ è la sfera unitaria.

Oss. I, $\mathbb{R}_+$, S^n, B^n sono metrizzabili con la metrica Euclidea.

Lezione 4

Applicazioni continue

Def. Siano X e Y spazi topologici. Un'applicazione $f : X \to Y$ è *continua* se $\forall\, V \subset Y$ aperto in Y si ha $f^{-1}(V) \subset X$ aperto in X.

In altre parole $f : X \to Y$ è continua $\Leftrightarrow$ le preimmagini tramite f degli aperti sono aperti.

Oss. $f^{-1}(Y - V) = X - f^{-1}(V)$. Quindi $f : X \to Y$ continua $\Leftrightarrow$
$\forall\, C \subset Y$ chiuso in Y si ha $f^{-1}(C) \subset X$ chiuso in X.

Prop. *$f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ continue $\Rightarrow$ $g \circ f : X \to Z$ continua.*

Dim. Segue subito dal fatto che $(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))\ \forall\, V \subset Z$. $\square$

Oss. $c : X \to Y$ costante $\Rightarrow$ c continua.
$\mathrm{id}_X : X \to X$ continua per ogni spazio topologico X.
$Y \subset X$ sottospazio top. $\Rightarrow$ mappa d'inclusione $i_Y : Y \hookrightarrow X$ continua.
Restrizioni di applicazioni continue a sottospazi del dominio o del codominio sono continue.
$\forall\ f : X_{\mathrm{dis}} \to Y$ è continua.
$\forall\ f : X \to Y_{\mathrm{ban}}$ è continua.

Def. $f : X \to Y$ è *aperta* se $\forall\, U \subset X$ aperto in X si ha $f(U)$ aperto in Y.
$f : X \to Y$ è *chiusa* se $\forall\, C \subset X$ chiuso in X si ha $f(C)$ chiuso in Y.

$f : X \to Y$ aperta $\Leftrightarrow$ f manda aperti in aperti.
$f : X \to Y$ chiusa $\Leftrightarrow$ f manda chiusi in chiusi.

Oss. Una costante $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua e chiusa, ma non aperta.
$f : X \to Y$ aperta $\Rightarrow$ $f(X) \subset Y$ aperto.
$f : X \to Y$ chiusa $\Rightarrow$ $f(X) \subset Y$ chiuso.
$A \subset X$ aperto (risp. chiuso) $\Leftrightarrow$ inclusione $i_A : A \hookrightarrow X$ aperta (risp. chiusa).

Esempio. $\mathrm{id}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}_{\mathrm{dis}} \to \mathbb{R}$ continua e biiettiva ma l'inversa non è continua.

Def. Siano X e Y spazi topologici. Un'applicazione $f : X \to Y$ è detta *omeomorfismo* se valgono le seguenti:

1) f è biiettiva
2) f è continua
3) f^{-1} è continua.

Diciamo che X e Y sono *omeomorfi* se esiste un omeomorfismo $f : X \to Y$ e in tal caso scriviamo $X \cong Y$.

N.B. Gli omeomorfismi si chiamano anche applicazioni *bicontinue*.

Oss. $\mathrm{id}_X : X \to X$ omeomorfismo per ogni spazio X (stessa topologia).
$f : X \to Y$ omeomorfismo $\Rightarrow$ $f^{-1} : Y \to X$ omeomorfismo.
$f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ omeomorfismi $\Rightarrow$ $g \circ f : X \to Z$ omeomorfismo.
L'omeomorfismo è una *relazione d'equivalenza* tra spazi topologici.

Oss. Data $f : X \to Y$ biiettiva, si ha f^{-1} continua $\Leftrightarrow$ f aperta $\Leftrightarrow$ f chiusa (attenzione, serve biiettiva).
$f : X \to Y$ omeo $\Leftrightarrow$ f continua, biiettiva e aperta (o chiusa).

Cor. *Per ogni spazio X l'insieme*

$$\mathrm{Omeo}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : X \to X \mid f \text{ omeo}\}$$

è un gruppo rispetto a composizione, detto gruppo degli omeomorfismi.

N.B. In generale $\mathrm{Omeo}(X)$ è un gruppo molto grande e molto complicato, quasi mai abeliano (a parte alcuni casi banali).

Def. Una proprietà $\mathcal{P}$ è detta *proprietà topologica* se $\forall\, X, Y$ spazi topologici, X ha $\mathcal{P}$ e $Y \cong X \Rightarrow Y$ ha $\mathcal{P}$.

In altre parole $\mathcal{P}$ è una proprietà topologica se valendo per uno spazio X vale anche per tutti gli spazi omeomorfi a X, ovvero $\mathcal{P}$ è *invariante* a meno di omeomorfismi. Studieremo in seguito importanti proprietà topologiche.

La *Topologia* studia le proprietà topologiche degli spazi. Un problema fondamentale è capire se due spazi topologici X e Y sono omeomorfi.

Prop. *La metrizzabilità è una proprietà topologica.*

Dim. Diamo solo un'idea, lasciando i dettagli per Esercizio.

X metrizzabile e $Y \cong X \Rightarrow \exists\, d_X$ metrica su X che ne induce la topologia e $\exists\, f : Y \to X$ omeo $\rightsquigarrow$

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}$$
$$d_Y(y_1, y_2) = d_X(f(y_1), f(y_2))$$

metrica su Y che induce la topologia di Y. □

Def. Dati gli spazi X e Y definiamo l'insieme delle applicazioni continue

$$C(X, Y) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : X \to Y \mid f \text{ continua}\}.$$

Oss. $C(X, Y) \neq \emptyset$ (contiene almeno le costanti).
$\mathrm{Omeo}(X) \subset C(X, X)$.

Prop. *$f : X \to Y$ è continua $\Leftrightarrow$ $\forall\, x \in X$, $\forall\, V \subset Y$ intorno di $f(x) \in Y$, $\exists\, U \subset X$ intorno di x in X t.c. $f(U) \subset V$.*

Dim. Non è restrittivo limitarci a considerare solo intorni aperti.

$\boxed{\Rightarrow}$ $\forall\, V \subset Y$ intorno aperto di $f(x) \Rightarrow x \in U := f^{-1}(V) \subset X$ aperto.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, V \subset Y$ aperto, se $f^{-1}(V) = \emptyset$ allora è aperto.

Se $f^{-1}(V) \neq \emptyset$, $\forall\, x \in f^{-1}(V) \Rightarrow V$ intorno di $f(x)$ in $Y \Rightarrow \exists\, U \subset X$ intorno di x t.c. $f(U) \subset V \Rightarrow x \in U \subset f^{-1}(V) \Rightarrow f^{-1}(V)$ aperto in $X \Rightarrow$ f continua. □

Oss. Nella Prop. possiamo limitarci a considerare intorni U e V aperti e/o basici (se abbiamo preventivamente fissato basi di intorni in X e Y). La dimostrazione richiede solo piccole modifiche.

Continuità negli spazi metrici

Cor. *Siano* (X, d_X) *e* (Y, d_Y) *spazi metrici. Allora* $f : X \to Y$ *è continua* $\Leftrightarrow \forall\, x_0 \in X$, $\forall\, \varepsilon > 0$, $\exists\, \delta > 0$ *t.c.* $\forall\, x \in X$ *si abbia che*

$$d_X(x, x_0) < \delta \;\Rightarrow\; d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Dim. Segue subito dalla Prop. e dall'Oss. usando come intorni basici le bocce aperte $V = B_{d_Y}(f(x), \varepsilon)$ e $U = B_{d_X}(x_0, \delta)$. □

Oss. In generale δ dipende da x_0 e da ε.
La definizione di funzione continua generalizza quella studiata in Analisi. Le funzioni reali di variabili reali la cui continuità è nota dall'Analisi saranno considerate continue senza bisogno di dimostrazione.

Oss. Applicazioni affini reali $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $f(x) = Ax + b$ con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^m$, sono continue.
Idem per applicazioni affini complesse $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$.
Affinità reali $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $f(x) = Ax + b$ con $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^n$, sono omeomorfismi (l'inversa è anch'essa affinità quindi continua).
Idem per affinità complesse $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$.
In particolare, per $b = 0$, le applicazioni lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ sono continue e gli automorfismi lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ sono omeomorfismi (idem su $\mathbb{C}$).

Esempio. $\exp : \mathbb{R} \to]0, +\infty[$, $\exp(x) = e^x$ è continua e infatti è omeo con inversa $\log :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$, pure essa continua $\Rightarrow \mathbb{R} \cong]0, +\infty[$.
$g :]0, 1[\to]0, +\infty[$, $g(x) = \dfrac{x}{1-x}$ omeo con inversa $g^{-1}(y) = \dfrac{y}{1+y}$.

$$]0, 1[\cong]a, b[\cong]a, +\infty[\cong]-\infty, a[\cong \mathbb{R}.$$

$$[0, 1[\cong [a, b[\cong]a, b] \cong [0, +\infty[\cong [a, +\infty[\cong]-\infty, a].$$

$$[0, 1] \cong [a, b] \quad \text{ma} \quad [0, 1] \ncong \mathbb{R} \quad \text{(lo vedremo più avanti)}.$$

Chiusura e frontiera negli spazi metrici

Def. Dato (X, d) spazio metrico, $\forall x \in X$ e $\forall A, B \subset X$ non vuoti, definiamo la distanza tra x e A

$$d(x, A) := \inf\{d(x, a) \mid a \in A\} \geqslant 0$$

e la distanza tra A e B

$$d(A, B) := \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\} \geqslant 0.$$

Oss. $x \in A \not\Rightarrow d(x, A) = 0$.
$A \cap B \neq \emptyset \not\Rightarrow d(A, B) = 0$.
L'inf non è necessariamente un minimo.

Esempio. In $\mathbb{R}$ con la distanza Euclidea $d(0,]0, 1[) = 0$.

Prop. *(X, d) spazio metrico, $\emptyset \neq A \subset X \Rightarrow$*

$$d_A : X \to \mathbb{R}$$
$$d_A(x) = d(x, A)$$

funzione continua.

Oss. In altre parole la distanza da un sottoinsieme è continua.

Dim. $\forall x_0, x \in X$, $\forall a \in A$ per la disuguaglianza triangolare e passando all'inf si ha

$$d(x, a) \leqslant d(x, x_0) + d(x_0, a) \;\Rightarrow\; d_A(x) - d_A(x_0) \leqslant d(x, x_0)$$

da cui scambiando x con x_0 si deduce

$$|d_A(x) - d_A(x_0)| \leqslant d(x, x_0).$$

Si ottiene quindi la continuità ponendo $\delta = \varepsilon$. □

Oss. $f : X \to \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow$ i sottoinsiemi di X definiti da un'equazione continua $f(x) = \alpha$, o da una disequazione $f(x) \geqslant \alpha$ o $f(x) \leqslant \alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, sono chiusi in X in quanto preimmagini di chiusi.
Analogamente i sottoinsiemi di X definiti da $f(x) > \alpha$ o da $f(x) < \alpha$ o da $f(x) \neq \alpha$ sono aperti in X.

Prop. *Siano (X, d) uno spazio metrico e $\emptyset \neq A \subset X$. Allora*

$$\mathrm{Cl}_X A = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\}.$$

Dim. Poniamo $C = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\}$ e dimostriamo $\mathrm{Cl}_X A = C$.
$\boxed{\subset}$ C chiuso in X perché definito da un'equazione continua.
$A \subset C \Rightarrow \mathrm{Cl}_X A \subset C$.

$\boxed{\supset}$ $\forall x \in C$, $\forall r > 0$ $\exists a \in A$ t.c. $d(x, a) < r \Rightarrow B_d(x, r) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x \in \mathrm{Cl}_X A$. □

Cor. *$\forall x \in X$ si ha $x \in \mathrm{Cl}_X A \Leftrightarrow d(x, A) = 0$.*

Cor. *$\forall x \in X$ si ha $x \in \mathrm{Fr}_X A \Leftrightarrow d(x, A) = d(x, X - A) = 0$.*

Cor. *$A \subset X$ chiuso, $x \in X$ e $d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A$.*

N.B. $\emptyset \neq A, B \subset X$ chiusi e $d(A, B) = 0 \not\Rightarrow A \cap B \neq \emptyset$.

Lezione 5

Spazi vettoriali normati

Def. Sia V uno spazio vettoriale reale o complesso. Una funzione

$$\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$$

è detta *norma* su V se valgono le seguenti $\forall\, v, w \in V$, $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$:

1) $\|v\| = 0 \Rightarrow v = 0_V$
2) $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$
3) $\|v + w\| \leqslant \|v\| + \|w\|$ (disuguaglianza triangolare per la norma).

Uno *spazio vettoriale normato* $(V, \|\cdot\|)$ è uno spazio vettoriale reale o complesso V munito di una norma.

Oss. $\|0_V\| = \|0\, 0_V\| = 0\|0_V\| = 0$.
$0 = \|0_V\| = \|v - v\| \leqslant \|v\| + \|-v\| = 2\|v\|$, $\forall\, v \in V \Rightarrow \|\cdot\| \geqslant 0$.

Prop. *Sia V uno spazio vettoriale normato. Allora la funzione*

$$d : V \times V \to \mathbb{R}$$
$$d(v, w) = \|v - w\|$$

è una metrica su V. Pertanto V è anche uno spazio metrico e quindi uno spazio topologico.

Dim. Esercizio.

Oss. Si ha: $\big|\|v\| - \|w\|\big| \leqslant \|v - w\| \Rightarrow \|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ continua. Esercizio.

Def. Due metriche d_1 e d_2 su X sono *equivalenti* se $\exists\, C_1, C_2 > 0$ t.c.

$$C_1 d_1(x, y) \leqslant d_2(x, y) \leqslant C_2 d_1(x, y), \quad \forall\, x, y \in X.$$

Due norme $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ su V sono *equivalenti* se $\exists\, C_1, C_2 > 0$ t.c.

$$C_1\|v\|_1 \leqslant \|v\|_2 \leqslant C_2\|v\|_1, \quad \forall\, v \in V.$$

Oss. Sono due relazioni d'equivalenza.
Norme equivalenti su V inducono metriche equivalenti. Esercizio.

Prop. *Metriche equivalenti su un insieme X inducono la stessa topologia.*

Dim. $d_1, d_2 : X \times X \to \mathbb{R}$ metriche equivalenti $\rightsquigarrow C_1, C_2 > 0$ t.c.

$$C_1 d_1 \leqslant d_2 \leqslant C_2 d_1 \;\Rightarrow\; B_{d_1}(x, C_2^{-1} r) \subset B_{d_2}(x, r) \subset B_{d_1}(x, C_1^{-1} r). \qquad \square$$

Esempio. $\forall\, x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, definiamo:

$$\|x\|_1 := |x_1| + \cdots + |x_n|;$$
$$\|x\|_\infty := \max(|x_1|, \ldots, |x_n|).$$

Sono equivalenti tra loro e alla norma Euclidea $\|\cdot\|$:

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_1 \leqslant n\|x\|_\infty, \quad \|x\|_\infty \leqslant \|x\| \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_\infty.$$

Pertanto su $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ potremo usare indifferentemente una di queste norme per rappresentare la topologia Euclidea.

Esempio. Su $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ si considera anche la *p-norma* (o *norma ℓ^p*), $\forall\, p \geqslant 1$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Si ha subito la disuguaglianza

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty$$

da cui per il Teorema dei due carabinieri

$$\lim_{p \to +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty.$$



Sfere unitarie $\|x\|_p = 1$ in $\mathbb{R}^2$ per alcuni valori di $p \geqslant 1$.

Oss. $\| \cdot \|_p$ non soddisfa la disuguaglianza triangolare $\forall\, p \in]0, 1[$.



Enunciamo senza dimostrare il teorema seguente.

Teor. $\dim V < \infty \Rightarrow$ *tutte le norme su V sono tra loro equivalenti.*

N.B. $\dim V = \infty \Rightarrow$ esistono norme non equivalenti su V.

Lavoro di gruppo. (a) $B^2 \cong [-1, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$. (b) $\mathrm{Fr}_{\mathbb{R}^2} B^2 = S^1$.

Immersioni, immersioni locali e omeo locali

Def. Un'applicazione tra spazi topologici $f : X \to Y$ è detta

1) *immersione* se $f|_{f(X)} : X \to f(X)$ omeo, dove $f(X) \subset Y$ ha la top. di sottospazio. Scriviamo $f : X \hookrightarrow Y$ e diciamo X *si immerge* in Y.
2) *immersione locale* se $\forall\, x \in X$, $\exists\, U \subset X$ intorno di x t.c. $f|_U : U \to Y$ è un'immersione. Diciamo che X si *immerge localmente* in Y.
3) *omeomorfismo locale* se $\forall\, x \in X$, $\exists\, U \subset X$ intorno di x t.c. $f(U) \subset Y$ intorno di $f(x)$ e $f_{|U} : U \to f(U)$ omeo.

N.B. In inglese: immersione $=$ *embedding*; immersione loc. $=$ *immersion*.

Oss. $X \subset Y$ sottospazio topologico $\Leftrightarrow$ $i_X : X \hookrightarrow Y$ immersione.

Oss. $f : X \hookrightarrow Y$ immersione $\not\Leftarrow\Rightarrow$ f continua e iniettiva.
$X \hookrightarrow Y \Leftrightarrow X$ omeomorfo ad un sottospazio di Y e a meno di immersione possiamo considerare $X \subset Y$.
$f : X \to Y$ immersione loc. $\not\Leftarrow\Rightarrow$ f continua e loc. iniettiva
($\forall\, x \in X$, $\exists\, U \subset X$ intorno di x t.c. $f_{|U} : U \to Y$ iniettiva).
Immersione $\not\Leftarrow\Rightarrow$ immersione loc.
$f : X \to Y$ omeo loc. $\Leftrightarrow$ $f : X \to Y$ immersione loc. aperta.

Esempio. $\forall\, k < n$ consideriamo le *immersioni canoniche*

$$\mathbb{R}^k \hookrightarrow \mathbb{R}^n \qquad\qquad \mathbb{C}^k \hookrightarrow \mathbb{C}^n$$
$$x \mapsto (x, 0_{\mathbb{R}^{n-k}}) \qquad\qquad x \mapsto (x, 0_{\mathbb{C}^{n-k}}).$$

Abbiamo anche: $B^k \hookrightarrow B^n$, $S^k \hookrightarrow S^n$.
Possiamo considerare $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^k \subset \mathbb{C}^n$, $S^k \subset S^n$, $B^k \subset B^n$, $\forall\, k < n$.
Queste immersioni sono chiuse.

Lavoro di gruppo. $f : [0, 2\pi[\to S^1$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$ omeo?

Lezione 6

Unione topologica

Unione disgiunta di insiemi. L'*unione disgiunta* di due insiemi X e Y è

$$X \sqcup Y \stackrel{\text{def}}{=} (X \times \{1\}) \cup (Y \times \{2\}).$$

Più in generale l'*unione disgiunta* di una famiglia di insiemi $\{X_i\}_{i \in I}$ è

$$\bigsqcup_{i \in I} X_i \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i \in I} (X_i \times \{i\}).$$

Pertanto l'unione disgiunta di insiemi non necessariamente disgiunti è l'unione di loro copie disgiunte ottenute identificando X_i con $X_i \times \{i\}$ $\forall\, i \in I$. L'unione disgiunta di insiemi a due a due disgiunti si identifica con l'unione.

Unione topologica di spazi. L'*unione topologica* di due spazi X e Y è l'unione disgiunta $X \sqcup Y$ con la *topologia unione*

$$\mathcal{T}_{\sqcup} \stackrel{\text{def}}{=} \{U \sqcup V \mid U \subset X \text{ e } V \subset Y \text{ aperti}\}.$$

Oss. $W \subset X \sqcup Y$ aperto $\Leftrightarrow$ $W \cap X$ e $W \cap Y$ aperti.
X e Y sottospazi aperti e chiusi di $X \sqcup Y$.



Def. L'*unione topologica* di una famiglia di spazi $\{X_i\}_{i \in I}$ è l'unione disgiunta $\bigsqcup_{i \in I} X_i$ con la *topologia unione*

$$\mathcal{T}_{\sqcup} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \bigsqcup_{i \in I} U_i \mid U_i \subset X_i \text{ aperto } \forall\, i \in I \right\}.$$

Oss. Si verifica facilmente che questa è una topologia.

$W \subset \bigsqcup_{i \in I} X_i$ aperto $\Leftrightarrow$ $W \cap X_i$ aperto in X_i $\forall\, i \in I$.

$X_j \subset \bigsqcup_{i \in I} X_i$ sottospazio aperto e chiuso $\forall\, j \in I$.

Definiamo le *immersioni canoniche* $\forall\, j \in I$

$$i_j : X_j \hookrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i$$
$$i_j(x) = x, \quad \forall\, x \in X_j$$

Oss. i_j immersione aperta e chiusa $\forall\, j \in I$.
$i_j^{-1}(W) = W \cap X_j$, $\forall\, W \subset \bigsqcup_{i \in I} X_i$.

Teor. $f : \bigsqcup_{i\in I} X_i \to Y$ *continua* $\Leftrightarrow f_j := f \circ i_j : X_j \to Y$ *continua* $\forall\, j \in I$.

Def. $f_j = f \circ i_j = f|_{X_j} : X_j \to Y$ è detta *j-esima restrizione* di f.

Oss. Si ha $f(x) = f_j(x)$, $\forall\, x \in X_j$, $\forall\, j \in I$.

Dim. Basta osservare che $f^{-1}(V) = \bigsqcup_{i\in I} f_i^{-1}(V)$, $\forall\, V \subset Y$ aperto. □

Prodotto topologico

Prodotti topologici finiti. Il *prodotto topologico* di due spazi X e Y è il prodotto cartesiano $X \times Y$ con la *topologia prodotto* avente come base

$$\mathcal{B}_\times \overset{\text{def}}{=} \{U \times V \mid U \subset X \text{ e } V \subset Y \text{ aperti}\}.$$

Gli aperti di $X \times Y$ sono unioni di prodotti di aperti, e in generale sono più complicati dei prodotti di aperti.



In generale, il *prodotto topologico* di $X_1, \ldots, X_n$ è il prodotto cartesiano

$$X = X_1 \times \cdots \times X_n$$

con la *topologia prodotto* avente per base la famiglia dei prodotti di aperti

$$\mathcal{B}_\times \overset{\text{def}}{=} \{U_1 \times \cdots \times U_n \mid U_i \subset X_i \text{ aperto } \forall\, i = 1, \ldots, n\}.$$

Verifichiamo che $\mathcal{B}_\times$ è base per una topologia su $X_1 \times \cdots \times X_n$.

(1) $X_1 \times \cdots \times X_n \in \mathcal{B}_\times$. $\forall\, U_1 \times \cdots \times U_n,\ V_1 \times \cdots \times V_n \in \mathcal{B}_\times$ si ha

(2) $(U_1 \times \cdots \times U_n) \cap (V_1 \times \cdots \times V_n) = (U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_n \cap V_n) \in \mathcal{B}_\times$.

Proiezioni canoniche. Definiamo le *proiezioni canoniche* $\forall\, j = 1, \ldots, n$

$$\pi_j : X_1 \times \cdots \times X_n \to X_j$$
$$\pi_j(x_1, \ldots, x_n) = x_j$$

Oss. π_j continua, suriettiva e aperta $\forall\, j = 1, \ldots, n$, infatti si ha:
$\pi_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times U_j \times \cdots \times X_n$, $\pi_j(U_1 \times \cdots \times U_n) = U_j$, $\forall\, U_j \subset X_j$.

Teor. $f : Y \to X_1 \times \cdots \times X_n$ *continua* $\Leftrightarrow f_j := \pi_j \circ f : Y \to X_j$ *continua* $\forall\, j = 1, \ldots, n$.

Def. $f_j = \pi_j \circ f : Y \to X_j$ è detta *j-esima componente* di f.

Oss. Si ha $f(y) = (f_1(y), \ldots, f_n(y))$ e scriviamo $f = (f_1, \ldots, f_n)$.

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ f_j è composizione di applicazioni continue quindi è continua.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, U_1 \times \cdots \times U_n \subset X_1 \times \cdots \times X_n$ prodotto di aperti (aperto basico) $\Rightarrow$

$$f^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_n) = f_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap f_n^{-1}(U_n).$$ □

Oss. $A_j \subset X_j$ chiuso $\forall\, j = 1, \ldots, n \Rightarrow A_1 \times \cdots \times A_n$ chiuso. Infatti:

$$(X_1 \times \cdots \times X_n) - (A_1 \times \cdots \times A_n) = \bigcup_{j=1}^{n} (X_1 \times \cdots \times (X_j - A_j) \times \cdots \times X_n).$$

Immersioni canoniche. $\forall\, j = 1, \ldots, n$ scegliamo un punto $a_j \in X_j \rightsquigarrow$

$$i_j : X_j \hookrightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$$
$$i_j(x_j) = (a_1, \ldots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \ldots, a_n)$$



Oss. $i_j(X_j) = \{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times X_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_n\}$.

Prop. *i_j è un'immersione $\forall\, j = 1, \dots, n$.*

Dim. $\pi_j \circ i_j = \mathrm{id}_{X_j}$ e $\pi_i \circ i_j = a_i = \text{cost}$ per $i \neq j \Rightarrow i_j$ continua e iniettiva.
$i_j(U_j) = (X_1 \times \cdots \times U_j \times \cdots \times X_n) \cap i_j(X_j) \Rightarrow i_j| : X_j \to i_j(X_j)$ aperta. □

Oss. $\mathcal{B}_i$ base per X_i, $\forall\, i = 1, \dots, n \Rightarrow$

$$\mathcal{B} = \{B_1 \times \cdots \times B_n \mid B_i \in \mathcal{B}_i, \forall\, i = 1, \dots, n\}$$

base per $X_1 \times \cdots \times X_n$.

Teor. *$X_1 \dots, X_n$ metrizzabili $\Rightarrow$ $X_1 \times \cdots \times X_n$ metrizzabile.*

Dim. $d_1, \dots, d_n$ distanze su $X_1 \dots, X_n$ risp. $\rightsquigarrow$

$$d : (X_1 \times \cdots \times X_n) \times (X_1 \times \cdots \times X_n) \to \mathbb{R} \quad \textit{(distanza prodotto)}$$
$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max(d_1(x_1, y_1), \dots, d_n(x_n, y_n)).$$
$$B_d((x_1, \dots, x_n), r) = B_{d_1}(x_1, r) \times \cdots \times B_{d_n}(x_n, r)$$

e la tesi segue dall'osservazione che i prodotti di bocce aperte dello stesso raggio sono base per $X_1 \times \cdots \times X_n$. □

Cor. $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$ *e* $\mathbb{C}^n = \underbrace{\mathbb{C} \times \cdots \times \mathbb{C}}_{n \text{ volte}}$ *sono prodotti topologici.*

Dim. Top. prodotto = top. Euclidea perché entrambe indotte da $\|\cdot\|_\infty$. □

Oss. $f : Y \to \mathbb{R}^n$ è continua $\Leftrightarrow$ tutte le componenti sono continue.

Def. $T^n \overset{\text{def}}{=} \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n \text{ volte}}$ è detto *n-toro* o *toro n-dimensionale*.

$I^n \overset{\text{def}}{=} \underbrace{I \times \cdots \times I}_{n \text{ volte}}$ è detto *ipercubo* o *cubo n-dimensionale*.

$T^1 = S^1$, $T^2 = S^1 \times S^1$, $T^3 = S^1 \times S^1 \times S^1$.
$I^1 = I = [0, 1]$ (intervallo), $I^2 = I \times I$ (quadrato), $I^3 = I \times I \times I$ (cubo).

Oss. $I^n \cong B^n \Rightarrow B^m \times B^n \cong B^{m+n}$, $\forall\, m, n \geqslant 0$.

N.B. $S^m \times S^n \ncong S^{m+n}$ (lo dimostreremo più avanti per $m \leqslant 1$).

Prodotti topologici arbitrari

Prodotti arbitrari di insiemi. Dati gli insiemi $X_1, \dots, X_n$, una n-upla

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in X_1 \times \cdots \times X_n$$

è essenzialmente una funzione

$$\begin{aligned} x : \{1, \dots, n\} &\to X_1 \cup \cdots \cup X_n \\ \text{t.c.} \quad x(i) &= x_i \in X_i, \quad \forall\, i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

e quindi il prodotto cartesiano è l'insieme di tutte le funzioni di questo tipo. Questa considerazione ci permette di generalizzare il prodotto cartesiano.

Def. Data una famiglia $\{X_i\}_{i\in I}$ di insiemi, il *prodotto cartesiano* è l'insieme

$$\prod_{i\in I} X_i \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ x : I \to \bigcup_{i\in I} X_i \;\middle|\; x(i) \in X_i, \forall\, i \in I \right\}.$$

$\forall\, x \in \prod_{i\in I} X_i$, $\forall\, i \in I \rightsquigarrow x_i := x(i)$ (i-*esima componente di* x).
Scriviamo anche $x = (x_i)_{i\in I}$.

Oss.

$\prod_{n\in\mathbb{N}} X_n$ è l'insieme delle *successioni* $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ t.c. $x_n \in X_n$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

$\prod_{n\in\mathbb{N}} X = X^{\mathbb{N}}$ è l'insieme delle successioni a valori in X.

$\prod_{i\in I} X = X^I$ è l'insieme delle funzioni $x : I \to X$.

Assioma della scelta. $X_i \neq \emptyset\ \forall\, i \in I \Rightarrow \prod_{i\in I} X_i \neq \emptyset$.

Oss. L'assioma dice che $\forall$ insieme I e $\forall$ famiglia di insiemi non vuoti $\{X_i\}_{i\in I}$ $\exists\, s : I \to \bigcup_{i\in I} X_i$ t.c. $s(i) \in X_i\ \forall\, i \in I$ (*funzione di scelta*).

Prodotti topologici arbitrari. Il *prodotto topologico* di una famiglia di spazi $\{X_i\}_{i\in I}$ è il prodotto cartesiano $X = \prod_{i\in I} X_i$ con la *topologia prodotto* avente per base la famiglia di tutti i prodotti $U = \prod_{i\in I} U_i$ t.c.

$U_i \subset X_i$ aperto $\forall\, i \in I$ e $\#\{i \in I \mid U_i \subsetneq X_i\} < \infty$

N.B. Se $\# I = \infty$, la base della topologia prodotto non è formata da tutti i prodotti di aperti ma solo dai prodotti di aperti quasi tutti banali, cioè $U_i = X_i$ per ogni $i \in I$ tranne che per al più un numero finito.

N.B. La famiglia di *tutti* i prodotti di aperti è base per la *topologia box* che non studieremo. La topologia box è diversa dalla topologia prodotto nel caso di prodotti infiniti. Le due topologie coincidono per prodotti finiti.

Esempio. In $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{R}$ gli aperti basici sono i prodotti del tipo $U = \prod_{n\in\mathbb{N}} U_n$ con $U_n \subset \mathbb{R}$ aperto $\forall\, n \in \mathbb{N}$ e $\exists N > 0$ t.c. $U_n = \mathbb{R}\ \forall\, n \geqslant N$.

Esempio. $[0,1]^{\mathbb{N}} = \prod_{n\in\mathbb{N}} [0,1]$ è detto *cubo di Hilbert.*

Proiezioni canoniche. Definiamo le *proiezioni canoniche* $\forall\, j \in I$

$$\pi_j : \prod_{i\in I} X_i \to X_j$$
$$\pi_j(x) = x_j$$

Oss. π_j continua, suriettiva e aperta.

Teor. $f : Y \to \prod_{i\in I} X_i$ *continua* $\Leftrightarrow$ $f_j := \pi_j \circ f : Y \to X_j$ *continua* $\forall\, j \in I$.

Def. $f_j = \pi_j \circ f : Y \to X_j$ è detta *j-esima componente* di f.

Oss. Si ha $f(y) = (f_i(y))_{i\in I}$ e scriviamo $f = (f_i)_{i\in I}$.

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ f_j è composizione di applicazioni continue quindi è continua.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall \prod_{i\in I} U_i \subset \prod_{i\in I} X_i$ aperto basico $\Rightarrow \exists\, n \in \mathbb{N}$ e $\exists\, \{i_1, \ldots, i_n\} \subset I$ t.c.

$$U_i = X_i,\ \forall\, i \in I - \{i_1, \ldots, i_n\}$$
$$f^{-1}\left(\prod_{i\in I} U_i\right) = \bigcap_{i\in I} f_i^{-1}(U_i) = \bigcap_{j=1}^{n} f_{i_j}^{-1}(U_{i_j}). \qquad \square$$

Lezione 7

Spazio quoziente

$\sim$ Relazione d'equivalenza su un insieme X. $\forall\, x, y, z \in X$:

$x \sim x$	*Riflessiva*
$x \sim y \Rightarrow y \sim x$	*Simmetrica*
$x \sim y$ e $y \sim z \Rightarrow x \sim z$	*Transitiva*
$[x] \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in X \mid y \sim x\}$	*Classe d'equivalenza di* $x \in X$
$X/\!\sim \stackrel{\text{def}}{=} \{[x] \mid x \in X\}$	*Insieme quoziente*
$\pi : X \to X/\!\sim$ $\pi(x) = [x]$	*Applicazione quoziente*

$\sim$ Relazione d'equivalenza su uno spazio topologico X.

Def. La *topologia quoziente* su $X/\!\sim$ è

$$\mathcal{T}_\sim \stackrel{\text{def}}{=} \{V \subset X/\!\sim \mid \pi^{-1}(V) \subset X \text{ aperto}\}.$$

$X/\!\sim$ con la topologia quoziente è detto *spazio quoziente*.

Oss.
$V \subset X/\!\sim$ aperto in $X/\!\sim \Leftrightarrow \pi^{-1}(V)$ aperto in X.
$C \subset X/\!\sim$ chiuso in $X/\!\sim \Leftrightarrow \pi^{-1}(C)$ chiuso in X.

Oss. $\mathcal{T}_\sim$ è una topologia perché

$$\pi^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad \pi^{-1}(X/\!\sim) = X$$

$$\pi^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) = \bigcup_{i\in I} \pi^{-1}(V_i)$$

$$\pi^{-1}(V_1 \cap V_2) = \pi^{-1}(V_1) \cap \pi^{-1}(V_2).$$

Oss. $\pi : X \to X/\!\sim$ continua e suriettiva.

N.B. Per definire $\sim$ su X è sufficiente dichiarare equivalenze non banali.

Esempio. *Retta con due origini.* Su $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0,1\}_{\text{dis}}$ definiamo

$$(x,0) \sim (x,1) \quad \forall\, x \in \mathbb{R} - \{0\} \quad \rightsquigarrow \quad R_\div := (\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R})/\!\sim.$$

Ogni intorno di $[(0,0)]$ interseca ogni intorno di $[(0,1)]$.

Teor. *$f : X/\!\sim \to Y$ continua $\Leftrightarrow$ $f \circ \pi : X \to Y$ continua.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ Immediato.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, V \subset Y$ aperto $\Rightarrow \pi^{-1}(f^{-1}(V)) = (f \circ \pi)^{-1}(V) \subset X$ aperto $\Rightarrow$ $f^{-1}(V) \subset X$ aperto $\Rightarrow$ f continua. □

Oss. $f : Y \to X/\!\sim$ continua *se* $\exists\, \tilde{f} : Y \to X$ continua t.c. $f = \pi \circ \tilde{f}$.

Spazi proiettivi

Poniamo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} - \{0\}$.
$\sim$ relazione di proporzionalità su $\mathbb{K}^{n+1} - \{0\}$

$$\forall\, x, y \in \mathbb{K}^{n+1} - \{0\},\ x \sim y \Leftrightarrow \exists\, \alpha \in \mathbb{K}^* \text{ t.c. } x = \alpha y$$

$\mathbb{K}\mathrm{P}^n \stackrel{\text{def}}{=} (\mathbb{K}^{n+1} - \{0\})/\sim$	$\mathbb{K}$-*Spazio proiettivo di dimensione* n. (*Retta* per $n = 1$, *piano* per $n = 2$)
$[x] = [x_0, \ldots, x_n] \in \mathbb{K}\mathrm{P}^n$	*Coordinate omogenee* (non tutte nulle).
$\pi : \mathbb{K}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{K}\mathrm{P}^n$ $\pi(x) = [x]$	Continua e suriettiva.

$\mathbb{K} = \mathbb{R} \rightsquigarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ *Spazio proiettivo reale di dimensione* n.
$\mathbb{K} = \mathbb{C} \rightsquigarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^n$ *Spazio proiettivo complesso di dimensione* n.

Proiettività. $A \in \mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{K}) \rightsquigarrow P_A : \mathbb{K}\mathrm{P}^n \to \mathbb{K}\mathrm{P}^n$
$P_A([x]) = [Ax]$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^{n+1} - \{0\} & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{K}^{n+1} - \{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathbb{K}\mathrm{P}^n & \xrightarrow[P_A]{} & \mathbb{K}\mathrm{P}^n \end{array} \qquad \begin{array}{l} L_A(x) = Ax \\ \\ P_A([x]) = [Ax] \end{array}$$

Oss.

1) $P_A \circ \pi = \pi \circ L_A \Rightarrow P_A$ continua e $P_A^{-1} = P_{A^{-1}} \Rightarrow P_A$ omeomorfismo.
2) $P_A = P_{\alpha A}\ \forall \alpha \in \mathbb{K}^*, \forall A \in \mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{K}) \rightsquigarrow$

$\mathrm{PGL}_{n+1}(\mathbb{K}) \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{K})/\mathbb{K}^*$ *Gruppo lineare proiettivo*
con $\mathbb{K}^* \cong \mathbb{K}^* I_{n+1} = Z(\mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{K}))$ centro di $\mathrm{GL}_{n+1}(\mathbb{K})$
$\alpha \cong \alpha I_{n+1}$ (sottogruppo normale)

Lezione 8

Assiomi di separazione T_1 e T_2

Def. Uno spazio topologico X è:



T_1 se $\forall\, x, y \in X,\ x \neq y \Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U - V$ e $y \in V - U$.



T_2 o *di Hausdorff* se $\forall\, x, y \in X,\ x \neq y \Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U,\ y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$.

Oss.

1) $\# X \geqslant 2 \Rightarrow X_{\text{ban}}$ non T_1.
2) $\# X = \infty \Rightarrow X_{\text{cof}}$ T_1 ma non T_2.
   $\boxed{T_1}$ $\forall\, x \neq y \in X_{\text{cof}} \rightsquigarrow U = X - \{y\},\ V = X - \{x\}$.
   $\boxed{\text{Non } T_2}$ $\forall\, U, V \subset X_{\text{cof}}$ aperti non vuoti $\Rightarrow \exists\, A, B \subset X$ finiti t.c. $U = X - A,\ V = X - B \Rightarrow U \cap V = X - (A \cup B) \neq \emptyset$.
3) X_{dis} T_2 $\forall\, X$.

Oss. $T_2 \not\Leftarrow\Rightarrow T_1$.

Oss. Metrizzabile $\Rightarrow T_2$. $\forall\, x \neq y \in (X, d) \rightsquigarrow r = \dfrac{d(x,y)}{2} > 0 \rightsquigarrow$ $x \in U := B_d(x, r)$, $y \in V := B_d(y, r)$ e $U \cap V = \emptyset$.

Oss. $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ e i loro sottospazi sono T_2 in quanto metrizzabili.
In particolare I^n, B^n, S^n e T^n sono T_2.

Oss. $T_2 \Rightarrow$ unicità del limite per funzioni e successioni.

Teor. *X è $T_1 \Leftrightarrow \forall\, x \in X$, $\{x\}$ è chiuso in X.*

In altre parole uno spazio è $T_1 \Leftrightarrow$ i punti sono chiusi.

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ $\forall\, x \in X$, $\forall\, y \in X - \{x\}$, $\exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U - V$ e $y \in V - U \Rightarrow y \in V \subset X - \{x\} \Rightarrow X - \{x\}$ aperto.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, x \neq y \in X \rightsquigarrow U := X - \{y\},\ V := X - \{x\}$ aperti $\Rightarrow$ $x \in U - V$ e $y \in V - U$. □

Oss. La retta con due origini $R_{\div}$ è T_1 ma non T_2.

Oss. T_1 e T_2 si preservano a meno di prodotti topologici. Esercizio.

Oss. $X_1, \ldots, X_n$ spazi $T_1 \Rightarrow i_j : X_j \hookrightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$ immers. chiusa $\forall\, j$.

Prop. *X è $T_2 \Leftrightarrow$ la diagonale $\Delta := \{(x, x) \mid x \in X\}$ è chiusa in $X \times X$.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ $\forall\, (x, y) \in (X \times X) - \Delta \Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U$, $y \in V$, $U \cap V = \emptyset \Rightarrow (x, y) \in U \times V \subset (X \times X) - \Delta \Rightarrow (X \times X) - \Delta$ aperto.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, x \neq y \in X \Rightarrow (x, y) \in (X \times X) - \Delta \Rightarrow \exists\, U \times V \subset X \times X$ aperto basico t.c. $(x, y) \in U \times V \subset (X \times X) - \Delta \Rightarrow x \in U$, $y \in V$, $U \cap V = \emptyset$. □

Cor. *$f, g : X \to Y$ continue e Y di Hausdorff $\Rightarrow$ l'insieme di coincidenza*

$$C(f,g) := \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

è chiuso in X.

Dim. $F : X \to Y \times Y$, $F(x) = (f(x), g(x))$ continua perché le componenti sono continue $\Rightarrow C(f,g) = F^{-1}(\Delta)$ chiuso, con $\Delta \subset Y \times Y$ diag. di Y. □

Proprietà topologiche ereditarie

Def. Una proprietà topologica $\mathcal{P}$ è *ereditaria* se valendo per uno spazio X vale anche per tutti i sottospazi topologici di X.

Oss. Se X ha una proprietà topologica ereditaria $\mathcal{P}$ e $Y \hookrightarrow X \Rightarrow Y$ ha $\mathcal{P}$.

Oss. La metrizzabilità è una proprietà topologica ereditaria.

Prop. *T_1 e T_2 sono proprietà topologiche ereditarie.*

Dim. Dimostriamolo per T_2. T_1 è lasciata per Esercizio.

T_2 proprietà topologica X T_2 e $X \cong Y \Rightarrow \exists f : X \to Y$ omeo.
$\forall y_1 \neq y_2 \in Y \ \exists U, V \subset X$ aperti t.c. $f^{-1}(y_1) \in U$, $f^{-1}(y_2) \in V$, $U \cap V = \emptyset$ $\Rightarrow f(U), f(V) \subset Y$ aperti, $y_1 \in f(U)$, $y_2 \in f(V)$, $f(U) \cap f(V) = \emptyset$.

T_2 ereditaria X T_2 e $Y \subset X$. $\forall y_1 \neq y_2 \in Y$, $\exists U, V \subset X$ aperti t.c. $y_1 \in U$, $y_2 \in V$, $U \cap V = \emptyset \Rightarrow U \cap Y$ e $V \cap Y$ aperti disgiunti in Y. □

Lezione 9

Assiomi di separazione T_3 e T_4

Def. Uno spazio topologico X è detto:

T_3 o *regolare* se X è T_1 e $\forall\, A \subset X$ chiuso, $\forall\, x \in X - A$ $\Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U$, $A \subset V$ e $U \cap V = \emptyset$.



T_4 o *normale* se X è T_1 e $\forall\, A, B \subset X$ chiusi t.c. $A \cap B = \emptyset$ $\Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $A \subset U$, $B \subset V$ e $U \cap V = \emptyset$.



Oss. $T_4 \not\Rightarrow T_3 \not\Rightarrow T_2 \not\Rightarrow T_1$.

N.B. In alcune referenze non si assume T_1 per regolare e normale. T_3 e T_4 sono accettati secondo la definizione data.

N.B. Esistono spazi T_3 non T_4, uno lo vedremo (forse) più avanti. Esempi di spazi T_2 non T_3 esistono ma non li esamineremo.

Prop. *T_3 e T_4 sono proprietà topologiche e T_3 è ereditaria.*

Dim. T_3 e T_4 proprietà topologiche: simile a T_2 nella lezione precedente. Mostriamo che T_3 è ereditaria. Sia X spazio T_3 e $Y \subset X$. Facciamo vedere che Y è T_3. Y è T_1 perché T_1 è ereditaria.
$\forall\, A \subset Y$ chiuso in Y, $\forall\, y \in Y - A$, $\exists\, \tilde{A} \subset X$ chiuso in X t.c. $A = \tilde{A} \cap Y$ $\Rightarrow y \in X - \tilde{A} \Rightarrow \exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $y \in U$, $\tilde{A} \subset V$, $U \cap V = \emptyset \Rightarrow$ $U' = U \cap Y$ e $V' = V \cap Y$ aperti in Y t.c. $y \in U'$, $A \subset V'$, $U' \cap V' = \emptyset$. $\square$

Oss. La dimostrazione non si estende a T_4 perché non è detto che esistano chiusi *disgiunti* $\tilde{A}, \tilde{B} \subset X$ t.c. $A = \tilde{A} \cap Y$, $B = \tilde{B} \cap Y$.

N.B. T_4 *non* è ereditaria, esistono controesempi ma non li esaminiamo. Per controesempi in topologia vedi Steen e Seebach, *Counterexamples in Topology*, e il sito π-Base `https://topology.pi-base.org/`

Oss. I sottospazi *chiusi* di spazi topologici T_4 sono T_4.

Esempio. La retta di Sorgenfrey $\mathbb{R}_\ell$ è T_4. $\mathbb{R}_\ell$ è T_1 (punti chiusi).
$\forall\, A, B \subset \mathbb{R}_\ell$ chiusi disgiunti non vuoti $\Rightarrow$

$$\forall\, a \in A\ \exists\, a' > a \text{ t.c. } [a, a'[\subset \mathbb{R}_\ell - B \ \rightsquigarrow\ U = \bigcup_{a \in A} [a, a'[$$

$$\forall\, b \in B\ \exists\, b' > b \text{ t.c. } [b, b'[\subset \mathbb{R}_\ell - A \ \rightsquigarrow\ V = \bigcup_{b \in B} [b, b'[$$

aperti t.c. $A \subset U$, $B \subset V$, $U \cap V = \emptyset$.

Oss. Per scegliere gli a' e b' occorre l'*Assioma della scelta*.

Teor. *Ogni spazio metrizzabile è T_4.*

Dim. (X, d) spazio metrico $\Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1$.
$\forall\, A, B \subset X$ chiusi non vuoti disgiunti $\rightsquigarrow$

$$U = \{x \in X \mid d(x, A) < d(x, B)\}$$
$$V = \{x \in X \mid d(x, A) > d(x, B)\}.$$

Disuguaglianze continue strette incompatibili $\Rightarrow U, V$ aperti e $U \cap V = \emptyset$. A e B chiusi disgiunti $\Rightarrow A \subset U$ e $B \subset V$. Quindi X è T_4. □

Oss. $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ e i loro sottospazi sono T_4 perché metrizzabili.
In particolare I^n, B^n, S^n e T^n sono T_4.

Prop. *Sia X spazio T_3. $\forall x \in X$, $\forall U \subset X$ intorno aperto di x, $\exists V \subset X$ intorno aperto di x t.c. $\mathrm{Cl}_X V \subset U$.*



Dim. $A := X - U$ chiuso e $x \in X - A \Rightarrow \exists V, W \subset X$ aperti t.c. $x \in V$, $A \subset W$, $V \cap W = \emptyset \Rightarrow V \subset X - W \subset X - A = U$ e $X - W$ chiuso $\Rightarrow \mathrm{Cl}_X V \subset X - W \subset U$. □

Cor. *Supponiamo che X sia T_1. Allora X è $T_3 \Leftrightarrow$ ogni punto $x \in X$ ammette base di intorni chiusi.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ Per la Prop. la famiglia degli intorni chiusi di x è base di intorni. $\boxed{\Leftarrow}$ X è T_1 per ipotesi. $\forall A \subset X$ chiuso, $\forall x \in X - A$, $\exists W \subset X$ intorno chiuso di x t.c. $W \subset X - A$ (aperto) $\rightsquigarrow U = \mathrm{Int}_X W$, $V = X - W$ aperti t.c. $x \in U$, $A \subset V$, $U \cap V = \emptyset$. □

Per gli spazi T_4 valgono enunciati analoghi, le dimostrazioni sono simili e vengono lasciate per Esercizio.

Prop. *Sia X spazio T_4. $\forall A \subset X$ chiuso, $\forall U \subset X$ intorno aperto di A $\exists V \subset X$ intorno aperto di A t.c. $\mathrm{Cl}_X V \subset U$.*



Cor. *Supponiamo che X sia T_1. Allora X è $T_4 \Leftrightarrow$ ogni chiuso $A \subset X$ ammette base di intorni chiusi.*

Lezione 10
Assiomi di numerabilità

Def. Un insieme A è *numerabile* se $\exists\, \varphi : A \to \mathbb{N}$ iniettiva.

Oss. A numerabile $\Leftrightarrow$ A finito oppure in biiezione con $\mathbb{N}$.

Oss. A numerabile $\Leftrightarrow \exists\, \psi : \mathbb{N} \to A$ suriettiva.

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ sono numerabili. Si può dimostrare che sono numerabili le unioni numerabili di insiemi numerabili e i prodotti finiti di insiemi numerabili $\Rightarrow$ $\mathbb{Q}^n$ numerabile. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ non è numerabile. $\mathbb{R}$ non è numerabile (Cantor).

Def. Uno spazio topologico X è detto:

I-Numerabile se ogni punto $x \in X$ ammette base di intorni numerabile

$$\mathcal{J}_x = \{J_{x,n}\}_{n\in\mathbb{N}}.$$

II-Numerabile se X ammette base numerabile

$$\mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}.$$

Oss. Metrizzabile $\Rightarrow$ I-numerabile: $\mathcal{J}_x = \left\{B\left(x, \frac{1}{n}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Esempio. $\mathbb{R}_\ell$ I-numerabile: $\mathcal{J}_x = \left\{\left[x, x + \frac{1}{n}\right[\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.
$\mathbb{R}_\ell$ non II-numerabile (lo mostreremo più avanti).

Esempio. $\mathbb{R}_{\text{dis}}$ non II-numerabile.

Prop. *II-numerabile $\Rightarrow$ I-numerabile.*

Dim. X spazio II-numerabile, $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base numerabile per X $\rightsquigarrow$ $\forall\, x \in X$, $\mathcal{J}_x = \{B_n \in \mathcal{B} \mid x \in B_n\}$ base di intorni numerabile di x. □

N.B. I-numerabile $\not\Rightarrow$ II-numerabile.

Def. $D \subset X$ è *denso* in X se $\mathrm{Cl}_X D = X$.

Prop. *$D \subset X$ è denso $\Leftrightarrow$ $\forall\, U \subset X$ aperto non vuoto si ha $D \cap U \neq \emptyset$.*

Dim. Segue subito dalla caratterizzazione dei punti della chiusura. □

Oss. Se su X è data una base, è sufficiente considerare aperti basici.

Esempio. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ denso numerabile. $\mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ denso numerabile.

Esempio. $\mathbb{R} - \{0\} \subset \mathbb{R}$ aperto denso.

Def. Uno spazio top. X è *separabile* se X ammette un denso numerabile.

Esempio. $\mathbb{R}^n$ separabile: $\mathbb{Q}^n$ denso numerabile.

Esempio. $\mathbb{R}_\ell$ separabile: $\mathbb{Q}$ denso numerabile.

Prop. *I-numerabile e II-numerabile sono proprietà topologiche ereditarie. Separabile è una proprietà topologica.*

N.B. Separabile *non* è ereditaria.

Prop. *Ogni spazio topologico II-numerabile è separabile.*

Dim. X II-numerabile, $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ base numerabile di aperti non vuoti $\Rightarrow \forall\, n \in \mathbb{N}\ \exists\, a_n \in B_n \rightsquigarrow D = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset X$ denso numerabile. □

N.B. Separabile $\not\Rightarrow$ II-numerabile.

N.B. Si usa l'Assioma della scelta.

Teor. *Ogni spazio metrizzabile separabile è II-numerabile.*

Dim. (X, d) spazio metrico, $D = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ denso numerabile in $X \rightsquigarrow$

$$\mathcal{B} = \left\{ B_d\left(a_n, \frac{1}{k}\right) \;\middle|\; n, k \in \mathbb{N} \right\}$$

famiglia numerabile di bocce aperte, mostriamo che è base.
$\forall\, U \subset X$ aperto, $\forall\, x \in U \Rightarrow \exists\, r > 0$ t.c. $B_d(x, r) \subset U \rightsquigarrow \exists\, k \in \mathbb{N}$ t.c. $\frac{1}{k} < \frac{r}{2}$
$\rightsquigarrow \exists\, n \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \in B_d\left(x, \frac{1}{k}\right) \Rightarrow x \in B_d\left(a_n, \frac{1}{k}\right) \subset B_d(x, r) \subset U$. □

Cor. *X metrizzabile separabile e $Y \subset X \Rightarrow Y$ II-numerabile e separabile.*

Dim. X II-numerabile $\Rightarrow Y$ II-numerabile $\Rightarrow Y$ separabile. □

Cor. *$\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, B^n, S^n e T^n sono I-numerabili, II-numerabili e separabili.*

Successioni

Def. Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ in uno spazio top. X *converge* a $x \in X$ se $\forall\, U \subset X$ intorno di x, $\exists\, N \in \mathbb{N}$ t.c. $x_n \in U\ \forall\, n \geqslant N$, e scriviamo

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

N.B. Non è detto che il limite esista e se esiste non è detto che sia unico. Vale l'unicità del limite negli spazi di Hausdorff.

Esempio. $\forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X_{\text{ban}}$ converge a $\forall\, x \in X_{\text{ban}}$.

Prop. *Sia (X, d) spazio metrico. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ converge a $x \in X \Leftrightarrow$*

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n, x) = 0.$$

La dimostrazione è semplice e nota dall'Analisi.

Prop. *Supponiamo X spazio metrizzabile e $A \subset X$ non vuoto.*
$\forall\, x \in X$ si ha $x \in \mathrm{Cl}_X A \Leftrightarrow \exists\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ t.c. $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.

Dim. $\boxed{\Leftarrow}$ Si usa il fatto che $x \in \mathrm{Cl}_X A \Leftrightarrow d(x, A) = 0$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Scegliamo distanza d su X. $\forall\, n \in \mathbb{N}\ \exists\, a_n \in A \cap B_d\left(x, \frac{1}{n}\right)$. □

Cor. *Supponiamo X metrizzabile. $D \subset X$ è denso in $X \Leftrightarrow$*
$\forall\, x \in X$, $\exists\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset D$ t.c. $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.

Oss. Generalizza il fatto che ogni numero reale è limite di numeri razionali.

Lezione 11

Spazi compatti

Def. Un *ricoprimento aperto* di uno spazio topologico X è una famiglia $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ di aperti di X, con A insieme arbitrario, t.c.

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = X.$$

Un *sottoricoprimento* di $\mathcal{U}$ per X è una sottofamiglia $\mathcal{U}' = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A'}$, con $A' \subset A$, che sia a sua volta un ricoprimento aperto, ossia

$$\bigcup_{\alpha \in A'} U_\alpha = X.$$

Un sottoricoprimento $\mathcal{U}' = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A'}$ è *finito* se A' è un insieme finito.

Def. Uno spazio topologico X è *compatto* se ogni ricoprimento aperto di X ammette un *sottoricoprimento finito*.

N.B. Si chiama anche *compattezza per ricoprimenti*, in contrasto con la *compattezza per successioni* usata in Analisi che richiameremo più avanti.

Oss. X compatto $\Leftrightarrow \forall \mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto di X, $\exists\, n \in \mathbb{N}$, $\exists\, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ t.c.

$$\bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} = X.$$

Oss. X non compatto $\Leftrightarrow \exists \mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto di X t.c. $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $\forall\, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A$ si ha

$$\bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \subsetneq X.$$

Oss.

X_{ban} compatto $\forall\, X$.
X finito $\Rightarrow$ X compatto.
X_{dis} compatto $\Leftrightarrow$ X_{dis} finito: $\{\{x\}\}_{x \in X_{\text{dis}}}$ ricoprimento aperto di X_{dis}.
$\mathbb{R}^n$ non compatto $\forall\, n \geqslant 1$: $\{B(0,k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ non ha sottoricoprimenti finiti.
$\mathbb{R}_\ell$ non compatto: $\{[k, k+1[\}_{k \in \mathbb{Z}}$ non ha sottoricoprimenti finiti.

La dimostrazione della Proposizione seguente è lasciata per Esercizio.

Prop. *La compattezza è una proprietà topologica.*

Def. Sia $\mathcal{B}$ base per X. Un ricoprimento aperto $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ di X è *basico* se $U_\alpha \in \mathcal{B}$ $\forall\, \alpha \in A$.

Prop. *Sia $\mathcal{B}$ base per X. Allora X è compatto $\Leftrightarrow$ ogni ricoprimento basico di X ammette un sottoricoprimento finito.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ Evidente.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall \mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto di $X \rightsquigarrow$

$$\mathcal{V} = \{B \in \mathcal{B} \mid \exists\, \alpha \in A \text{ t.c. } B \subset U_\alpha\}$$

ricoprimento basico di $X \rightsquigarrow \{B_1, \ldots, B_n\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{V}$ $\Rightarrow \forall\, i \in \{1, \ldots, n\}$, $\exists\, \alpha_i \in A$ t.c. $B_i \subset U_{\alpha_i} \Rightarrow \{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{U}$. □

Lezione 12

Lem. *$I = [0,1]$ è compatto come sottospazio di $\mathbb{R}$.*

Dim. Gli intervalli del tipo $[0,b[$, $]a,1]$, $]a,b[$, $\forall\, 0 \leqslant a < b \leqslant 1$ sono base per $[0,1]$, ottenuta intersecando la base di intervalli aperti di $\mathbb{R}$ con $[0,1]$.
$\forall\, \mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento basico per $[0,1]$ consideriamo

$$T := \left\{ t \in [0,1] \;\middle|\; \exists\, n \in \mathbb{N}, \exists\, \alpha_1 \ldots, \alpha_n \in A \text{ t.c. } [0,t] \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \right\}.$$

In altre parole: $t \in T \Leftrightarrow [0,t]$ finitamente ricoperto da aperti di $\mathcal{U}$.

$\exists\, a < b$ t.c. $U_0 = [0,a[$ e $U_1 =]b,1] \in \mathcal{U} \Rightarrow U_0 \subset T \neq \emptyset$.

$s := \sup T > 0$. Mostriamo che $s = 1$. Se per assurdo $s < 1 \Rightarrow$
$\exists\, \alpha \in A$ t.c. $s \in U_\alpha \Rightarrow \exists\, t \in T \cap U_\alpha$, $\exists\, s' \in U_\alpha$ t.c. $s' > s \rightsquigarrow$
$[0,s'] = [0,t] \cup [t,s'] \subset U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n} \cup U_\alpha \Rightarrow s' \in T$ contraddizione.

$\exists\, t \in T \cap U_1 \rightsquigarrow [0,1] = [0,t] \cup [t,1] = U_{\alpha_1} \cdots \cup U_{\alpha_n} \cup U_1$. □

Oss. $[0,1]_\ell \subset \mathbb{R}_\ell$ *non* è compatto nella topologia di Sorgenfrey

$$\mathcal{U} = \left\{ \left[1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n+1} \right[\right\}_{n\in\mathbb{N}} \bigcup \{\{1\}\}.$$

Proprietà degli spazi compatti

Teor. *X compatto e $Y \subset X$ chiuso $\Rightarrow$ Y compatto.*

Dim. $\forall\, \mathcal{V} = \{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto di $Y \Rightarrow \forall\, \alpha \in A$, $\exists\, U_\alpha \subset X$ aperto t.c. $V_\alpha = U_\alpha \cap Y \Rightarrow \mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \cup \{X - Y\}$ ricoprimento aperto di $X \rightsquigarrow \{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}, X - Y\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{U}$ per $X \Rightarrow$ $\{V_{\alpha_1}, \ldots, V_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{V}$ per Y. □

Oss. Non vale implicazione inversa: $\mathbb{R}_{\text{ban}}$ compatto, $Y = \{0\} \subset \mathbb{R}_{\text{ban}}$ compatto non chiuso.

Teor. *X compatto e $f : X \to Y$ continua e suriettiva $\Rightarrow$ Y compatto.*

Dim. $\forall\, \mathcal{V} = \{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto di $Y \Rightarrow U_\alpha := f^{-1}(V_\alpha)$ aperto in X e $V_\alpha = f(U_\alpha)$ perché f suriettiva. $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto di X $\rightsquigarrow \{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{U}$ per $X \Rightarrow \{V_{\alpha_1}, \ldots, V_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{V}$ per $Y = f(X)$. □

Cor. *X compatto $\Rightarrow$ $X/\!\sim$ compatto.*

Cor. *X compatto e $f : X \to Y$ continua $\Rightarrow$ $f(X) \subset Y$ compatto.*

Oss. In altre parole: l'immagine continua di un compatto è compatta.

Teor. *X spazio di Hausdorff, $Y \subset X$ sottospazio compatto, $x \in X - Y \Rightarrow$ $\exists\, U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U$, $Y \subset V$ e $U \cap V = \emptyset$.*

Dim. $\forall y \in Y$, $\exists U_y, V_y \subset X$ aperti t.c. $x \in U_y$, $y \in V_y$, $U_y \cap V_y = \emptyset \rightsquigarrow$ $\{V_y \cap Y\}_{y \in Y}$ ricoprimento aperto di $Y \rightsquigarrow \{V_{y_1} \cap Y, \ldots, V_{y_n} \cap Y\}$ sottoricoprimento finito $\rightsquigarrow$

$$U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{y_i} \qquad V = \bigcup_{i=1}^{n} V_{y_i}$$

aperti in X t.c. $x \in U$, $Y \subset V$, $U \cap V = \emptyset$. □

Teor. *X spazio di Hausdorff e $Y \subset X$ sottospazio compatto $\Rightarrow$ Y chiuso.*

Dim. $\forall x \in X - Y$, $\exists U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U$, $Y \subset V$ e $U \cap V = \emptyset \Rightarrow$ $x \in U \subset X - V \subset X - Y \Rightarrow X - Y$ aperto. □

Teor. *$f : X \to Y$ continua e biiettiva con X compatto e Y di Hausdorff $\Rightarrow$ f omeomorfismo.*

Dim. Basta far vedere che f è chiusa. $\forall A \subset X$ chiuso $\Rightarrow$ A compatto $\Rightarrow$ $f(A) \subset Y$ compatto $\Rightarrow$ $f(A)$ chiuso in Y. □

Cor. *$f : X \to Y$ continua e iniettiva con X compatto e Y di Hausdorff $\Rightarrow$ f immersione.*

Dim. $f(X) \subset Y$ di Hausdorff (T_2 ereditaria), $f|_{f(X)} : X \to f(X)$ continua e biiettiva quindi omeo per il Teorema. □

Lem. *X compatto di Hausdorff $\Rightarrow$ X è T_3.*

Dim. X è $T_2 \Rightarrow T_1$. $\forall Y \subset X$ chiuso $\Rightarrow$ Y compatto, $\forall x \in X - Y$, $\exists U, V \subset X$ aperti t.c. $x \in U$, $Y \subset V$, $U \cap V = \emptyset$. □

Def. Uno spazio X è *localmente compatto* se $\forall x \in X$, $\exists J \subset X$ intorno compatto di x in X.

Oss. Compatto $\Rightarrow$ loc. compatto.

N.B. In genere le proprietà locali sono espresse in termini di basi di intorni aventi tali proprietà. Localmente compatto è un'eccezione.

Lem. *X compatto di Hausdorff $\Rightarrow$ $\forall x \in X$, $\exists \mathcal{J}_x$ base di intorni compatti.*

Dim. Ogni punto ammette base di intorni chiusi, quindi compatti (vedi Lezione 9: caratterizzazione di T_3 mediante basi di intorni chiusi). □

Cor. *X localmente compatto di Hausdorff $\Rightarrow$ $\forall x \in X$, $\exists \mathcal{J}_x$ base di intorni compatti di x in X.*

Dim. $\forall x \in X$, $\exists J \subset X$ intorno compatto di x in $X \Rightarrow \exists \mathcal{J}_x$ base di intorni compatti di x in J e quindi in X. □

Cor. *X localmente compatto di Hausdorff $\Rightarrow$ X è T_3.*

Teor. *X compatto di Hausdorff $\Rightarrow$ X è T_4.*

Dim. X è T_3. $\forall P, Y \subset X$ chiusi t.c. $P \cap Y = \emptyset \Rightarrow \forall y \in Y$, $\exists U_y, V_y \subset X$ aperti t.c. $P \subset U_y$, $y \in V_y$, $U_y \cap V_y = \emptyset \rightsquigarrow \{V_y \cap Y\}_{y \in Y}$ ricoprimento aperto di Y compatto $\rightsquigarrow \{V_{y_1} \cap Y, \ldots, V_{y_n} \cap Y\}$ sottoricoprimento finito

$$U = \bigcap_{i=1}^{n} U_{y_i} \qquad V = \bigcup_{i=1}^{n} V_{y_i}$$

aperti in X t.c. $P \subset U$, $Y \subset V$ e $U \cap V = \emptyset$. □

Lavoro di gruppo. Esiste un omeomorfismo tra $[0, 1[$ e S^1?

Lezione 13

Compattezza dei prodotti finiti

Teor. $\forall\, n \in \mathbb{N}, \forall\, X_1, \dots, X_n$ *spazi top. compatti* $\Rightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$ *compatto.*

Dim. Basta dimostrarlo per $n = 2$ e fare induzione su n.
Supponiamo X e Y compatti e dimostriamo che $X \times Y$ è compatto.
$\forall\, \mathcal{W} = \{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto basico di $X \times Y$, $\forall\, x \in X \rightsquigarrow$

$$V_{\alpha,x} := (U_\alpha \times V_\alpha) \cap (\{x\} \times Y) \;\Rightarrow$$

$\mathcal{V}_x = \{V_{\alpha,x}\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto di $\{x\} \times Y \cong Y \overset{Y \text{ cpt}}{\Longrightarrow} \exists\, A_x \subset A$ finito t.c. $\mathcal{V}'_x = \{V_{\alpha,x}\}_{\alpha \in A_x}$ sottoricoprimento di $\mathcal{V}_x$ e $\emptyset \notin \mathcal{V}'_x \Rightarrow x \in U_\alpha, \forall\, \alpha \in A_x$

$$\Rightarrow\; x \in U'_x := \bigcap_{\alpha \in A_x} U_\alpha \;\text{ (intersezione finita) }\Rightarrow$$



U'_x aperto in $X \rightsquigarrow \mathcal{U} = \{U'_x\}_{x \in X}$ ricoprimento aperto di X
$\overset{X \text{ cpt}}{\rightsquigarrow} \{U'_{x_1}, \dots, U'_{x_k}\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{U}$ per $X \rightsquigarrow$

$$A' := \bigcup_{i=1}^{k} A_{x_i} \subset A \;\text{ sottoinsieme finito }\Rightarrow$$

$\mathcal{W}' = \{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in A'}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{W}$, infatti:
$\forall\, (x, y) \in X \times Y \rightsquigarrow x \in U'_{x_i} \rightsquigarrow (x_i, y) \in V_{\alpha,x_i}$ per un certo $\alpha \in A_{x_i} \subset A'$
$\Rightarrow (x, y) \in U'_{x_i} \times V_\alpha \subset U_\alpha \times V_\alpha \in \mathcal{W}'$. Quindi $X \times Y$ è compatto. □

Cor. I^n *compatto* $\forall\, n \geqslant 1$.

Def. Il *diametro* di uno spazio metrico (X, d) è definito come

$$\operatorname{diam}(X) = \sup\{d(x, y) \mid x, y \in X\} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

X è *limitato* se $\operatorname{diam}(X) < \infty$.

Teorema di Heine-Borel. $X \subset \mathbb{R}^n$ *è compatto* $\Leftrightarrow$ X *è chiuso e limitato.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ X compatto e $\mathbb{R}^n$ di Hausdorff $\Rightarrow X$ chiuso in $\mathbb{R}^n$.
$\{B(0, k) \cap X\}_{k \in \mathbb{N}}$ ricoprimento aperto di $X \rightsquigarrow$ sottoricoprimento finito $\Rightarrow X \subset B(0, k)$ con k massimo raggio $\Rightarrow X$ limitato.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\exists\, k \in \mathbb{N}$ t.c. $X \subset B(0, k) \subset [-k, k]^n \Rightarrow X$ chiuso in $[-k, k]^n \cong I^n$ compatto $\Rightarrow X$ compatto. □

Cor. B^n, S^n *e* T^n *sono compatti.*

Cor. $\mathbb{R}^n$ *è localmente compatto.*

Cor. $X \subset \mathbb{R}$ *compatto non vuoto* $\Rightarrow X$ *ha massimo e minimo.*

Dim. X chiuso e limitato $\Rightarrow \sup X \in \operatorname{Cl}_{\mathbb{R}} X = X \Rightarrow \sup X = \max X$. □

Cor. $f : X \to \mathbb{R}$ *continua e* X *compatto* $\Rightarrow f$ *ha massimo e minimo.*

Dim. $f(X) \subset \mathbb{R}$ compatto $\Rightarrow f(X)$ ha max e min $\Rightarrow f$ ha max e min. □

Enunciamo senza dimostrazione il seguente teorema di compattezza per prodotti arbitrari di spazi compatti.

Teorema di Tychonoff. $\{X_i\}_{i\in I}$ *spazi compatti* $\Rightarrow \prod_{i\in I} X_i$ *compatto.*

Esempio. Il cubo di Hilbert $[0,1]^{\mathbb{N}}$ è compatto.

Compattezza per successioni

Def. Uno spazio X è *compatto per successioni* o *sequenzialmente compatto* se ogni successione in X ammette una sottosuccessione convergente.

N.B. La compattezza per ricoprimenti e la compattezza per successioni sono nozioni distinte e in generale nessuna delle due implica l'altra. Esistono esempi di spazi compatti ma non compatti per successioni e viceversa.

Il seguente teorema è noto dall'Analisi e non lo dimostriamo.

Teorema di Bolzano-Weierstrass. $X \subset \mathbb{R}^n$ *è compatto per successioni* $\Leftrightarrow$ X *è chiuso e limitato.*

Dai teoremi di Heine-Borel e Bolzano-Weierstrass si ha:

Cor. $X \subset \mathbb{R}^n$ *è compatto* $\Leftrightarrow$ X *è compatto per successioni.*

In generale vale il teorema seguente che enunciamo senza dimostrazione.

Teor. *Uno spazio metrizzabile è compatto* $\Leftrightarrow$ *è compatto per successioni.*

Relazione d'equivalenza indotta

Def. $f: X \to Y \rightsquigarrow \sim_f$: $\forall\, x_1, x_2 \in X$, $x_1 \sim_f x_2 \overset{\text{def}}{\iff} f(x_1) = f(x_2)$ *relazione d'equivalenza indotta da* f.

Oss. $f: X \to Y$ continua $\rightsquigarrow \bar{f}: X/\!\sim_f \to Y$, $\bar{f}([x]) := f(x)$ ben definita, continua e iniettiva, infatti $f = \bar{f} \circ \pi$. $\bar{f}$ è detta f *passata al quoziente*.

Oss. $f: X \to Y$ continua, $X/\!\sim_f$ compatto e Y di Hausdorff $\Rightarrow$ $\bar{f}: X/\!\sim_f \to Y$ immersione ($\bar{f}$ omeo se f è anche suriettiva).

Def. $A \subset X \rightsquigarrow X/A \overset{\text{def}}{=} X/(a_1 \sim a_2, \forall\, a_1, a_2 \in A)$. $A \in X/A$ è un punto.

Esempio. $[0,1]/\{0,1\} = [0,1]/(0 \sim 1) \cong S^1$

$$f: [0,1] \to S^1, \quad f(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$$

identifica 0 e 1 $\Rightarrow \bar{f}: [0,1]/\{0,1\} \to S^1$ omeo.

Spazi proiettivi

Caso reale. $\pi : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$. $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$.
$\pi|_{S^n} : S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ continua e suriettiva $\Rightarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ compatto.
Infatti $[x] = \pi\left(\dfrac{x}{\|x\|}\right)$, $\forall\, [x] \in \mathbb{R}\mathrm{P}^n$.

Oss. $\forall\, x, y \in S^n$, $[x] = [y] \Leftrightarrow x = \pm y$.

Immersione in $\mathbb{R}^N$. $\forall\, i, j \in \{0, \dots, n\} \rightsquigarrow$

$$\varphi_{ij} : \mathbb{R}\mathrm{P}^n \to \mathbb{R}$$

$$\varphi_{ij}([x_0, \dots, x_n]) := \frac{x_i x_j}{x_0^2 + \cdots + x_n^2}$$

ben definita e continua perché $\varphi_{ij} \circ \pi$ è continua.

$$\varphi_{ij}([x]) = \varphi_{ij}([y]),\ \forall\, i, j \in \{0, \dots, n\} \ \Rightarrow\ [x] = [y].$$

$\varphi : \mathbb{R}\mathrm{P}^n \to \mathbb{R}^{(n+1)^2}$ con componenti φ_{ij} (in un certo ordine) continua iniettiva $\Rightarrow$ φ immersione $\Rightarrow$ $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ metrizzabile ($\Rightarrow$ di Hausdorff) e II-numerabile.

Retta proiettiva reale. $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \cong S^1/(x \sim -x,\ \forall\, x \in S^1) \cong I/\{0, 1\} \cong S^1$

Caso complesso. $\pi : \mathbb{C}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{C}\mathrm{P}^n$. $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1} \cong \mathbb{R}^{2n+2}$.
$\pi|_{S^{2n+1}} : S^{2n+1} \to \mathbb{C}\mathrm{P}^n$ continua e suriettiva $\Rightarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^n$ compatto.
Infatti $[x] = \pi\left(\dfrac{x}{\|x\|}\right)$, $\forall\, [x] \in \mathbb{C}\mathrm{P}^n$.

Oss. $\forall\, x, y \in S^{2n+1}$, $[x] = [y] \Leftrightarrow \exists\, \alpha \in S^1 \subset \mathbb{C}$ t.c. $x = \alpha y$.

Immersione in $\mathbb{C}^N$. $\forall\, i, j \in \{0, \dots, n\} \rightsquigarrow$

$$\varphi_{ij} : \mathbb{C}\mathrm{P}^n \to \mathbb{C}$$

$$\varphi_{ij}([x_0, \dots, x_n]) := \frac{x_i \bar{x}_j}{|x_0|^2 + \cdots + |x_n|^2}$$

ben definita e continua perché $\varphi_{ij} \circ \pi$ è continua.

$$\varphi_{ij}([x]) = \varphi_{ij}([y]),\ \forall\, i, j \in \{0, \dots, n\} \ \Rightarrow\ [x] = [y].$$

$\varphi : \mathbb{C}\mathrm{P}^n \to \mathbb{C}^{(n+1)^2}$ con componenti φ_{ij} (in un certo ordine) continua iniettiva $\Rightarrow$ φ immersione $\Rightarrow$ $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$ metrizzabile ($\Rightarrow$ di Hausdorff) e II-numerabile.

Lezione 14

Incollamenti topologici

Incollamento di due spazi. $A \subset X$, $f : A \to Y \rightsquigarrow$

$X \cup_f Y \stackrel{\text{def}}{=} (X \sqcup Y)/(a \sim f(a),\ \forall\, a \in A)$ *(incollamento mediante f)*

$f : A \xrightarrow{\cong} f(A)$ omeo $\rightsquigarrow X \cup_A Y := X \cup_f Y$ *(incollamento lungo A).*

Esempio. $S^n_\pm := \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n \mid \pm x_{n+1} \geqslant 0\}$ emisferi

$$\pi_\pm : S^n_\pm \xrightarrow{\cong} B^n \quad \text{omeo}$$
$$\pi_\pm(x_1 \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n)$$
$$\pi_\pm^{-1}(x) = \left(x,\ \pm\sqrt{1 - \|x\|^2}\right)$$



$$S^n = S^n_+ \cup S^n_- \qquad S^{n-1} = S^n_+ \cap S^n_-$$
$$S^n \cong B^n \cup_{S^{n-1}} B^n$$

Unione puntata. Dati $x_0 \in X$, $y_0 \in Y \rightsquigarrow$

$X \vee Y \stackrel{\text{def}}{=} (X \sqcup Y)/(x_0 \sim y_0)$ *unione puntata* di X e Y

Esempio. $\vee_n S^1$ unione puntata di n copie di S^1 *(bouquet di circonferenze).*



Autoincollamento. $A \subset X$, $f : A \to X \rightsquigarrow$

$$X/\!\sim_f = X/(a \sim f(a),\ \forall\, a \in A)$$

Immersione del toro in $\mathbb{R}^3$

$$\mathbb{R}_+ :=]0, +\infty[\cong \mathbb{R}$$

$$f : S^1 \times \mathbb{R}_+ \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2 - \{0\} \quad \text{omeo}$$
$$f((x_1, x_2), y) = (x_1 y, x_2 y)$$
$$f^{-1}(v) = \left(\frac{v}{\|v\|},\ \|v\|\right)$$

Trasliamo S^1 nella circonferenza di centro $(2, 0)$ e raggio 1

$$S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$$
$$(y_1, y_2) \mapsto (y_1 + 2, y_2)$$
$$T^2 = S^1 \times S^1 \hookrightarrow S^1 \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \cong (\mathbb{R}^2 - \{0\}) \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$$

$$\varphi : T^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \quad \text{immersione}$$
$$\varphi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = (x_1(y_1 + 2), x_2(y_1 + 2), y_2)$$

Oss. Si generalizza ad un'immersione $T^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ (induzione su $n \geqslant 1$).

Quozienti del quadrato

Incolliamo i lati linearmente a due a due seguendo le frecce.



$I \times S^1$
Anello o *cilindro*



$T^2 = S^1 \times S^1$
Toro



Mb
Striscia di Möbius



Kl
Bottiglia di Klein

Alcuni omeomorfismi degli spazi Euclidei

$\forall\, f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ continua $\rightsquigarrow$ $T_f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k = \mathbb{R}^{n+k}$

$$T_f(x, y) = (x, y + f(x))$$

T_f continua e $T_f^{-1} = T_{-f} \Rightarrow T_f$ omeomorfismo.
$T_f(x, 0) = (x, f(x))$, $\forall\, x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow T_f(\mathbb{R}^n \times \{0\}) =$ grafico di f.

Sottoinsiemi finiti di $\mathbb{R}^2$. $A = \{(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n)\} \subset \mathbb{R}^2$ punti distinti. A meno di rotazione e riordinamento, possiamo assumere $a_i < a_j$, $\forall\, i < j$.

$F =$ spezzata ottenuta congiungendo i punti di A e prolungandola indefinitamente con due semirette orizzontali.

$F =$ grafico di $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow T_f : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$ omeo t.c.

$$T_f^{-1}(A) \subset (\text{asse } x).$$



Il piano di Sorgenfrey

Il *piano di Sorgenfrey* è il prodotto topologico $\mathbb{R}_\ell^2 = \mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$.
$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}_\ell$ denso $\Rightarrow \mathbb{Q}^2 \subset \mathbb{R}_\ell^2$ denso $\Rightarrow \mathbb{R}_\ell^2$ separabile.

$$L := \{(x, -x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}_\ell^2 \qquad \text{seconda diagonale}$$

$$U_x := [x, x+1[\times [-x, -x+1[\qquad \text{aperto basico in } \mathbb{R}_\ell^2$$



$U_x \cap L = \{(x, -x)\}$ aperto in L, $\forall\, (x, -x) \in L \Rightarrow L \cong \mathbb{R}_{\text{dis}}$ discreto $\Rightarrow$ L non II-numerabile $\Rightarrow \mathbb{R}_\ell^2$ non II-numerabile (II-num. ereditaria) $\Rightarrow$ $\mathbb{R}_\ell^2$ non metrizzabile (metrizzabile separabile $\Rightarrow$ II-num.) $\Rightarrow$ $\mathbb{R}_\ell$ non metrizzabile e non II-numerabile.

Considerando i punti razionali e quelli irrazionali su L si ottengono due chiusi non separabili con aperti disgiunti, dimostrando che $\mathbb{R}_\ell^2$ non è T_4. Ricordando che $\mathbb{R}_\ell$ è T_4 si ha un esempio di spazio prodotto di due spazi T_4 che non è T_4, ossia T_4 non si preserva a meno di prodotti.

Lezione 15

Proiezione stereografica

$a = (0, \dots, 0, 1) \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$
$\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ identificato con l'iperpiano di equazione $x_{n+1} = 0$.

$\forall\, x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n - \{a\} \rightsquigarrow s(x) = L(a, x) \cap \mathbb{R}^n$, intersezione della retta $L(a, x)$ con $\mathbb{R}^n$. Si ottiene la formula seguente per $s(x)$.

Def. L'applicazione

$$s : S^n - \{a\} \to \mathbb{R}^n$$
$$s(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{(x_1, \dots, x_n)}{1 - x_{n+1}}$$

è detta *proiezione stereografica dal punto* a.



Quindi s è continua e con alcuni calcoli lasciati per esercizio si determina l'applicazione inversa, anch'essa continua.

Prop. *La proiezione stereografica è un omeomorfismo con inversa*

$$s^{-1} : \mathbb{R}^n \to S^n - \{a\}$$
$$s^{-1}(y) = \frac{(2y, \|y\|^2 - 1)}{\|y\|^2 + 1}$$

$\forall\, y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.



Oss. $S^n - \{a\} \cong \mathbb{R}^n$.

Oss. $s^{-1}(\mathbb{R}^n) = S^n - \{a\}$ aperto denso in S^n.

Oss. $s(0, \dots, 0, -1) = 0$.

Oss. Più in generale si può considerare la proiezione stereografica da un punto qualunque $u \in S^n$ verso l'iperpiano ortogonale $u^\perp \cong \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^{n+1}$.

Idea euristica.

$\lim_{x \to a} s(x) = \infty \overset{\text{Idea}}{\rightsquigarrow} a \in S^n$ corrisponde al "punto all'infinito" di $\mathbb{R}^n$.

Compattificazione di Alexandrov

Def. Una *compattificazione* di uno spazio topologico non compatto X è un'immersione di X come sottospazio denso di uno spazio compatto $\overline{X}$.

Teorema di Alexandrov. *X spazio topologico T_2 localmente compatto non compatto $\Rightarrow \exists\, \widehat{X} = X \cup \{\infty\}$ compattificazione T_2 di X, con $\infty \notin X$. Inoltre $\widehat{X}$ è unico a meno di omeomorfismi.*

Def. $\widehat{X}$ è detto *compattificazione di Alexandrov* o *compattificazione con un punto* di X. ∞ è il *punto all'infinito di X* e lo indicheremo anche ∞_X.

Dim. Poniamo $\widehat{X} := X \cup \{\infty\}$, dove ∞ indica un punto t.c. $\infty \notin X$.

Topologia di $\widehat{X}$. $U \subset \widehat{X}$ aperto $\overset{\text{def}}{\iff} \begin{cases} a)\ U \subset X \text{ aperto in } X, & \infty \notin U \\ b)\ X - U \subset X \text{ compatto}, & \infty \in U \end{cases}$

Gli aperti di $\widehat{X}$ sono gli aperti di X e i complementari dei compatti di X. Verifichiamo che è una topologia.

1) $\emptyset$ e $\widehat{X}$ aperti rispettivamente di tipo (a) e (b).

2) $\forall\, \{U_i\}_{i\in I}$ famiglia di aperti di $\widehat{X}$ poniamo

$I_0 := \{i \in I \mid \infty \notin U_i\} \rightsquigarrow U_0 := \bigcup_{i\in I_0} U_i \subset X$ aperto (a)

$I_\infty := \{i \in I \mid \infty \in U_i\} \rightsquigarrow U_\infty := \bigcup_{i\in I_\infty} U_i$ e $U := \bigcup_{i\in I} U_i = U_0 \cup U_\infty$

$I_\infty = \emptyset \Rightarrow U = U_0$ aperto. Supponiamo $I_\infty \neq \emptyset \Rightarrow \infty \in U_\infty$.

$X - U_\infty = X - \bigcup_{i\in I_\infty} U_i = \bigcap_{i\in I_\infty} \underbrace{(X - U_i)}_{\text{compatto}} \subset X$ compatto $\underset{X\ T_2}{\Rightarrow} U_\infty$ aperto (b).

$X - U = \underbrace{(X - U_0)}_{\text{chiuso in } X} \cap \underbrace{(X - U_\infty)}_{\text{compatto}} \subset X$ compatto $\Rightarrow U$ aperto (b).

3) $\forall\, U, V \subset \widehat{X}$ aperti. Entrambi $(a) \Rightarrow U \cap V$ aperto (a).

U tipo (a) e V tipo $(b) \Rightarrow K := X - V \subset X$ compatto e
$V_0 := X \cap V = X - K$ aperto in $X \Rightarrow U \cap V = U \cap V_0$ aperto (a).

Entrambi $(b) \Rightarrow X - (U \cap V) = \underbrace{(X - U)}_{\text{compatto}} \cup \underbrace{(X - V)}_{\text{compatto}} \Rightarrow U \cap V$ ap. (b).

$\widehat{X}$ compatto. $\forall\, \{U_i\}_{i\in I}$ ricoprimento aperto di $\widehat{X} \Rightarrow \exists\, i_\infty \in I$ t.c. $\infty \in U_{i_\infty}$

$\rightsquigarrow K := X - U_{i_\infty} \subset X$ compatto $\rightsquigarrow K \subset U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_n} \Rightarrow$
$\{U_{i_1}, \ldots, U_{i_n}, U_{i_\infty}\}$ sottoricoprimento finito.

X denso in $\widehat{X}$. $\forall\, \emptyset \neq U \subset \widehat{X}$ aperto. U tipo $(a) \Rightarrow U \cap X = U \neq \emptyset$.

U tipo $(b) \rightsquigarrow \underset{\text{cpt}}{K} := X - U \subsetneq \underset{\substack{\text{non}\\ \text{cpt}}}{X} \Rightarrow U \cap X = X - K \neq \emptyset$.

$\underline{T_2}$. $\forall x \neq y \in \widehat{X}$. $x, y \in X \Rightarrow \exists U, V$ aperti (a) t.c. $x \in U$, $y \in V$, $\overline{U} \cap Y = \emptyset$.

$x \in X$ e $y = \infty \Rightarrow \exists W \subset \underset{\substack{\text{loc.}\\ \text{cpt}}}{X}$ intorno compatto di $x \rightsquigarrow$

$U := \text{Int}_X W$, $V := \widehat{X} - W$ aperti in $\widehat{X}$ t.c. $x \in U$, $\infty \in V$ e $U \cap V = \emptyset$.

$\underline{\text{Unicità}}$. $\widehat{X}' = X \cup \{\infty'\}$, $\infty' \notin X$, altra compattificazione T_2 di $X \rightsquigarrow$

$$g : \widehat{X} \to \widehat{X}', \quad g(x) = \begin{cases} x, & x \neq \infty \\ \infty', & x = \infty \end{cases}$$

$\forall V \subset \widehat{X}'$ aperto. $\infty' \notin V \Rightarrow V \subset X \Rightarrow g^{-1}(V) = V$ aperto (a).

$\infty' \in V \Rightarrow K = \underset{\text{chiuso in } \widehat{X}'}{\widehat{X}' - V} \subset X$ compatto $\Rightarrow g^{-1}(V) = \widehat{X} - K$ aperto (b).

g continua e biiettiva, $\widehat{X}$ compatto, $\widehat{X}'$ $T_2 \Rightarrow g$ omeomorfismo. □

Oss. $X \subset \widehat{X}$ aperto denso.

Applicazioni proprie

Def. $f : X \to Y$ è *propria* se $\forall K \subset Y$ compatto $\Rightarrow f^{-1}(K) \subset X$ compatto.

Oss. In altre parole $f : X \to Y$ è propria se la preimmagine di qualunque compatto è compatta.

Oss. $f : X \to Y$ omeomorfismo $\Rightarrow f$ propria.

Teor. *X, Y spazi T_2 loc. compatti non compatti, $f : X \to Y$ continua e propria $\Rightarrow \widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{Y}$ estensione di f t.c. $f(\infty_X) = \infty_Y$ continua.*

Dim. $\widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{Y}$, $\widehat{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq \infty_X \\ \infty_Y & x = \infty_X \end{cases}$

$\forall V \subset \widehat{Y}$ aperto. V aperto $(a) \Rightarrow \widehat{f}^{-1}(V) = f^{-1}(V) \subset X$ aperto (a).

V aperto $(b) \Rightarrow K := \widehat{Y} - V = Y - V \subset Y$ compatto $\overset{\text{propria}}{\Longrightarrow}$

$\widehat{f}^{-1}(K) = f^{-1}(K) \subset X$ compatto $\Rightarrow \widehat{f}^{-1}(V) = \widehat{X} - f^{-1}(K)$ aperto (b). □

Cor. *$f : X \to Y$ omeomorfismo $\Rightarrow \widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{Y}$ omeomorfismo.*

Cor. *X compatto T_2, $a \in X$ t.c. $X_0 = X - \{a\}$ non compatto $\Rightarrow \widehat{X}_0 = X$.*

Cor. $\widehat{\mathbb{R}^n} \cong S^n$, $\forall n \geqslant 1$.

Dim. $\mathbb{R}^n \cong S^n - \{a\} \Rightarrow \widehat{\mathbb{R}^n} \cong \widehat{S^n - \{a\}} = S^n$. □

Oss. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua.
$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = a \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \exists \tilde{f} : \widehat{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ estensione continua di f t.c. $\tilde{f}(\infty) = a$.

$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow f$ propria $\rightsquigarrow \widehat{f} : \widehat{\mathbb{R}} \to \widehat{\mathbb{R}}$, $\widehat{f}(\infty) = \infty$.

Lezione 16

Spazi proiettivi

Carte affini. Poniamo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Per $i = 0, \dots, n$ definiamo

$H_i \stackrel{\text{def}}{=} \{[x_0, \dots, x_n] \in \mathbb{K}\mathrm{P}^n \mid x_i = 0\} \cong \mathbb{K}\mathrm{P}^{n-1}$ iperpiano proiettivo

$U_i \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{K}\mathrm{P}^n - H_i = \{[x_0, \dots, x_n] \in \mathbb{K}\mathrm{P}^n \mid x_i \neq 0\}$ aperto denso

$$\varphi_i : U_i \xrightarrow{\cong} \mathbb{K}^n \quad \text{omeo } \textit{(carta affine)}$$

$$\varphi_i([x_0, \dots, x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}\right)$$

$$\varphi_i^{-1}(y_1, \dots, y_n) = [y_1, \dots, y_i, 1, y_{i+1}, \dots, y_n]$$

Oss. $U_i \cong \mathbb{K}^n$ è uno spazio affine e $\mathbb{K}\mathrm{P}^n = U_0 \cup \dots \cup U_n$.

Oss. $\mathbb{K}\mathrm{P}^n = U_0 \cup H_0$ compattificazione di $\mathbb{K}^n \cong U_0$ ($n \geqslant 1$).

Oss. Per $n = 1$, $H_0 = \{[0, 1]\}$ è un punto $\Rightarrow \mathbb{K}\mathrm{P}^1 = U_0 \cup \{[0, 1]\} \cong \widehat{\mathbb{K}}$ compattificazione di Alexandrov di $\mathbb{K}$.

Retta proiettiva reale. $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \cong \widehat{\mathbb{R}} \cong S^1$.

Retta proiettiva complessa. $\mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong \widehat{\mathbb{C}} \cong \widehat{\mathbb{R}}^2 \cong S^2$.

N.B. $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ e $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$ non sono omeomorfi a sfere per $n > 1$.

Spazi connessi

Def. Uno spazio topologico X è *connesso* se gli unici sottoinsiemi aperti e chiusi di X sono $\emptyset$ e X. Uno spazio non connesso è detto *sconnesso*.

Prop. *X sconnesso $\Leftrightarrow \exists\, \emptyset \neq U \subsetneq X$ aperto e chiuso $\Leftrightarrow$ X è unione di due aperti non vuoti disgiunti.*

Dim. Primo $\Leftrightarrow$ per definizione. Dimostriamo il secondo.
$\boxed{\Rightarrow}$ $\emptyset \neq U \subsetneq X$ aperto e chiuso $\rightsquigarrow V := X - U \neq \emptyset$ aperto.

$\boxed{\Leftarrow}$ $X = U \cup V$ con $U, V \subset X$ aperti non vuoti disgiunti $\Rightarrow$
$\emptyset \neq U \subsetneq X$ aperto e chiuso. □

Cor. *X connesso $\Leftrightarrow \forall\, U, V \subset X$ aperti t.c. $U \cup V = X$ e $U \cap V = \emptyset$ si ha $U = \emptyset$ oppure $V = \emptyset$.*

Esempi.

1) $[0,1] \cup [2,3] \subset \mathbb{R}$ sconnesso.

2) $\mathbb{R}_\ell$ sconnesso: $\mathbb{R}_\ell =]-\infty, 0[\cup [0, +\infty[$ aperti non vuoti disgiunti.

3) $\forall\, X_{\text{ban}}$ connesso.

4) X_{dis} connesso $\Leftrightarrow |X_{\text{dis}}| = 1$.

5) $\bigsqcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ connesso $\Rightarrow |A| = 1$ (unione banale).

Teor. *$I = [0,1]$ è connesso con la topologia Euclidea.*

Dim. Per assurdo $I = U \cup V$ aperti non vuoti disgiunti $\Rightarrow U, V$ chiusi limitati. Sia $0 \in U \rightsquigarrow \nu = \min V > 0 \Rightarrow [0, \nu[\subset U \Rightarrow \mathrm{Cl}_I[0, \nu[= [0, \nu] \subset U \Rightarrow$ $\nu \in U \cap V \neq \emptyset$ contraddizione. □

Teor. *$f : X \to Y$ continua suriettiva e X connesso $\Rightarrow$ Y connesso.*

Dim. $\forall\, \emptyset \neq V \subset Y$ aperto e chiuso $\rightsquigarrow \emptyset \neq U := f^{-1}(V) \subset X$ aperto e chiuso $\Rightarrow U = X \Rightarrow V = f(U) = f(X) = Y \Rightarrow Y$ connesso. □

Cor. *$f : X \to Y$ continua e X connesso $\Rightarrow f(X) \subset Y$ connesso.*

Oss. Immagine continua di un connesso è connessa.

Teor. *$X = \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ con X_α connesso $\forall\, \alpha \in A$ e $\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha \neq \emptyset \Rightarrow X$ connesso.*

Dim. $x_0 \in \bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha$. Per assurdo $X = U \cup V$ aperti non vuoti disgiunti con $x_0 \in U$, $x_1 \in V \rightsquigarrow x_1 \in X_{\alpha_1} \Rightarrow U' = X_{\alpha_1} \cap U$, $V' = X_{\alpha_1} \cap V$ aperti non vuoti disgiunti in X_{α_1} t.c. $X_{\alpha_1} = U' \cup V'$ contraddizione. □

Prop. *$Y \subset X$ sottospazio connesso $\Rightarrow \mathrm{Cl}_X Y$ connesso.*

Dim. $\forall\, \emptyset \neq U \subset \mathrm{Cl}_X Y$ aperto e chiuso in $\mathrm{Cl}_X Y \Rightarrow U$ chiuso in X e $\exists\, \tilde{U} \subset X$ aperto in X t.c. $U = \tilde{U} \cap \mathrm{Cl}_X Y \Rightarrow U \cap Y = \tilde{U} \cap Y \neq \emptyset$ aperto e chiuso in $Y \Rightarrow U \cap Y = Y \subset U \Rightarrow \mathrm{Cl}_X Y \subset U \Rightarrow \mathrm{Cl}_X Y = U$. □

Componenti connesse.

Def. Dato uno spazio topologico X, la *componente connessa* di $x \in X$ è

$$\mathcal{C}_x(X) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{\substack{x \in C \subset X \\ C \text{ conn.}}} C$$

Teor. *Valgono le seguenti proprietà:*

1) $x \in \mathcal{C}_x(X) \neq \emptyset$, $\forall\, x \in X$;

2) $\mathcal{C}_x(X)$ *è il più grande sottospazio connesso di* X *che contiene* x;

3) $\forall\, x, y \in X$, $\mathcal{C}_x(X) \cap \mathcal{C}_y(X) \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{C}_x(X) = \mathcal{C}_y(X)$;

4) $\mathcal{C}_x(X)$ *chiuso in* X, $\forall\, x \in X$.

Dim.

1) $\{x\}$ connesso quindi è nell'unione.

2) $\mathcal{C}_x(X)$ connesso perché unione di connessi con intersezione non vuota.

3) $\boxed{\Leftarrow}$ Ovvio.
$\boxed{\Rightarrow}$ $x, y \in \mathcal{C}_x(X) \cup \mathcal{C}_y(X)$ connesso $\Rightarrow \mathcal{C}_x(X) \cup \mathcal{C}_y(X) \subset \mathcal{C}_x(X) \Rightarrow$ $\mathcal{C}_y(X) \subset \mathcal{C}_x(X)$ e similmente per l'altra inclusione.

4) $x \in \mathrm{Cl}_X(\mathcal{C}_x(X))$ connesso $\Rightarrow \mathrm{Cl}_X(\mathcal{C}_x(X)) \subset \mathcal{C}_x(X) \Rightarrow$
$\mathrm{Cl}_X(\mathcal{C}_x(X)) = \mathcal{C}_x(X)$ chiuso. □

Def. $\mathcal{C}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{C}_x(X) \mid x \in X\}$ *insieme delle componenti connesse di* X.

Oss. $\mathcal{C}(X)$ è una partizione di X in sottospazi chiusi disgiunti.

Oss. X connesso $\Leftrightarrow$ X ha un'unica componente connessa.

Oss. $\mathcal{C}(X)$ finito $\Rightarrow \mathcal{C}_x(X)$ aperto in X, $\forall\, x \in X \Rightarrow X$ unione topologica delle sue componenti connesse.

Def. Uno spazio topologico X è *localmente connesso* se $\forall\, x \in X$, $\exists\, \mathcal{J}_x$ base di intorni aperti connessi di x in X.

Teor. X *loc. connesso* $\Rightarrow \mathcal{C}_x(X)$ *aperto in* X, $\forall\, x \in X$.

Dim. $\forall\, y \in \mathcal{C}_x(X)$, $\exists\, J \subset X$ intorno conn. di $y \Rightarrow J \subset \mathcal{C}_y(X) = \mathcal{C}_x(X)$. □

Cor. X *loc. conn.* $\Rightarrow X$ *unione topologica delle sue componenti connesse.*

Oss. Connesso e loc. connesso sono proprietà topologiche.

Esempi.

1) $X = [0,1] \cup [2,3] \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{C}_3(X) = [2,3]$, $\mathcal{C}(X) = \{[0,1], [2,3]\}$.

2) $X = \{0\} \cup \left\{ \dfrac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\} \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{C}_0(X) = \{0\}$ non è aperto in X.

Lezione 17

Cammini continui

Def. Un *cammino* continuo in uno spazio topologico X è un'applicazione continua $\alpha : I \to X$. $\alpha(0) = x_0$ e $\alpha(1) = x_1$ sono gli *estremi* di α, x_0 *punto iniziale*, x_1 *punto terminale*, α cammino tra x_0 e x_1.
Un cammino $\alpha : I \to X$ è detto *cappio* se $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$ (*punto base*).

I cammini saranno sempre considerati continui.



Cappio costante. $x_0 \in X \rightsquigarrow \gamma_{x_0} : I \to X$, $\gamma_{x_0}(t) = x_0$, $\forall\, t \in I$.



Concatenazione di cammini. $\alpha, \beta : I \to X$ cammini t.c.

$$\alpha(0) = x_0,\ \alpha(1) = \beta(0) = x_1,\ \beta(1) = x_2 \rightsquigarrow$$

$$\alpha * \beta : I \to X$$

$$(\alpha * \beta)(t) \overset{\text{def}}{=} \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \beta(2t-1), & \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$



Oss. $\alpha \cdot \beta$ continua in $t = \frac{1}{2}$ perché $\alpha(1) = \beta(0)$.

Def. $\alpha * \beta$ si chiama *concatenazione* di α e β.

Oss. α e β cappi $\Rightarrow \alpha \cdot \beta$ cappio.

Cammino inverso. $\alpha : I \to X$ cammino t.c. $\alpha(0) = x_0$, $\alpha(1) = x_1 \rightsquigarrow$

$$\bar{\alpha} : I \to X$$

$$\bar{\alpha}(t) \overset{\text{def}}{=} \alpha(1-t)$$



Si ha $\bar{\alpha}(0) = x_1$ e $\bar{\alpha}(1) = x_0$.

Def. $\bar{\alpha}$ è detto *cammino inverso* di α.

Oss. α cappio $\Rightarrow \bar{\alpha}$ cappio.

Spazi connessi per archi

Def. Uno spazio topologico X è *connesso per archi (cpa)* se $\forall\, x_0, x_1 \in X$ $\exists\, \alpha : I \to X$ cammino continuo t.c. $\alpha(0) = x_0$ e $\alpha(1) = x_1$.

Teor. *X connesso per archi $\Rightarrow$ X connesso.*

Dim. Per assurdo X sconnesso $\rightsquigarrow X = U \cup V$ aperti non vuoti disgiunti. Scegliamo $x_0 \in U$, $x_1 \in V \rightsquigarrow \alpha : I \to X$ cammino t.c. $\alpha(0) = x_0$ e $\alpha(1) = x_1 \Rightarrow 0 \in \tilde{U} := \alpha^{-1}(U)$, $1 \in \tilde{V} := \alpha^{-1}(V) \subset I$ aperti non vuoti disgiunti e $I = \tilde{U} \cup \tilde{V} \Rightarrow I$ sconnesso, contraddizione. □

Teor. *$f : X \to Y$ continua suriettiva e X cpa $\Rightarrow$ Y cpa.*

Dim. $\forall\, y_0, y_1 \in Y \rightsquigarrow x_0 \in f^{-1}(y_0)$, $x_1 \in f^{-1}(y_1) \rightsquigarrow \alpha : I \to X$ t.c. $\alpha(0) = x_0$, $\alpha(1) = x_1 \rightsquigarrow \beta = f \circ \alpha : I \to Y$ t.c. $\beta(0) = y_0$, $\beta(1) = y_1$. □

Cor. *$f : X \to Y$ continua e X cpa $\Rightarrow$ $f(X) \subset Y$ cpa.*

Oss. Immagine continua di un connesso per archi è connessa per archi.

Def. $U \subset \mathbb{R}^n$ è *convesso* se $\forall\, x_0, x_1 \in U \Rightarrow$ il segmento $[x_0, x_1] \subset U$.

Oss. $U \subset \mathbb{R}^n$ convesso $\Rightarrow U$ cpa. Infatti $\forall\, x_0, x_1 \in U \rightsquigarrow$

$\alpha : I \to U$

$\alpha(t) = (1-t)x_0 + tx_1$ (*combinazione convessa* di x_0 e x_1)

parametrizza il segmento $[x_0, x_1]$ quindi è un cammino in U tra x_0 e x_1.

Esempi.

1) Ogni intervallo $J \subset \mathbb{R}$ è convesso quindi cpa.

2) $\mathbb{R}^n - \{0\}$ cpa $\forall\, n \geqslant 2$. $\forall\, x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ se $[x_0, x_1]$ non passa per 0 determina un cammino. Se $[x_0, x_1]$ passa per $0 \rightsquigarrow [x_0, x_2] \cup [x_2, x_1]$.

3) S^n cpa $\forall\, n \geqslant 1$. $f : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to S^n$, $f(x) = \frac{x}{\|x\|}$ continua e suriettiva.

4) $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ e $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$ cpa $\forall\, n \geqslant 0$. $\pi : \mathbb{K}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{K}\mathrm{P}^n$ continua e suriettiva.

Lem. *X spazio topologico e $x_0 \in X$. X cpa $\Leftrightarrow \forall\, x \in X$, $\exists\, \alpha : I \to X$ cammino t.c. $\alpha(0) = x_0$ e $\alpha(1) = x$.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ Per definizione.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\forall\, x, y \in X \rightsquigarrow \alpha, \beta : I \to X$ cammini t.c. $\alpha(0) = \beta(0) = x_0$, $\alpha(1) = x$, $\beta(1) = y \Rightarrow \gamma := \bar{\alpha} * \beta : I \to X$ t.c. $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$. □

Teor. *$X = \bigcup_{i \in I} X_i$ con X_i cpa $\forall\, i \in I$ e $\bigcap_{i \in I} X_i \neq \emptyset \Rightarrow X$ cpa.*

Dim. $x_0 \in \bigcap_{i \in I} X_i$. $\forall\, x \in X \rightsquigarrow x \in X_i \rightsquigarrow$ cammino tra x_0 e x in $X_i \subset X$. □

Componenti connesse per archi.

Def. Dato uno spazio X, la *componente connessa per archi* di $x \in X$ è

$$\mathcal{P}_x(X) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{\substack{x \in P \subset X \\ P \text{ cpa}}} P$$

Teor. *Valgono le seguenti proprietà:*

1) $x \in \mathcal{P}_x(X) \neq \emptyset$, $\forall\, x \in X$;

2) $\mathcal{P}_x(X)$ *è il più grande sottospazio cpa di X che contiene x;*

3) $\forall\, x, y \in X$, $\mathcal{P}_x(X) \cap \mathcal{P}_y(X) \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{P}_x(X) = \mathcal{P}_y(X)$;

4) $\mathcal{P}_x(X) \subset \mathcal{C}_x(X)$, $\forall\, x \in X$.

Dim. Esercizio (simile al caso di $\mathcal{C}_x(X)$). □

N.B. Le componenti cpa non sono necessariamente chiuse né aperte.

Def. $\mathcal{P}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{P}_x(X) \mid x \in X\}$ *insieme delle componenti connesse per archi di* X.

Oss. $\mathcal{P}(X)$ è una partizione di X in sottospazi disgiunti.

Oss. X cpa $\Leftrightarrow$ X ha un'unica componente cpa.

Def. Uno spazio topologico X è *localmente connesso per archi* se $\forall\, x \in X$, $\exists\, \mathcal{J}_x$ base di intorni aperti connessi per archi di x in X.

Oss. Loc. cpa $\Rightarrow$ loc. connesso.

Teor. *X loc. cpa $\Rightarrow$ $\mathcal{P}_x(X) = \mathcal{C}_x(X)$ aperto e chiuso in X, $\forall\, x \in X$.*

Dim. $\forall\, y \in \mathcal{P}_x(X) \rightsquigarrow J \subset X$ intorno cpa di $y \Rightarrow J \subset \mathcal{P}_y(X) = \mathcal{P}_x(X)$ $\Rightarrow \mathcal{P}_x(X)$ aperto in X, $\forall\, x \in X$.

$X - \mathcal{P}_x(X)$ aperto $\Rightarrow \mathcal{P}_x(X)$ aperto e chiuso non vuoto in X quindi in $\mathcal{C}_x(X)$ (connesso) $\Rightarrow \mathcal{P}_x(X) = \mathcal{C}_x(X)$. □

Cor. *X connesso e loc. cpa $\Rightarrow$ X cpa.*

Cor. *X loc. cpa* $\Rightarrow X = \bigsqcup_{P \in \mathcal{P}(X)} P$ *unione topologica delle componenti cpa.*

Spazio connesso ma non connesso per archi.

$A = \{0\} \times [-1, 1]$ cpa

$B = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \;\middle|\; x > 0 \right\} \cong]0, +\infty[$ cpa



$X \stackrel{\text{def}}{=} A \cup B = \mathrm{Cl}_{\mathbb{R}^2} B \subset \mathbb{R}^2 \Rightarrow X$ connesso.

X non cpa, infatti se per assurdo $\alpha : I \to X$ cammino t.c. $\alpha(0) = (0, 0)$, $\alpha(1) = (1, \sin 1) \Rightarrow \pi(\alpha(I)) = [0, a]$ con $a \geqslant 1 \Rightarrow$ α percorre infiniti max loc. $\Rightarrow \nexists \lim_{t \to 0^+} \alpha(t) \Rightarrow \alpha$ non continua.

$\mathcal{P}(X) = \{A, B\}$, $\mathcal{C}(X) = \{X\}$.

Oss. X non è loc. connesso. I punti di A non hanno intorni connessi.

Lezione 18

Componenti connesse degli aperti di $\mathbb{R}^n$

Prop. *X loc. cpa e II-numerabile $\Rightarrow$ $\mathcal{P}(X) = \mathcal{C}(X)$ numerabile.*

Dim. X è unione topologica delle componenti cpa e queste sono aperte. $\forall\, P \in \mathcal{P}(X)$ scegliamo $a_P \in P$ (assioma della scelta).
$A := \{a_P \mid P \in \mathcal{P}(X)\} \subset X$ sottospazio discreto $\Rightarrow$ A è II-numerabile $\Rightarrow$ (proprietà ereditaria)
$A \cong \mathcal{P}(X)$ al più numerabile $\Rightarrow$ $\mathcal{P}(X)$ al più numerabile. □

Oss. $U \subset \mathbb{R}^n$ aperto $\Rightarrow$ U loc. cpa. $\forall\, x \in U\ \exists\, r_x > 0$ t.c. $B(x, r_x) \subset U \Rightarrow$ $\mathcal{J}_x = \{B(x, r) \mid 0 < r < r_x\}$ base di intorni aperti convessi quindi cpa.

Cor. *$U \subset \mathbb{R}^n$ aperto $\Rightarrow$ U unione numerabile di aperti disgiunti e connessi per archi e $\mathcal{P}(U) = \mathcal{C}(U)$.*

Teor. *$X \subset \mathbb{R}$ connesso $\Leftrightarrow$ X è un punto o un intervallo $\Leftrightarrow$ $X \subset \mathbb{R}$ cpa.*

Dim. I punti e gli intervalli sono cpa quindi connessi. Resta da dimostrare che $X \subset \mathbb{R}$ connesso e $\#X > 1 \Rightarrow X$ intervallo.
Per assurdo, supponiamo che $\exists\, a < b < c$ t.c. $a, c \in X$ e $b \notin X \Rightarrow$
$a \in U :=]-\infty, b[\cap X =]-\infty, b] \cap X$ aperto e chiuso non vuoto in X t.c. $c \notin U \Rightarrow X$ sconnesso, contraddizione. □

Teor (dei valori intermedi)**.** *$f : X \to \mathbb{R}$ continua non costante con X connesso $\Rightarrow$ $f(X)$ intervallo.*

Cor. *$U \subset \mathbb{R}$ aperto $\Leftrightarrow$ U unione numerabile di intervalli aperti disgiunti.*

Lem. *$f : [a, b] \to [c, d]$ continua e biiettiva $\Rightarrow$ $f(\{a, b\}) = \{c, d\}$.*

Dim. Per assurdo, $c < f(a) < d \Rightarrow f(]a, b]) = [c, f(a)[\cup\,]f(a), d]$ connesso, contraddizione. Analogamente per $f(b)$. □

Teor. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua e biiettiva $\Rightarrow$ f omeomorfismo.*

Dim. $\forall\, a < b \Rightarrow f([a, b]) = [c, d] \Rightarrow f(]a, b[) =]c, d[\Rightarrow f$ aperta. □

N.B. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua e biiettiva $\Rightarrow$ f omeomorfismo, ma non abbiamo gli strumenti per dimostrarlo se $n \geqslant 2$.

Omotopia

X, Y spazi topologici, $I = [0, 1]$.

Def. Un'*omotopìa* da X a Y è un'applicazione continua $H : X \times I \to Y$.

$H : X \times I \to Y \rightsquigarrow h_s : X \to Y$, $h_s(x) := H(x, s)$, $\forall\, x \in X$, $\forall\, s \in I$.

N.B. Assumeremo *continue* tutte le applicazioni tra spazi topologici.

Def. $f, g : X \to Y$ sono *omòtope* se $\exists\, H : X \times I \to Y$ t.c. $h_0 = f$ e $h_1 = g$. Se f e g sono omotope scriviamo $f \simeq g$.

Oss. $f \simeq g \Leftrightarrow \exists\, H : X \times I \to Y$ t.c. $H(x, 0) = f(x)$ e $H(x, 1) = g(x)$, $\forall\, x \in X$. Durante l'omotopia f si "deforma" in g in modo continuo.

Oss. Un'omotopia $H : X \times I \to Y$ è un cammino nello spazio delle applicazioni continue $C(X, Y) := \{f : X \to Y \mid f \text{ continua}\}$.

Def. $f, g : X \to Y$ sono *omotope relativamente ad* $A \subset X$ se $f|_A = g|_A$ e $\exists\, H : X \times I \to Y$ t.c. $h_0 = f$, $h_1 = g$ e $h_s|_A = f|_A$, $\forall\, s \in I$.
Scriviamo $f \simeq_A g$ oppure $f \simeq g$ (rel A).

Oss. $f \simeq_A g \Leftrightarrow \exists\, H : X \times I \to Y$ t.c. $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$, $\forall\, x \in X$, e $H(x, s) = f(x)$, $\forall\, x \in A$, $\forall\, s \in I$.
Durante l'omotopia relativa f si "deforma" in g senza modifiche su $A \subset X$.

Per le omotopie consideriamo le operazioni tra cammini.

Def.

1) $f : X \to Y \rightsquigarrow H_f : X \times I \to Y$, $H_f(x, s) \overset{\text{def}}{=} f(x)$ *omotopia stazionaria.*

2) $H : X \times I \to Y \rightsquigarrow \bar{H} : X \times I \to Y$ *omotopia inversa*

$$\bar{H}(x, s) \overset{\text{def}}{=} H(x, 1 - s).$$

3) $H, K : X \times I \to Y$ t.c. $h_1 = k_0 : X \to Y \rightsquigarrow$

$H * K : X \times I \to Y$ *concatenazione di* H *e* K

$$(H * K)(x, s) \overset{\text{def}}{=} \begin{cases} H(x, 2s), & 0 \leqslant s \leqslant \frac{1}{2} \\ K(x, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Oss. $\simeq$ e $\simeq_A$ sono relazioni d'equivalenza su $C(X, Y)$.

Oss. $f_0 \overset{F}{\simeq} f_1 : X \to Y$ e $g_0 \overset{G}{\simeq} g_1 : Y \to Z \Rightarrow g_0 \circ f_0 \overset{H}{\simeq} g_1 \circ f_1$
($\simeq$ è *compositiva*) $H(x, s) = G(F(x, s), s)$.

Def. $f : X \to Y$ è un'*equivalenza omotopica* tra X e Y se $\exists\, g : Y \to X$ t.c. $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ e $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$. g è detta *inversa omotopica* di f.

N.B. L'inversa omotopica se esiste non è necessariamente unica, né iniettiva, né suriettiva.

Def. Diciamo che X e Y sono *omotopicamente equivalenti* o che *hanno lo stesso tipo d'omotopia* se $\exists\, f : X \to Y$ equivalenza omotopica, $X \simeq Y$.

Oss. $f : X \to Y$ omeomorfismo $\Rightarrow f$ equivalenza omotopica con inversa omotopica $f^{-1} : Y \to X$. Quindi $X \cong Y \Rightarrow X \simeq Y$.

Oss. $\simeq$ relazione d'equivalenza tra spazi topologici più debole di omeo.

N.B. Indichiamo un punto o uno spazio puntiforme non specifico con $*$.

Def. Uno spazio top. è *contraibile* se ha il tipo d'omotopia di un punto.

Oss. In altre parole X contraibile $\Leftrightarrow X \simeq *$.

Prop. *X contraibile* $\Leftrightarrow \mathrm{id}_X \simeq$ *costante.*

In inglese un'applicazione omotopa a costante è detta *null-homotopic*.

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ $j : X \to *$ equivalenza omotopica, $i : * \to X$ inversa omotopica di $j \Rightarrow \mathrm{id}_X \simeq i \circ j =$ costante.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\mathrm{id}_X \simeq c : X \to X$ costante, $c(x) = x_0$, $\forall\, x \in X \rightsquigarrow i : \{x_0\} \to X$, $i(x_0) = x_0$, $j : X \to \{x_0\} \Rightarrow j \circ i = \mathrm{id}_{\{x_0\}}$, $i \circ j = c \simeq \mathrm{id}_X \Rightarrow j$ equivalenza omotopica $\Rightarrow X \simeq \{x_0\}$. □

Esempio. $U \subset \mathbb{R}^n$ convesso $\Rightarrow U$ contraibile: scegliamo $u_0 \in U \rightsquigarrow$ $H : U \times I \to U$, $H(x, s) = (1 - s)x + su_0 \Rightarrow h_0 = \mathrm{id}_U$, $h_1 = u_0$.
$\mathbb{R}^n$, B^n e I^n contraibili.

Prop. *X contraibile $\Rightarrow$ X connesso per archi.*

Dim. $H : X \times I \to X$ t.c. $h_0 = x_0$ costante e $h_1 = \mathrm{id}_X$. $\forall\, x \in X \rightsquigarrow$ $\gamma_x : I \to X$, $\gamma_x(t) = H(x, t) \Rightarrow \gamma_x(0) = x_0$, $\gamma_x(1) = x \Rightarrow X$ cpa. □

Def. $r : X \to A$ è una *retrazione* continua se $A \subset X$ e $r|_A = \mathrm{id}_A$.

Def. $H : X \times I \to X$ *(retrazione per) deformazione forte* (risp. *debole*) di X su $A \subset X$ se:
1) $h_0 = \mathrm{id}_X$

2) $h_s|_A = \mathrm{id}_A$, $\forall\, s \in I$ (risp. per $s = 1$)

3) $h_1(X) = A$.

X si retrae per deformazione su A e scriviamo $X \searrow A$ se $\exists\, H$ deformazione.

Oss. Nell'esempio precedente H è retrazione per deformazione forte del convesso U su un suo punto.

Oss. H deformazione di X su $A \Rightarrow r := h_1| : X \to A$ retrazione.

Oss. X contraibile $\Leftrightarrow X$ ammette deformazione debole su un punto.

Oss. $X \searrow A \Rightarrow i_A : A \overset{\simeq}{\hookrightarrow} X$ ha inversa omotopica $r : X \overset{\simeq}{\to} A \Rightarrow X \simeq A$.

Oss. Retrazione per deformazione = omotopia tra id_X e retrazione.

Lezione 19

Rivestimenti

X e Y spazi topologici.

Def. $p: X \to Y$ *rivestimento* se p continua e $\exists\, J = J_{\text{dis}}$ t.c.
$\forall\, y \in Y\ \exists\, V \subset Y$ intorno aperto di y con

$$p^{-1}(V) = \bigsqcup_{j\in J} U_j,\ \ U_j \subset X \text{ aperto } \forall\, j \in J \text{ e}$$

$$p_j := p|_{U_j} : U_j \xrightarrow{\cong} V \text{ omeo } \forall\, j \in J.$$

Terminologia: X *spazio totale*; Y *base di* p; $p^{-1}(y)$ *fibra* di y; J *fibra tipo*; V *aperto banalizzante*; U_j *foglio*; $p_j^{-1} : V \xrightarrow{\cong} U_j$ *inversa locale* di p.

Oss. $p^{-1}(y) \cap U_j = \{p_j^{-1}(y)\}$, $\forall\, j \in J \Rightarrow p^{-1}(y) \cong J_{\text{dis}}$, $\forall\, y \in Y$.

Oss. $\varphi : V \times J_{\text{dis}} \xrightarrow{\cong} p^{-1}(V)$, $\varphi(y, j) := p_j^{-1}(y)$ omeo e $p \circ \varphi = \pi_V$.

Oss. p rivestimento $\Rightarrow$ p omeo loc. e suriettiva $\Rightarrow$ p aperta.

Oss. X II-numerabile $\Rightarrow$ J numerabile.

Def. Un rivestimento $p: X \to Y$ è:
1) *connesso* (risp. *connesso per archi*) se X è connesso (risp. cpa);
2) *finito* se $d(p) := |J| < \infty$ (*grado* o *numero di fogli* di p);
3) *infinito* se $d(p) = \infty$;
4) *banale* se Y aperto banalizzante per p.

Oss. p banale $\Leftrightarrow \exists\, \varphi : Y \times J_{\text{dis}} \xrightarrow{\cong} X$ omeo t.c. $p \circ \varphi = \pi_Y$.

Oss. $p: X \to Y$ rivestimento ad un foglio $\Leftrightarrow$ p omeo.

Rivestimento universale di S^1. $p: \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.
$p^{-1}(1,0) = \mathbb{Z}$, $p^{-1}(-1,0) = \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$. p di periodo 1: $p(t+1) = p(t)$.
$V = S^1 - \{(1,0)\} \cong \mathbb{R}$, $V' = S^1 - \{(-1,0)\} \cong \mathbb{R}$ (proiezione stereografica).

$$p^{-1}(V) = \mathbb{R} - \mathbb{Z} = \bigsqcup_{j\in\mathbb{Z}} U_j \qquad U_j :=]j, j+1[$$

$$p^{-1}(V') = \mathbb{R} - \left(\mathbb{Z} + \tfrac{1}{2}\right) = \bigsqcup_{j\in\mathbb{Z}} U'_j \qquad U'_j := \left]j - \tfrac{1}{2}, j + \tfrac{1}{2}\right[$$



$S^1 = V \cup V'$. $p|_{U_j} : U_j \to V$ e $p|_{U'_j} : U'_j \to V'$ continue biiettive
$\Rightarrow$ omeo $\Rightarrow$ V e V' banalizzanti $\Rightarrow$ p rivestimento con fibra $\mathbb{Z}$.



Esempio. $q_n : S^1 \to S^1$, $q_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $S^1 \subset \mathbb{C}$.
$J = q_n^{-1}(1) = \{\text{radici } n\text{-esime di } 1\} \cong \mathbb{Z}_n \Rightarrow d(q_n) = n$.
V, V' aperti banalizzanti. Per $j = 0, \dots, n-1$ consideriamo



$$U_j = \left\{ z \in S^1 \;\middle|\; \arg z \in \left] \tfrac{2j\pi}{n}, \tfrac{2(j+1)\pi}{n} \right[\right\}$$

$$U'_j = \left\{ z \in S^1 \;\middle|\; \arg z \in \left] \tfrac{(2j-1)\pi}{n}, \tfrac{(2j+1)\pi}{n} \right[\right\}$$

$q_n|_{U_j} : U_j \to V$ e $q_n|_{U'_j} : U'_j \to V'$ omeo con inversa $\sqrt[n]{z}$.



Rivestimento doppio di $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$. $p_n = \pi|_{S^n} : S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, $p_n(x) = [x]$.
$p_n^{-1}([x]) = \{\pm x\} \Rightarrow d(p) = 2$.
$H_i : x_i = 0$ iperpiano in $\mathbb{R}\mathrm{P}^n \Rightarrow H_i \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^{n-1} \rightsquigarrow V_i = \mathbb{R}\mathrm{P}^n - H_i \cong \mathbb{R}^n$.
$\mathbb{R}\mathrm{P}^n = V_0 \cup \cdots \cup V_n$. $U_{i,\pm} = \{(x_0, \dots, x_n) \in S^n \mid \pm x_i > 0\}$ aperti in S^n. (carta affine)
$p_{n,i,\pm} = p|_{U_{i,\pm}} : U_{i,\pm} \to V_i$, $p_{n,i,\pm}^{-1}([x_0, \dots, x_n]) = \pm \operatorname{sgn}(x_i)(x_0, \dots, x_n)$.

Def. Siano $p : X \to Y$ rivestimento e $f : Z \to Y$ continua.
$\tilde{f} : Z \to X$ è un *sollevamento di f* se $\tilde{f}$ è continua e $p \circ \tilde{f} = f$.



Lemma del numero di Lebesgue. *Sia (X, d) spazio metrico compatto, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ricoprimento aperto. $\exists\, \delta > 0$ t.c. $\forall\, S \subset X$, $\operatorname{diam} S < \delta \Rightarrow S \subset U_\alpha$ per un certo $\alpha \in A$.*

Def. δ è detto *numero di Lebesgue* del ricoprimento aperto.

Dim. Se $\exists\, \alpha \in A$ t.c. $U_\alpha = X \rightsquigarrow \delta = 1$ numero di Lebesgue.
Supponiamo $\emptyset \neq U_\alpha \subsetneq X$, $\forall\, \alpha \in A$. $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ sottoricoprimento.
$K_i = X - U_{\alpha_i}$ chiuso $\Rightarrow K_i$ compatto e $\bigcap_{i=1}^{n} K_i = X - \bigcup_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} = \emptyset \rightsquigarrow$

$$\bar{d} : X \to \mathbb{R}$$

$$\bar{d}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d(x, K_i) \quad \text{(distanza media)}$$

$\Rightarrow \bar{d}(x) > 0$, $\forall\, x \in X \Rightarrow \delta := \min \bar{d} > 0$. $\forall\, S \subset X$ t.c. $\operatorname{diam} S < \delta \Rightarrow S \subset B_d(s, \delta)$ con $s \in S$. $\exists\, i$ t.c. $\delta \leqslant \bar{d}(s) \leqslant d(s, K_i) \Rightarrow B_d(s, \delta) \cap K_i = \emptyset$
$\Rightarrow S \subset B_d(s, \delta) \subset X - K_i = U_{\alpha_i} \Rightarrow \delta$ numero di Lebesgue. □

Lezione 20

Teorema di sollevamento dei cammini

Teor. *Sia* $p\colon X \to Y$ *rivestimento,* $\gamma\colon I \to Y$ *continua e* $\gamma(0) = y_0$. $\forall\, x_0 \in p^{-1}(y_0)$, $\exists!\, \tilde\gamma_{x_0} : I \to X$ *sollevamento di* γ *t.c.* $\tilde\gamma_{x_0}(0) = x_0$.

Dim. J fibra di p. $\{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto banalizzante di $Y \Rightarrow$ $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto di $I \rightsquigarrow \delta > 0$ numero di Lebesgue $\rightsquigarrow$ $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ t.c. $t_{i+1} - t_i < \delta \Rightarrow \gamma([t_i, t_{i+1}]) \subset V_{\alpha_i} =: V_i$ per un certo $\alpha_i \in A \Rightarrow \gamma(t_i) \in V_{i-1} \cap V_i$, $i \geqslant 1$.

$$p^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j\in J} U_{i,j}, \qquad p_{i,j} := p|_{U_{i,j}} : U_{i,j} \xrightarrow{\cong} V_i, \qquad U_{i,j} \text{ fogli di } p$$

Esistenza Def. ricorsiva: $\tilde\gamma_i : [0, t_i] \to X$ t.c. $\tilde\gamma_i(0) = x_0$, $p \circ \tilde\gamma_i = \gamma|_{[0,t_i]}$. $\tilde\gamma_0 : \{0\} \to X$, $\tilde\gamma_0(0) := x_0$. Supponiamo di aver definito $\tilde\gamma_i \Rightarrow \exists!\, j_i \in J$ t.c. $\tilde\gamma_i(t_i) \in U_{i,j_i}$ dato che $\gamma(t_i) \in V_i$.

$$\tilde\gamma_{i+1} := \begin{cases} \tilde\gamma_i, & \text{su } [0, t_i] \\ p_{i,j_i}^{-1} \circ \gamma, & \text{su } [t_i, t_{i+1}]. \end{cases}$$



$p_{i,j_i}(\tilde\gamma_i(t_i)) = p(\tilde\gamma_i(t_i)) = \gamma(t_i) \Rightarrow \tilde\gamma_i(t_i) = p_{i,j_i}^{-1}(\gamma(t_i)) \Rightarrow$ $\tilde\gamma_{i+1}$ continua. $\tilde\gamma_{i+1}$ sollevamento di γ su $[0, t_{i+1}]$ t.c. $\tilde\gamma_{i+1}(0) = x_0 \rightsquigarrow \tilde\gamma_{x_0} := \tilde\gamma_n$.

Unicità $\forall\, \tilde\gamma'$ sollevamento continuo t.c. $\tilde\gamma'(0) = x_0$. Per induzione se $\tilde\gamma' = \tilde\gamma_i$ su $[0, t_i] \Rightarrow \tilde\gamma'([t_i, t_{i+1}]) \subset U_{i,j_i}$ perché $\tilde\gamma'([t_i, t_{i+1}])$ connesso $\Rightarrow$ $p_{i,j_i} \circ \tilde\gamma' = \gamma$ su $[t_i, t_{i+1}] \Rightarrow \tilde\gamma' = p_{i,j_i}^{-1} \circ \gamma = \tilde\gamma$ su $[t_i, t_{i+1}] \Rightarrow \tilde\gamma' = \tilde\gamma_{x_0}$. □

Oss. γ cappio $\Rightarrow \tilde\gamma_{x_0}$ cammino non necessariamente cappio.

Esempio. $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$
$\gamma : I \to S^1$, $\gamma(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) = p(t) \Rightarrow \tilde\gamma_0(t) = t$.

Oss. $\theta : [a, b] \to S^1 \rightsquigarrow \tilde\theta : [a, b] \to \mathbb{R} \Rightarrow \theta(t) = (\cos\tilde\theta(t), \sin\tilde\theta(t))$.

Omotopie di cammini e di cappi

$I^2 = I \times I \subset \mathbb{R}^2$ *quadrato unitario* con coordinate $(t, s) \in I^2$.

$$H : I^2 \to X \quad \text{continua}$$
$$(t, s) \mapsto H(t, s) =: h_s(t)$$
$$\gamma_0 := h_0, \quad \gamma_1 := h_1$$

Def. $H : I^2 \to X$ è detta *omotopia*

di cammini $\overset{\text{def}}{\iff}$ H rel $\{0, 1\}$: $h_s(0) = x_0$, $h_s(1) = x_1$, $\forall\, s \in I$. $\gamma_0 \sim \gamma_1$.

di cappi $\overset{\text{def}}{\iff}$ H rel $\{0, 1\}$: $h_s(0) = h_s(1) = x_0$, $\forall\, s \in I$. $\gamma_0 \sim \gamma_1$.

libera di cappi $\overset{\text{def}}{\iff}$ h_s cappio: $h_s(0) = h_s(1)$, $\forall\, s \in I$.

Teorema di sollevamento delle omotopie

Teor. *Sia $p: X \to Y$ rivestimento, $H: I^2 \to Y$ continua e $H(0,0) = y_0$. $\forall\, x_0 \in p^{-1}(y_0)$, $\exists!\, \tilde{H}: I^2 \to X$ sollevamento di H t.c. $\tilde{H}(0,0) = x_0$. Inoltre H rel $\{0,1\} \Rightarrow \tilde{H}$ rel $\{0,1\}$.*

Dim. L'idea è simile al caso dei cammini e manteniamo la notazione. $\{H^{-1}(V_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ ricoprimento aperto di $I^2 \rightsquigarrow \delta > 0$ numero di Lebesgue $\rightsquigarrow 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ suddivisione di I t.c. $t_{i+1} - t_i < \dfrac{\delta}{\sqrt{2}}$.

Numeriamo i rettangoli $[t_i, t_{i+1}] \times [t_k, t_{k+1}]$ da sinistra a destra e dal basso all'alto $\rightsquigarrow Q_1, \ldots, Q_{n^2}$. $\operatorname{diam} Q_i < \delta \Rightarrow H(Q_{i+1}) \subset V_{\alpha_i} =: V_i$.

$P_0 := \{(0,0)\}$

$$P_i := \bigcup_{k=1}^{i} Q_k \;\Rightarrow\; T_i := \underbrace{P_i \cap Q_{i+1}}_{\text{connesso}} = \begin{cases} 1 \text{ vertice } (i=0) \\ 1 \text{ lato} \\ 2 \text{ lati consecutivi} \end{cases}$$



Esistenza Def. ricorsiva: $\tilde{H}_i: P_i \to X$ t.c. $\tilde{H}(0,0) = x_0$, $p \circ \tilde{H}_i = H|_{P_i}$. $\tilde{H}_0: P_0 \to X$, $\tilde{H}_0(0,0) := x_0$. Supponiamo di aver definito $\tilde{H}_i \Rightarrow \exists!\, j_i \in J$ t.c. $\tilde{H}(T_i) \subset U_{i,j_i}$ perché $H(T_i) \subset H(Q_{i+1}) \subset V_i$ e T_i connesso (per archi).

$$\tilde{H}_{i+1} := \begin{cases} \tilde{H}_i, & \text{su } P_i \\ p_{i,j_i}^{-1} \circ H, & \text{su } Q_{i+1}. \end{cases}$$

$p_{i,j_i} \circ \tilde{H}_i|_{T_i} = p \circ \tilde{H}_i|_{T_i} = H|_{T_i} \Rightarrow \tilde{H}_i|_{T_i} = (p_{i,j_i}^{-1} \circ H)|_{T_i} \Rightarrow \tilde{H}_{i+1}$ continua.
$\tilde{H}_{i+1}$ sollevamento di H su P_{i+1} t.c. $\tilde{H}_{i+1}(0,0) = x_0 \rightsquigarrow \tilde{H} := \tilde{H}_{n^2}$.

Unicità $\forall\, \tilde{H}'$ sollevamento continuo t.c. $\tilde{H}'(0,0) = x_0$. Per induzione se $\tilde{H}' = \tilde{H}_i$ su $P_i \Rightarrow \tilde{H}'(Q_{i+1}) \subset U_{i,j_i}$ perché $\tilde{H}'(Q_{i+1})$ connesso $\Rightarrow$
$p_{i,j_i} \circ \tilde{H}' = H$ su $Q_{i+1} \Rightarrow \tilde{H}' = p_{i,j_i}^{-1} \circ H = \tilde{H}$ su $Q_{i+1} \Rightarrow \tilde{H}' = \tilde{H}$.

Rel $\{0,1\}$ $H(\{0\} \times I) = y_0 \Rightarrow \tilde{H}(\{0\} \times I) \subset p^{-1}(y_0)$.
$x_0 \in \tilde{H}(\{0\} \times I)$ connesso e $p^{-1}(y_0)$ discreto $\Rightarrow \tilde{H}(\{0\} \times I) = x_0$.
Analogamente si ha $\tilde{H}(\{1\} \times I) = x_1$, con $p(x_1) = y_1 = H(\{1\} \times I)$. □

Oss. $\alpha \sim \beta: I \to Y \Rightarrow \tilde{\alpha}_{x_0} \sim \tilde{\beta}_{x_0} \Rightarrow \tilde{\alpha}_{x_0}(1) = \tilde{\beta}_{x_0}(1)$.

Lezione 21

Gruppo fondamentale

Def. Uno *spazio puntato* (X, x_0) è uno spazio topologico X con un *punto base* $x_0 \in X$. Un'applicazione tra spazi puntati $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ è un'applicazione $f : X \to Y$ t.c. $f(x_0) = y_0$.

Def. Lo *spazio dei cappi* di (X, x_0) è

$$\Omega(X, x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha : I \to X \mid \alpha \text{ continua e } \alpha(0) = \alpha(1) = x_0\}.$$

$\gamma_{x_0} : I \to X$, $\gamma_{x_0}(t) = x_0$, $\forall\, t \in I$ è detto *cappio banale*.

Relazione d'equivalenza su $\Omega(X, x_0)$: omotopia di cappi $\sim$

$$\forall\, \alpha_0, \alpha_1 \in \Omega(X, x_0),\ \alpha_0 \sim \alpha_1 \Leftrightarrow \exists\, H : I^2 \to X \ \text{ omotopia rel } \{0,1\}$$

$$h_0 = \alpha_0,\ h_1 = \alpha_1$$
$$h_s(0) = h_s(1) = x_0,\ \forall\, s \in I.$$



$[\alpha]$ *classe di equivalenza* di $\alpha \in \Omega(X, x_0)$.

Def. Il *gruppo fondamentale* di (X, x_0) è l'insieme quoziente

$$\pi_1(X, x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \Omega(X, x_0)/\!\sim\ = \{[\alpha] \mid \alpha \in \Omega(X, x_0)\}.$$

Teor. *$\pi_1(X, x_0)$ è un gruppo rispetto all'operazione binaria*

$$[\alpha][\beta] \stackrel{def}{=} [\alpha * \beta],\ \forall\, [\alpha], [\beta] \in \pi_1(X, x_0).$$

L'elemento neutro è $1 = [\gamma_{x_0}]$ *e si ha* $[\alpha]^{-1} = [\bar{\alpha}]$.

Dim. [$[\alpha][\beta]$ Ben definito] Mostriamo che non dipende dai rappresentanti.

$$\left.\begin{array}{rcl} \alpha_0 \overset{H}{\sim} \alpha_1 & \rightsquigarrow & H : I^2 \to X \\ \beta_0 \overset{K}{\sim} \beta_1 & \rightsquigarrow & K : I^2 \to X \end{array}\right\} \text{ omotopie rel } \{0,1\}.$$

$$L : I^2 \to X \quad L(t,s) = \begin{cases} H(2t, s), & 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ K(2t-1, s), & \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$



$$\alpha_0 * \beta_0 \sim \alpha_1 * \beta_1 \Rightarrow [\alpha_0][\beta_0] = [\alpha_1][\beta_1]$$

[Proprietà associativa]

$$[\alpha]([\beta][\gamma]) = [\alpha * (\beta * \gamma)] = [(\alpha * \beta) * \gamma]$$
$$= ([\alpha][\beta])[\gamma]$$



[Elemento neutro]

$$[\gamma_{x_0}][\alpha] = [\gamma_{x_0} * \alpha] = [\alpha]$$
$$[\alpha][\gamma_{x_0}] = [\alpha * \gamma_{x_0}] = [\alpha]$$



Inverso

$$[\alpha][\alpha]^{-1} = [\alpha * \bar{\alpha}] = [\gamma_{x_0}]$$
$$[\alpha]^{-1}[\alpha] = [\bar{\alpha} * \alpha] = [\gamma_{x_0}]$$



□

Oss. Analoghe proprietà algebriche valgono anche per prodotti di cammini (quando il prodotto è definito). La dimostrazione è la stessa.

Oss. $\pi_1(\{x_0\}, x_0) = 0$ (l'unico cappio è quello banale).

Funtorialità.

Def. Data $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ continua definiamo l'*omomorfismo indotto*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$$
$$f_*([\alpha]) \stackrel{\text{def}}{=} [f \circ \alpha]$$

Teor. *f_* è un omomorfismo di gruppi.*

Dim. f_* ben definita perché $\simeq_{\{0,1\}}$ compositiva.
Scrivendo esplicitamente la definizione si verifica subito l'identità

$$f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta).$$

$$\begin{aligned} f_*([\alpha][\beta]) &= f_*([\alpha * \beta]) \\ &= [f \circ (\alpha * \beta)] = [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] \\ &= [(f \circ \alpha)][(f \circ \beta)] = f_*([\alpha]) f_*([\beta]). \end{aligned}$$

□

Teor (di funtorialità)**.** *Valgono le proprietà seguenti:*
1) $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x_0)}$.

2) $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *e* $g : (Y, y_0) \to (Z, z_0)$ *continue* $\Rightarrow (g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

Dim. 1) Immediata. Dimostriamo *2)*.

$$\begin{aligned} (g \circ f)_*([\alpha]) &= [(g \circ f) \circ \alpha] = [g \circ (f \circ \alpha)] \\ &= g_*(f_*([\alpha])) = (g_* \circ f_*)([\alpha]). \end{aligned}$$

□

Oss. $f : (X, x_0) \stackrel{\cong}{\to} (Y, y_0)$ omeo $\Rightarrow f_* : \pi_1(X, x_0) \stackrel{\cong}{\to} \pi_1(Y, y_0)$ isomorfismo con inversa $(f_*)^{-1} = (f^{-1})_*$. Quindi π_1 è un *invariante topologico*.

Oss. $c : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ costante $\Rightarrow c_* = 1$ (omomorfismo banale).

Teor (Invarianza omotopica)**.** $f, g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *continue t.c.* $f \simeq_{x_0} g$ $\Rightarrow f_* = g_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$.

Dim. L'omotopia è compositiva. □

Oss. I e I^2 connessi per archi $\Rightarrow \Omega(X, x_0) = \Omega(\mathcal{P}_{x_0}(X), x_0) \Rightarrow$

$$\pi_1(X, x_0) = \pi_1(\mathcal{P}_{x_0}(X), x_0)$$

Per studiare π_1 possiamo restringerci a spazi connessi per archi.

Lezione 22

Dipendenza dal punto base

$\mu : I \to X$ continua con $\mu(0) = x_0$, $\mu(1) = x_1 \rightsquigarrow$

$$\mu_* : \pi_1(X, x_1) \to \pi_1(X, x_0)$$
$$\mu_*([\alpha]) \stackrel{\text{def}}{=} [\mu * \alpha * \bar{\mu}]$$



Teor. *Valgono le proprietà seguenti:*
1) μ_* *ben definita.*

2) $\forall\, \mu_0 \sim \mu_1 \Rightarrow \mu_{0*} = \mu_{1*}$.

3) $\gamma_{x_0 *} = \mathrm{id}_{\pi_1(X, x_0)}$.

4) $(\mu * \nu)_* = \mu_* \circ \nu_*$ *(se la concatenazione è definita).*

5) $(\mu_*)^{-1} = \bar{\mu}_*$.

6) μ_* *isomorfismo di gruppi.*

Dim. *(1)*−*(3)* immediate. *(4)* $\overline{\mu * \nu} = \bar{\nu} * \bar{\mu}$. *(5)* $\mu * \bar{\mu} \sim \gamma_{x_0}$ e *(2)*−*(4)*. *(6)* $\mu_*([\alpha][\beta]) = [\mu * \alpha * \beta * \bar{\mu}] = [\mu * \alpha * \bar{\mu} * \mu * \beta * \bar{\mu}] = \mu_*([\alpha])\, \mu_*([\beta])$. □

Cor. *X connesso per archi,* $\forall\, x_0, x_1 \in X \Rightarrow \pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$.
$\pi_1(X) := \pi_1(X, x_0)$ *ben definito a meno di isomorfismi.*

N.B. In generale l'isomorfismo $\mu_* : \pi_1(X, x_1) \stackrel{\cong}{\to} \pi_1(X, x_0)$ dipende da μ.
$\pi_1(X)$ abeliano $\Rightarrow \mu_*$ indipendente da μ (isomorfismo canonico).

Prop. $\pi_1(X)$ *abeliano* $\Rightarrow \alpha_* = \beta_*$, $\forall\, \alpha, \beta : I \to X$ *cammini tra* x_0 *e* x_1.

Dim. $\gamma := \alpha * \bar{\beta} \in \Omega(X, x_0) \Rightarrow (\alpha_* \circ \beta_*^{-1})([\omega]) = (\alpha * \bar{\beta})_*([\omega]) = \gamma_*([\omega]) = [\gamma * \omega * \bar{\gamma}] = [\gamma][\omega][\gamma]^{-1} = [\omega] \Rightarrow \alpha_* \circ \beta_*^{-1} = \mathrm{id}_{\pi_1(X, x_0)} \Rightarrow \alpha_* = \beta_*$. □

Prop. $X \searrow A$, $a \in A \Rightarrow i_* : \pi_1(A, a) \stackrel{\cong}{\to} \pi_1(X, a)$, *con* $i : A \hookrightarrow X$ *inclusione.*

Dim. $H : X \times I \to X$ deformazione $X \searrow A \rightsquigarrow r := h_1| : X \to A$ retrazione $\Rightarrow i \circ r = h_1 \simeq_A \mathrm{id}_X$ e $r \circ i = \mathrm{id}_A \Rightarrow i_* \circ r_* = (i \circ r)_* = (\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{\pi_1(X, a)}$ e $r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = \mathrm{id}_{\pi_1(A, a)} \Rightarrow i_*$ isomorfismo e $i_*^{-1} = r_*$. □

Cor. $U \subset \mathbb{R}^n$ *convesso,* $x_0 \in U \Rightarrow \pi_1(U, x_0) = 0$.

Dim. $U \searrow \{x_0\}$. □

Oss. $\pi_1(B^n) = \pi_1(\mathbb{R}^n) = 0$, $\forall\, n \geqslant 0$.

Enunciamo il seguente teorema senza dimostrarlo.

Teor. $f : (X, x_0) \stackrel{\simeq}{\to} (Y, y_0)$ *equivalenza omotopica* $\Rightarrow$
$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ *isomorfismo.*

Cor. X *contraibile* $\Rightarrow \pi_1(X) = 0$.

Def. X è *semplicemente connesso* se $\forall\, x_0, x_1 \in X$, $\exists\, \alpha : I \to X$ continua t.c. $\alpha(0) = x_0$, $\alpha(1) = x_1$ e α unica a meno di $\simeq_{\{0,1\}}$.

Oss. X semplicemente connesso $\Leftrightarrow$ X cpa e $\forall\, \alpha_0, \alpha_1 : I \to X$ continue t.c. $\alpha_0(0) = \alpha_1(0) = x_0$ e $\alpha_0(1) = \alpha_1(1) = x_1 \Rightarrow \alpha_0 \sim \alpha_1$.

Teor. *X semplicemente connesso $\Leftrightarrow$ X connesso per archi e $\pi_1(X) = 0$.*

Dim. $\boxed{\Rightarrow}$ $\forall\, [\alpha] \in \pi_1(X, x_0) \Rightarrow \alpha \sim \gamma_{x_0} \Rightarrow [\alpha] = 1$.

$\boxed{\Leftarrow}$ $\alpha_0 * \bar{\alpha}_1 \in \Omega(X, x_0) \Rightarrow [\alpha_0 * \bar{\alpha}_1] = [\gamma_{x_0}] \Rightarrow \alpha_0 * \bar{\alpha}_1 * \alpha_1 \sim \gamma_{x_0} * \alpha_1 \Rightarrow \alpha_0 \sim \alpha_1$. □

Cor. *$U \subset \mathbb{R}^n$ convesso $\Rightarrow$ U semplicemente connesso.*

Oss. B^n e $\mathbb{R}^n$ semplicemente connessi, $\forall\, n \geqslant 0$.

Cor. *X contraibile $\Rightarrow$ X semplicemente connesso.*

Def. Un rivestimento $p : X \to Y$ è detto *rivestimento universale di Y* se X è semplicemente connesso.

Funzione di sollevamento. $p : X \to Y$ rivestimento
$x_0 \in X$, $y_0 = p(x_0)$, $J = p^{-1}(y_0)$

$$\Phi_p : \pi_1(Y, y_0) \to J$$
$$\Phi_p([\alpha]) \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{\alpha}_{x_0}(1)$$

con $\tilde{\alpha}_{x_0} : I \to X$ sollevamento di α t.c. $\tilde{\alpha}_{x_0}(0) = x_0$

Teor. *$p : X \to Y$ rivestimento universale $\Rightarrow$ Φ_p biiettiva.*

Def. Φ_p è detta *funzione di sollevamento*.

Dim. $\boxed{\textit{Ben definita}}$ $\alpha \sim \beta \Rightarrow \tilde{\alpha}_{x_0} \sim \tilde{\beta}_{x_0}$ (sollevamento dell'omotopia).

$\boxed{\textit{Suriettiva}}$ $\forall\, x_1 \in J \rightsquigarrow \gamma : I \to X$ t.c. $\gamma(0) = x_0$, $\gamma(1) = x_1 \rightsquigarrow$
$\alpha := p \circ \gamma \in \Omega(Y, y_0)$ e $\tilde{\alpha}_{x_0} = \gamma \Rightarrow \Phi_p([\alpha]) = x_1$.

$\boxed{\textit{Iniettiva}}$ $\forall\, [\alpha], [\beta] \in \pi_1(Y, y_0)$, $\Phi([\alpha]) = \Phi([\beta]) \Rightarrow \tilde{\alpha}_{x_0}(1) = \tilde{\beta}_{x_0}(1) \Rightarrow$
$\tilde{\alpha}_{x_0} \sim \tilde{\beta}_{x_0} \Rightarrow \alpha = p \circ \tilde{\alpha}_{x_0} \sim p \circ \tilde{\beta}_{x_0} = \beta \Rightarrow [\alpha] = [\beta]$. □

Oss. $p : X \to Y$ rivestimento univers. $[\alpha] = 1 \Leftrightarrow \Phi_p([\alpha]) = \Phi_p(1) = x_0$.

Calcolo di $\pi_1(S^1)$

Teor. $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Dim. $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ rivestimento universale
$y_0 = (1, 0) \in S^1$. $[\alpha] \in \pi_1(S^1, y_0) \rightsquigarrow \tilde{\alpha}_n : I \to \mathbb{R}$ unico sollevamento t.c.
$\tilde{\alpha}_n(0) = n \in \mathbb{Z} \Rightarrow \tilde{\alpha}_n = \tilde{\alpha}_0 + n$ perché p ha periodo 1.

$\Phi_p : \pi_1(S^1, y_0) \stackrel{\cong}{\to} \mathbb{Z}$, $\Phi_p([\alpha]) = \tilde{\alpha}_0(1)$ biiettiva.

$$\Phi_p([\alpha][\beta]) = \widetilde{(\alpha * \beta)}_0(1) = (\tilde{\alpha}_0 * \tilde{\beta}_{\tilde{\alpha}_0(1)})(1) = \tilde{\beta}_{\tilde{\alpha}_0(1)}(1) = \tilde{\alpha}_0(1) + \tilde{\beta}_0(1)$$
$$= \Phi_p([\alpha]) + \Phi_p([\beta]) \Rightarrow \Phi_p \text{ omomorfismo.}$$ □

Oss. Il cappio $\omega_n : I \to S^1$, $\omega_n(t) = (\cos(2\pi nt), \sin(2\pi nt))$ gira n volte intorno a S^1 e $\tilde{\omega}_{n,0}(t) = nt \Rightarrow \Phi_p([\omega_n]) = \tilde{\omega}_{n,0}(1) = n \in \mathbb{Z} \Rightarrow$
$[\omega_1]$ generatore di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

Cor. *S^1 non è semplicemente connesso, in particolare non è contraibile.*

Lezione 23

Teoremi di non retrazione e di Brouwer

Teorema di non retrazione. $\nexists$ *retrazione continua* $r : B^2 \to S^1$.

Dim. Per assurdo, $r : B^2 \to S^1$ retrazione $\Rightarrow \mathrm{id}_{\pi_1(S^1)} = 0$. □

$$S^1 \xhookrightarrow{i} B^2 \xrightarrow{r} S^1 \quad (r \circ i = \mathrm{id}_{S^1}) \qquad \rightsquigarrow \qquad \pi_1(S^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(B^2) \xrightarrow{r_*} \pi_1(S^1) \quad (r_* \circ i_* = \mathrm{id}_{\pi_1(S^1)})$$

$$\mathbb{Z} \qquad\qquad 0 \qquad\qquad \mathbb{Z}$$

N.B. Più in generale, $\nexists$ retrazione continua $r : B^n \to S^{n-1}$.
Esercizio per $n = 1$.

Teorema del punto fisso di Brouwer. $\forall\, f : B^2 \to B^2$ *continua* $\Rightarrow$ $\exists\, a \in B^2$ *t.c.* $f(a) = a$ *(punto fisso).*

Dim. Per assurdo, $f(x) \neq x$, $\forall\, x \in B^2 \rightsquigarrow$

$$\ell_x := \{t(x - f(x)) + f(x) \mid t > 0\}$$

semiretta aperta con origine in $f(x)$ passante per $x \rightsquigarrow$

$$r : B^2 \to S^1$$
$$r(x) = \ell_x \cap S^1$$

retrazione continua, contraddizione. □



N.B. Più in generale, $\forall\, f : B^n \to B^n$ continua $\Rightarrow \exists\, a \in B^n$ t.c. $f(a) = a$.
Esercizio per $n = 1$.

Applicazione. $f \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f \geqslant 1$, sotto certe condizioni sui coefficienti $\exists\, a \in \mathbb{C}$ t.c. $|a| \leqslant 1$ e $f(a) = 0$.

Esempio. $f = x^7 - x^4 - 5x + 3i \in \mathbb{C}[x]$, $f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$ con

$$g(x) = \frac{1}{5}x^7 - \frac{1}{5}x^4 + \frac{3i}{5}.$$

$|x| \leqslant 1 \Rightarrow |g(x)| \leqslant 1 \Rightarrow g : B^2 \to B^2$ continua $\Rightarrow \exists\, a \in B^2$ t.c. $g(a) = a$.

Gruppi fondamentali delle sfere

Prop. $(\mathbb{R}^n - \{0\}) \searrow S^{n-1}$, $\forall\, n \geqslant 1$.

Dim. $H : (\mathbb{R}^n - \{0\}) \times I \to \mathbb{R}^n - \{0\}$

$$H(x,t) = (1-t)x + \frac{tx}{\|x\|}.$$

□

Prop. *Supponiamo $X = U \cup V$ con U, V e $U \cap V$ aperti non vuoti connessi per archi t.c. $\pi_1(U) = 0$ e $\pi_1(V) = 0 \Rightarrow \pi_1(X) = 0$.*

Dim. X connesso per archi, $x_0 \in U \cap V$ punto base. $\forall\, [\omega] \in \pi_1(X) \rightsquigarrow$ $\delta > 0$ numero di Lebesgue per $\{\omega^{-1}(U), \omega^{-1}(V)\}$ (ricopr. aperto di I) $\rightsquigarrow$ $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ t.c. $t_i - t_{i-1} < \delta \rightsquigarrow x_i := \omega(t_i)$

$$\omega([t_{i-1}, t_i]) \subset \begin{cases} U \\ V \end{cases}$$

$$\omega_i := \omega|_{[t_{i-1},t_i]} : [t_{i-1}, t_i] \to X$$



Definiamo $\alpha_i : I \to X$ t.c.
$\alpha_0 = \alpha_n = \gamma_{x_0}$, $\alpha_i(0) = x_0$, $\alpha_i(1) = x_i$

$$\alpha_i(I) \subset \begin{cases} U \cap V, & \text{se } x_i \in U \cap V \\ U, & \text{se } x_i \in U - V \\ V, & \text{se } x_i \in V - U \end{cases}$$

$\gamma_i := \alpha_{i-1} * \omega_i * \bar{\alpha}_i$ cappio in U o $V \Rightarrow [\gamma_i] = 1$

$$[\omega] = \left[\prod_{i=1}^{n} \omega_i\right] = \left[\prod_{i=1}^{n} \gamma_i\right] = \prod_{i=1}^{n} [\gamma_i] = 1 \qquad \square$$

Cor. $\pi_1(S^n) = 0$, $\forall\, n \geqslant 2$.

Dim. $a_\pm = (0, \ldots, 0, \pm 1) \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $U_\pm = S^n - \{a_\pm\} \cong \mathbb{R}^n$
$U_+ \cap U_- \cong (\mathbb{R}^n - \{0\}) \searrow S^{n-1}$ connesso per archi per $n \geqslant 2$
$U_+ \cup U_- = S^n \Rightarrow \pi_1(S^n) = 0$. $\square$

Oss. S^n semplicemente connesso $\Leftrightarrow n \geqslant 2$.

Cor. $\forall\, n \geqslant 2$, $\forall\, a \in \mathbb{R}^n$ *si ha*

$$\pi_1(\mathbb{R}^n - \{a\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 2 \\ 0, & n \geqslant 3. \end{cases}$$

Invarianza topologica della dimensione. $\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^n \Rightarrow m = n$.

Dim. Per $m = 2$ (ma vale in generale).
$f : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n$ omeo $\Rightarrow f| : \mathbb{R}^2 - \{0\} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^n - \{f(0)\}$ omeo $\Rightarrow n \geqslant 2$
$\mathbb{Z} \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 - \{0\}) \cong \pi_1(\mathbb{R}^n - \{f(0)\}) \Rightarrow n = 2$. $\square$

Gruppo fondamentale di uno spazio prodotto

Teor. $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ *isomorfismo canonico.*

Dim. $p_1 : X \times Y \to X$, $p_2 : X \times Y \to Y$ proiezioni canoniche $\rightsquigarrow$
$p := (p_{1*}, p_{2*}) : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ iso
$p([\omega]) = ([p_1 \circ \omega], [p_2 \circ \omega])$. $\square$

Cor. $\pi_1(T^n) \cong \mathbb{Z}^n$.

Gruppi fondamentali degli spazi proiettivi

Caso reale.

$$\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \mathbb{Z}, & n = 1 \\ \mathbb{Z}_2, & n \geqslant 2 \end{cases}$$

$\boxed{n = 1}$ $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \cong S^1 \Rightarrow \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^1) \cong \mathbb{Z}$.
$\boxed{n \geqslant 2}$ $p : S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, $p(x) = [x]$ rivestimento universale $\Rightarrow$
$\#(\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)) = d(p) = 2 \Rightarrow \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$.

Oss. $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$ generato da $[\omega]$ con

$$\begin{array}{ccc} & & S^n \quad \tilde{\omega}(t) = (\cos(\pi t), \sin(\pi t), 0 \ldots, 0) \\ & \overset{\tilde{\omega}}{\nearrow} & \big\downarrow p \\ I & \xrightarrow[\omega]{} & \mathbb{R}\mathrm{P}^n \quad \omega(t) = [\cos(\pi t), \sin(\pi t), 0 \ldots, 0] \end{array}$$

infatti $\Phi_p([\omega]) = -a$, funzione di sollevamento da $a = (1, 0, \ldots, 0) \in S^n$.
ω parametrizza $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \subset \mathbb{R}\mathrm{P}^n \Rightarrow i_* : \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^1) \to \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$ suriettiva.
In altre parole $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$ è "generato" da $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \subset \mathbb{R}\mathrm{P}^n$.

Caso complesso.

$$\pi_1(\mathbb{C}\mathrm{P}^n) = 0, \ \forall\, n \geqslant 0.$$

Induzione su n. $n = 0$ banale. Supponiamo $\pi_1(\mathbb{C}\mathrm{P}^{n-1}) = 0$ per $n - 1 \geqslant 0$.
$H : x_0 = 0 \Rightarrow H \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^{n-1} \rightsquigarrow U = \mathbb{C}\mathrm{P}^n - H \cong \mathbb{C}^n \Rightarrow \pi_1(U) = 0$
$a = [1, 0, \ldots, 0] \in \mathbb{C}\mathrm{P}^n \rightsquigarrow V = \mathbb{C}\mathrm{P}^n - \{a\} \supset H$

$$K : V \times I \to V$$

$$K([x_0, x_1, \ldots, x_n], t) = [(1 - t)x_0, x_1 \ldots, x_n]$$

retrazione per deformazione $V \searrow H \Rightarrow \pi_1(V) \cong \pi_1(H) \cong \pi_1(\mathbb{C}\mathrm{P}^{n-1}) = 0$
$U \cap V \cong \mathbb{C}^n - \{0\} \cong \mathbb{R}^{2n} - \{0\} \searrow S^{2n-1}$ connesso per archi.

Oss.
$\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ non semplicemente connesso $\forall\, n \geqslant 1$
$\mathbb{C}\mathrm{P}^n$ semplicemente connesso $\forall\, n \geqslant 0$.

Lezione 24

Teorema di Borsuk-Ulam

Lem. *H gruppo finito e $\varphi : H \to \mathbb{Z}$ omomorfismo $\Rightarrow \varphi = 0$.*

Dim. $\varphi(H)$ sottogruppo finito di $\mathbb{Z} \Rightarrow \varphi(H) = 0 \Rightarrow \varphi = 0$. □

Teorema di Borsuk-Ulam. *$\forall\, f : S^2 \to \mathbb{R}^2$ continua $\Rightarrow \exists\, a \in S^2$ t.c.*

$$f(a) = f(-a).$$

Dim. Per assurdo, $f(x) \neq f(-x)$, $\forall\, x \in S^2 \rightsquigarrow$

$$g : S^2 \to S^1$$

$$g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}$$

$g(-x) = -g(x) \rightsquigarrow G : \mathbb{R}\mathrm{P}^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^1$, $G([x]) = [g(x)]$ continua $\Rightarrow G_* = 0$

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) & \xrightarrow{G_*=0} & \pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^1) \\ \| \wr & & \| \wr \\ \mathbb{Z}_2 & \xrightarrow{\quad 0 \quad} & \mathbb{Z} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & S^2 & \xrightarrow{g} & S^1 \\ & \overset{\tilde{\omega}}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_2} & & \downarrow{\scriptstyle p_1} \\ I & \xrightarrow[\omega]{} & \mathbb{R}\mathrm{P}^2 & \xrightarrow[G]{} & \mathbb{R}\mathrm{P}^1 \end{array}$$

$$\omega(t) = [\cos(\pi t), \sin(\pi t), 0]$$

$$\tilde{\omega}(t) = (\cos(\pi t), \sin(\pi t), 0)$$

$g \circ \tilde{\omega}$ sollevamento di $G \circ \omega$ tramite $p_1 : S^1 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^1$. $\tilde{\omega}(1) = -\tilde{\omega}(0) \Rightarrow$ $(g \circ \tilde{\omega})(1) = -(g \circ \tilde{\omega})(0) \Rightarrow G_*([\omega]) = [G \circ \omega] \neq 0$, contraddizione. □

Oss. In ogni istante ci sono due punti antipodali della superficie terrestre con stessa temperatura e pressione atmosferica.

Cor. *S^2 non si può immergere in $\mathbb{R}^2$.*

Oss. Non è possibile realizzare un planisfero continuo di tutta la Terra.